Marque con una X según corresponda
Acta de Subred ____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios ____ Acta de Sede de una Unidad ____
Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____Subred Suroccidente _____
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)__ Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

Tipo de acta COMITÉ _X__ REUNIÓN __ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA:
FECHA: 21/06/2024	LUGAR: AUDITORIO PRINCIPAL UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY AV 1 MAYO 40B 54	HORA INICIO: 8:00 AM
RESPONSABLE: EQUIPO SIVIGILA Y TEMA CENTRAL - ESTADISTICAS VITALES		HORA FINAL: 12:30 PM

OBJETIVO DE LA REUNION

Desarrollar el Comité de Vigilancia Epidemiológica COVE del mes de JUNIO, correspondiente a la localidad de KENNEDY Y PUENTE ARANDA

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. BIENVENIDA
2. URGENCIAS Y EMERGENCIAS
3. TEMA ITINERANTE: DIFUSION BOLETIN LOCAL
4. INDICADORES TRANSMISIBLES
5. CALIDAD DEL AGUA
6. TEMA CENTRAL: ESTADISTICAS VITALES
7. INDICADORES SIVIGILA
8. INDICADORES PAI
9. EVALUACION; LISTADO DE ASISTENCIA Y CIERRE

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Realizar el COVE el mes de mayo para la localidad Kennedy – Puente Aranda	EQUIPO SIVIGILA Y TEMA CENTRAL	21/06/2024	X		Se realiza el Cove local de acuerdo a los tiempos establecidos

Total, compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
1	1	100%

DESARROLLO

Siendo las 8:00 am se da inicio al COVE local correspondiente a la localidad de KENNEDY Y PUENTE ARANDA

1. **BIENVENIDA:**

Se da la bienvenida a los participantes y se informa sobre la espera durante 5 minutos para ampliar el quorum, y se realiza el listado en físico a las 8:00 am, se lee la agenda del día se inician las presentaciones de los temas programados en simultaneo los asistentes realizan el registro en el listado en físico.

2. **URGENCIAS Y EMERGENCIAS**

ALERTAS NACIONALES
Caso de rabia animal en Sucre. 2 de junio de 2024

- El 31 de mayo, se confirmó caso de rabia animal en felino de 7 meses sin antecedente vacunal. El caso inició síntomas el 22 de mayo y falleció el 27 de mayo
- Se han identificado siete (7) contactos humanos con exposición grave a quienes se les inicia esquema profiláctico y cinco contactos animales que se encuentran en seguimiento
- Se identificaron factores de riesgo en la zona como circulación viral en ciclo silvestre, ciénagas, árboles frutales, murciélagos frugívoros y zarigüeyas. Antecedentes de rabia animal en el departamento en 2021 y 2023. El 1 de junio se realizó sala de análisis de riesgo nacional.

ALERTAS INTERNACIONALES
Alerta epidemiológica. Sarampión en la región de las Américas. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Fecha de publicación: 4 de junio de 2024

- En 2024, hasta el 08 de mayo, se han notificado 121.413 casos confirmados de sarampión, por 166 estados en el mundo, representando un incremento del 94 % comparado con el mismo periodo en 2023 (62 642).
- En la región de Las Américas, entre las semanas epidemiológicas 01 y 21 de 2024, se han confirmado 234 casos (233 por laboratorio y 1 por nexo epidemiológico) en siete (7) países y en las Islas Turcas y Caicos.
- Los países que han reportado casos son: Estados Unidos (142), Canadá (77), México (6), Argentina (3), Perú (2), Bolivia (1) y Brasil (1); en Islas Turcas y Caicos en semana epidemiológica 20 se notificaron 2 casos. El 35 % de los casos corresponde al grupo de 1 a 4 años, seguido por el de 20 a 29 años con un 28 %.
- La OPS recomienda implementar actividades de intensificación de vacunación, fortalecimiento de acciones de vigilancia en zonas de alto riesgo, frontera y con silencio epidemiológico, implementar búsqueda activa por laboratorio en muestras de suero obtenidas para la vigilancia del dengue, comunicación del riesgo y otras orientaciones que pueden implementarse en el contexto de eventos masivos y viajeros internacionales.

Recomendaciones con respecto a la toma de muestras para SARAMPION-RUBEOLA
Suero: Se recomienda la obtención de la muestra de suero al primer contacto del caso con la institución de

DESARROLLO

salud y en un plazo no mayor a los 30 días de la aparición de la erupción. La vigilancia rutinaria del sarampión y la rubéola se basa en la determinación de IgM en una muestra única de suero, preferiblemente obtenida durante la fase aguda de la enfermedad (primeros 7 días desde el inicio de la erupción). Algunos casos, pueden requerir de una segunda muestra de suero, la cual, deberá obtenerse durante la fase convaleciente de la enfermedad, y preferiblemente a los 14 a 21 días

Muestras Respiratorias: se pueden obtener muestras de las vías respiratorias mediante hisopado nasal (HN), hisopado faríngeo (HF) o hisopado nasofaríngeo (HNF). Es importante obtener una buena cantidad de células epiteliales (frotando o girando con el hisopo sobre el epitelio) para que se pueda detectar el virus. El momento ideal para la obtención de las muestras de vías respiratorias dentro de los 7 días de la aparición de la erupción, pero pueden obtenerse hasta 14 días después de la aparición de la erupción.

Orina: Las muestras de orina pueden recogerse en un recipiente apropiado de plástico y de boca ancha. Debe centrifugarse la orina y el sedimento debe Re suspenderse en 2-3 ml de MTV o PBS estériles. El intervalo de tiempo recomendado para la obtención de las muestras de orina es dentro de los 7 días de la aparición de la erupción, pero estas pueden obtenerse hasta 10 días de la aparición de la erupción

BIBLIOGRAFIA

Organización Panamericana de la Salud. Orientaciones sobre las pruebas de sarampión y de la rubéola realizadas en la red de laboratorios de la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2018.

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2024_Boletin_epidemiologico_semana_22.pdf

3. **TEMA ITINERANTE:** DIFUSION BOLETIN LOCAL

La presentación del segundo Boletín del año 2023 para la localidad de Fontibón, titulado “Percepción comunitaria sobre el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) en espacio público, parques y zonas de recreación”, que elabora el Componente Geográfico de Vigilancia en Salud Pública (VSP), comprende tres secciones; introducción, resultados, y recomendaciones, a continuación, se detalla brevemente el contenido de cada una de ellas.

Introducción

En esta parte introductoria se relatan; la selección del tema realizada con los profesionales de Vigilancia en Salud Publica Comunitaria (VSPC), el objetivo planteado para el desarrollo del estudio, las fuentes de datos usadas para los diferentes análisis espaciales realizados, y las variables definidas.

Resultados

Esta sección muestra los resultados espaciales y epidemiológicos obtenidos; primero, el comparativo de los registros de la base Problemáticas Colectivas (PCO) para los años 2019 a 2023, a partir de los elementos relacionados al consumo de SPA y a la configuración de espacios inseguros. Seguido a esto, se abordan los puntos críticos por consumo de SPA, a partir de información de la base de Vigilancia Epidemiológica del Abuso de Sustancias Psicoactivas (VESPA), haciendo un comparativo de los años 2020 a 2023, este último con información hasta el mes de noviembre, en donde además, se toma la información del año 2023 para relacionar esas zonas críticas por consumo de SPA identificadas, con la ubicación de las instituciones educativas ubicadas en áreas de posible influencia, las cuales se relacionan en una tabla con la UPZ a la que pertenecen. Finalmente, se expone el comportamiento histórico de consumo droga de mayor impacto, según el espacio público (vía pública, parques, entre otros), y por curso de vida.

DESARROLLO

Cabe señalar que, durante la presentación, se añadirán aquí algunos elementos metodológicos.

4. INDICADORES TRANSMISIBLES

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA VSP, INDICADORES ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVO Socializar comportamiento de los indicadores de las enfermedades prevenibles por vacunación para brindar información, educación, comunicación de los comportamientos de los eventos transmisibles de la Subred Suroccidente en el quinto periodo epidemiológico 2024

Se hace seguimiento permanente a la política nacional y distrital de la prevención, atención, vigilancia y control para evitar la aparición de nuevos casos y así establecer medidas de control y evitar la propagación de la enfermedad cortando cadenas de trasmisión.

Dentro del Documento operativo del proceso trasversal de la vigilancia salud publica lapa la vigencia 10 de Junio a 31 de Julio de 2024 , donde se hace una revisión del documento y se resaltan aquellas intervenciones en las cual permite orientar la toma de decisiones frente a las metas distritales del Plan Territorial de Salud para la prevención y control de enfermedades, factores de riesgo en salud y determinantes; optimización del seguimiento y evaluación de las intervenciones en salud pública; en aras de racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia.

Se caracteriza por ser un proceso transversal de la gestión de la salud publica según resolución 538 de 2015, donde se hace observación análisis sistemático de la relación de presentación de los eventos. Se desarrolla a través de diferentes estrategias de vigilancia activa, pasiva e intensificada y centinela con sus tres componentes integrados tres componentes integrados entre sí, para el logro de su objetivo: como son la Gestión de la información para la VSP, Orientación de la acción para las intervenciones individuales y colectivas en salud pública, Análisis y divulgación de la información de la VSP. Las acciones de la VSP se desarrollarán a través de los subsistemas, en armonía con las dimensiones prioritarias abordadas en el **Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2022 – 2031 del Distrito Capital y de la Subred Suroccidente.**

Se continua en el mes de mayo con el énfasis en las alertas epidemiológicas vigentes y comportamiento de los indicadores de enfermedades prevenibles por vacunación. Para el año 2024 dentro de las estrategias de vigilancia salud publica la Subred Sur Occidente se continua con los lineamientos establecidos por la SDS para la implementación de las estrategias información, educación y comunicación, IEC y que la comunidad reconozca la importancia y las acciones de prevención y contención de los eventos transmisibles con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad en todos los ciclos de vida; en el análisis de indicadores por localidad y subred, se teniendo bases de datos depuradas, tablero de indicadores se tendrá y el seguimiento del tablero de control de indicadores y retroalimentación a las UPGD de los casos ingresados al sistema, con el histórico que garantice calidad. Para el producto, la subred realiza monitoreo de la información garantizando seguimiento de las unidades de servicio de salud de manera nominal (gestión de la información) verificando el cumplimiento del proceso de vigilancia en salud pública acorde con la normatividad nacional y distrital vigente, a través del seguimiento de indicadores de gestión mensual.

Para el año 2024 dentro de las estrategias de vigilancia salud publica la Subred Sur Occidente se continua con los lineamientos establecidos por la SDS para la implementación de las estrategias información,

DESARROLLO

educación y comunicación, IEC. Se fortalecen las temáticas en las cuales se evidencien debilidades técnicas y operativas del talento humano de la UPGD visibilizadas en las visitas de asistencia técnica y en el comportamiento histórico de esta y del monitoreo nominal por UPGD en el seguimiento por gestión de la información.Se socializaron los hallazgos y generaron acciones que contribuyan a mejora diagnóstico, análisis, comprensión y generación de conocimiento en la VSP, se incluyen los hallazgos relevantes identificados en el monitoreo de los eventos realizado a través de gestión de la información.

En La Subred Sur Occidente se realiza la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles como: Sarampión, Rubéola, Parotiditis, Tosferina, Difteria, Meningitis bacteriana y enfermedad Meningocócica, Poliomielitis, Tétanos, Varicela, Hepatitis B. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que es una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas.Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas debido a que estas pueden presentar complicaciones graves e incluso provocar la muerte. Las vacunas son seguras; son muy seguras; se deben tener precauciones, que son indicadas en el momento de la vacunación. Los riesgos de contraer una enfermedad grave por la no administración de una vacuna, son mucho mayores que el riesgo de la vacuna produzca una reacción peligrosa. Es así como para este mes por solicitud epidemióloga del SIVIGILA responsable del COVE hace propuesta para capacitación sobre Infección respiratoria Aguda y cierre de casos IRAG

1. VIGILANCIA SALUD PUBLICA DE LA TOSFERINA

La tos ferina es una enfermedad respiratoria grave y altamente contagiosa que afecta a personas de todas las edades. Tiene una alta morbimortalidad en recién nacidos y lactantes. La tos ferina sigue siendo un importante problema de salud pública, esto se debe a diversos factores, como los cambios antigénicos en la bacteria *Bordetella pertussis*, el diagnóstico tardío, el tratamiento inoportuno y la limitada utilización de la profilaxis después de la exposición. Además, la disminución de la inmunidad adquirida a través de las vacunas y la infección natural, así como las bajas tasas de vacunación en grupos específicos como adolescentes, embarazadas y adultos, los cuales contribuyen al resurgimiento de esta infección

La *Bordetella Pertussis* es un cocobacilo Gramnegativo que mide entre 0,2 y 0,5 µm de diámetro y entre 0,5 -2,0 µm de largo y se transmite de persona a persona a través de gotas respiratorias producidas al toser o estornudar, o por contacto directo con secreciones. Los síntomas suelen manifestarse de 7 a 10 días después de la exposición, aunque en lactantes pueden aparecer más rápidamente, con períodos de incubación que oscilan entre 4 y 21 días. Las tasas de ataque secundarias pueden alcanzar hasta un 90% entre los contactos de familiares susceptibles y de un 50% a un 80% en entornos escolares.
Algunos autores han estimado el número reproductivo básico **(Ro) de la tos ferina esta entre 12 y 17** personas, incluso más alto que el de la rubéola. Sin embargo, en otros estudios se ha reportado un Ro de 5.5 en personas susceptibles

Las manifestaciones clínicas de la *Bordetella Pertussis* varían según la edad y el estado de inmunización. Los síntomas más comunes son la tos paroxística (75%) y la tos emetizante (55%). En lactantes y niños no inmunizados, la enfermedad se presenta en tres fases:
Fase catarral: esta fase dura de una a dos semanas generalmente es afebril y se asemeja a un resfriado común, con síntomas como congestión nasal, rinorrea, enrojecimiento de los ojos, dolor de garganta y debilidad. En esta fase, el riesgo de transmisión es mayor.
Fase paroxística: se extiende de dos a seis semanas, a veces incluso hasta 10 semanas. Se caracteriza por episodios intensos de tos, que pueden alcanzar de 5 a 10 eventos en una sola exhalación,

DESARROLLO

acompañados de estridor. Estos episodios son más frecuentes durante la noche y pueden llevar a la cianosis y vómitos. En lactantes, la apnea puede ser el único síntoma destacado

Fase convaleciente: dura de una a doce semanas y se caracteriza por recuperación gradual, con disminución en la frecuencia de los episodios de tos. Sin embargo, pueden ocurrir recaídas de la tos paroxística, que a menudo están relacionadas con **coinfecciones virales o bacterianas**

En caso de tener un resultado negativo para *Bordetella pertussis*, se debe considerar el diagnóstico de infecciones que cursan con síntomas respiratorios y fiebre prolongada, como *Mycoplasma pneumoniae*, adenovirus, boca virus y el virus sincitial respiratiros, entre otras

POBLACION DE RIESGO: Identificación de población a riesgo (menores de un año (especialmente lactantes), niños menores de 7 años (esquema de vacunación incompleto), mujeres en embarazo (principalmente en el tercer trimestre), personas con inmunodeficiencias u otras enfermedades graves (bronquitis Crónica, cáncer o asma, trabajadores de salud, pediátricos, mujeres en trabajo de parto, post parto, pediatría, obstetricia)

El ser humano es el único reservorio y huésped; este microorganismo se aloja transitoriamente en la nasofaringe, y tiene características que lo hacen altamente patógeno por los múltiples productos antigénicos biológicamente activos que incluyen la toxina pertussis (PT), hemaglutinina filamentosa (FHA), aglutinógenos, adenilato ciclasa, pertactina y citotoxina traqueal, los cuales son los responsables de las características clínicas de la enfermedad.

El modo de trasmisión se da por contacto directo (persona a persona) a través de las gotas de secreciones o aerosoles que se expulsan de las mucosas respiratorias de una persona infectada a una no infectada.

La enfermedad es altamente contagiosa, se estima que la tasa de ataque de susceptibles expuestos alcanza entre el 80 % y el 100 %. La infección es especialmente trasmisible en su fase inicial catarral y llega a sus niveles más bajos de infectividad alrededor de la tercera semana en quienes no han recibido tratamiento antibiótico; una vez iniciado el tratamiento, el periodo de infección es alrededor de cinco días. La infección induce a una inmunidad humoral que solo protege de forma transitoria (8 a 12 años)

En recién nacidos y lactantes, la clínica puede caracterizarse por episodios de apnea y cianosis. En el lactante pequeño, las crisis de tos son más intensas, mientras que en adolescentes y adultos la tos persistente suele ser su única manifestación, que puede durar hasta varios meses
La presentación clínica suele comenzar con síntomas similares a los de un resfriado, en los lactantes la tos puede ser mínima o incluso estar del todo ausente, sin embargo, estos pueden presentar episodios de apnea que pueden durar entre 1 y 2 semanas.
A partir de la segunda semana pueden aparecer síntomas que incluyen

- **Paroxismos (accesos) o tos rápida seguida de un sonido de la respiración forzada y de alta frecuencia.**
- **Vómitos durante o después de los accesos de tos.**
- **Astenia: mucho cansancio después de la tos.**

La tos ferina presenta una mayor incidencia en lactantes a nivel global. **En Colombia, el Programa Ampliado de Inmunizaciones ha implementado una estrategia de vacunación que incluye la vacuna DTP (Difteria, tétanos y tos ferina). Esta vacuna se administra a los 2, 4 y 6 meses de edad, con un refuerzo de DTP a los 18 meses de edad. En 2013, el Ministerio de Salud y Protección Social de**

DESARROLLO

Colombia recomendó la aplicación de una dosis de la vacuna Tdap (Difteria, tétanos y tos ferina acelular) durante el embarazo, específicamente en la semana 26 de gestación. Esta medida tiene como objetivo proporcionar inmunidad pasiva al recién nacido a través de la transmisión de anticuerpos maternos, brindando protección

Usos y usuarios de la vigilancia para el evento : Realizar el seguimiento continuo y sistemático de los casos de tos ferina de acuerdo con los procesos establecidos para la notificación, recolección y análisis de los datos, que permita generar información oportuna, válida y confiable para orientar medidas de prevención y control de los eventos.

Definiciones operativas de caso La definición de caso para el evento en Colombia considera tres grupos de edad según protocolo del instituto nacional de salud 2024

1. **Caso probable: Menores de 3 meses:** Todas las infecciones respiratorias agudas con al menos uno de los siguientes **síntomas: accesos de tos (tos paroxística), estridor, apnea, cianosis, vómitos por acceso de tos.**

Menores de 3 meses a 12 años: Tos paroxística intensa de cualquier duración acompañada por estridor o, en ausencia de un diagnóstico más probable, todas las infecciones respiratorias agudas con tos que **dure más de 7 días y uno o más de los siguientes síntomas: tos paroxística, estridor, vómitos por acceso de tos.**

Mayores de 12 años: Todas las infecciones respiratorias con tos que dure más de 14 días, independientemente de la presencia de tos paroxística, expectoración o vómitos por acceso de tos.

2. **Caso confirmado por laboratorio:** Caso con resultado de cultivo o PCR positivo para *Bordetella pertussis*
3. **Caso confirmado por nexo epidemiológico:** Caso que está epidemiológicamente relacionado en forma directa a un caso confirmado por laboratorio.
4. **Caso confirmado por clínica:** Caso que no tiene muestra o que tiene muestra con fallas en el proceso de recolección, conservación o procesamiento, en el cual no se pudo demostrar la asociación epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio. Este caso requiere unidad de análisis.
5. **Caso descartado** Caso con **resultado negativo en cultivo* o PCR para *Bordetella pertussis*. En casos donde el resultado del cultivo sea negativo y los informes paraclínicos indiquen un conteo de leucocitos de entre 15,000 a 100,000 mm³ en la fase catarral, o de 30,000 a 40,000 mm³ en la fase paroxística, acompañados de una linfocitosis del 60% al 80%, se recomienda llevar a cabo un análisis epidemiológico más detallado para determinar la clasificación final del caso.**

Estrategias de vigilancia : En la vigilancia de tos ferina se empleará la vigilancia pasiva, la cual operará en las UPGD que conforman el sistema de vigilancia en salud pública, mediante: **Notificación super-inmediata, de casos probables a través de Sivigila 4.0**

La vigilancia activa se realizará mediante: Búsqueda activa comunitaria: se realiza en el marco de un caso probable, parte desde la vivienda del caso, se deben visitar los centros preescolares, las guarderías y las escuelas para explorar la aparición de los cuadros mencionados y en general todos los lugares de posibles desplazamientos del caso durante el periodo de transmisibilidad. En poblaciones indígenas se debe realizar la BAC en el 100 % de la comunidad.

Vigilancia basada en comunidad (VBC) De acuerdo con la OMS, la vigilancia basada en comunidad es la detección sistemática y el reporte de eventos (situaciones) de interés en salud pública en la comunidad, por miembros (agentes) de esta misma. Representa un enfoque participativo que involucra a los propios miembros de la comunidad en la observación y reporte de casos. Este método busca no solo recolectar datos sobre el comportamiento del evento.

Si en una comunidad indígena se identifica a un menor de tres meses que muestra signos visuales de dificultad respiratoria, tales como paradas repentinas de la respiración seguidas de su reanudación

DESARROLLO

después de un breve período de tiempo (apnea), este menor debe recibir atención hospitalaria inmediata.

Recomendaciones

Si se identifican menores de un año con signos respiratorios como: coloración morada de la piel (cianosis), tos agresiva y continua en un solo tiempo (tos paroxística), movimientos rápidos donde el pecho del menor se hunde y se pueden notar las costillas (disnea), o se observa que el menor vomita tras la tos, se debe acudir de manera inmediata a un centro hospitalario.

En adolescentes o adultos: sospecha tos ferina. **Si hay tos durante más de siete días,** es importante que se **intensifique el lavado de manos y uso de tapabocas. Además, evitar el contacto con recién nacidos y menores de dos meses**, quienes son vulnerables a la enfermedad porque no cuentan recibido la primera dosis de la vacuna contra el (DPT)

Las madres de un menor de un año deben estar atentas al cronograma de vacunación de su hijo. La tos ferina es una enfermedad que se puede prevenir mediante la vacunación, por ende, estará contribuyendo a su bienestar y protección.

La atención en un menor de tres meses o de un año, es de vital importancia, ya que el tiempo entre el inicio de los síntomas y el tratamiento está relacionado con la oportunidad de supervivencia del niño.

En embarazadas, es importante que se vacunen contra la tos ferina al cumplir la semana 26 de gestación. Esto garantizará la protección del niño desde el momento del nacimiento hasta que se le administre la primera dosis de DPT a los dos meses

Se debe realizar IEC en las primeras 72 horas de notificado el caso y realizar el seguimiento y búsqueda de contactos.

Realizar unidad de análisis al 100 % de las muertes por tos ferina, casos probables sin muestra y casos con resultado de cultivo negativo y con reporte de paraclínicos con leucocitos entre 15 000 a 100 000 mm3 en las fases catarral o 30 000 a 40 000 mm3 en la fase paroxística y linfocitosis entre 60 % a 80 %; se deben enviar al Instituto Nacional de Salud en los tiempos establecidos en los lineamientos nacionales y subir al aplicativo UA del INS.

Garantizar equipos de respuesta inmediata para la atención de brotes y situaciones de emergencia en salud pública

Generar estrategias de divulgación como boletines epidemiológicos, COVE, informes de evento, tableros de control, entre otros.

Orientar medidas de control: aislamiento (cinco días en personas con tratamiento completo y 21 días en personas que no recibieron tratamiento), lavado de manos, uso de tapabocas.

Verificar los antecedentes de vacunación (número de dosis de DPT recibidas según la edad del caso y los contactos menores de cinco años), **Antecedente vacunal de las madres con Tdap para menores de dos meses**.

A nivel mundial, la vacuna DPT, que protege contra la difteria, tos ferina y tétanos, logró una cobertura del 89% para la primera dosis y del 84% para la tercera dosis, según reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022.

Se realizará seguimiento a todos los casos confirmados y sus contactos estrechos para asegurar y limitar cadenas de transmisión

- Antecedentes de contactos cercanos sintomáticos y asintomáticos de todas las edades e individuos susceptibles

ADMINISTRACION DE QUIMIOPRFILAXIS

- **Fuente: Protocolo de la vigilancia salud pública de la tosferina, versión 5 de 16/0472024 del INS**

DESARROLLO

DIAGNOSTICO a todo caso probable de tos ferina se le debe tomar muestra (hisopado nasofaríngeo, aspirado nasofaríngeo), el no obtener muestra significa un fallo en la vigilancia del evento, se debe realizar una buena recolección de muestras nasofaríngeas y su posterior envió. Se debe incentivar la realización del cultivo con el fin de identificar el agente etiológico y los cambios de la cepa circulante. Muy importante se debe confirmar **los aislamientos de *Bordetella spp* y realizar el envío de cepas confirmadas al laboratorio de referencia**

La tos ferina puede ser diagnosticada mediante PCR en tiempo real (sensibilidad del 70-99 %, especificidad del 86-100 %), o cultivo (sensibilidad 12-60%, especificidad 100 %).

Análisis de cultivo : El cultivo será positivo para *Bordetella pertussis* cuando se **observe un crecimiento de colonias sospechosas en Agar Regan Lowe con cefalexina (RL +C) y Agar Regan Lowe sin cefalexina (RL-C), entre 48 y 72 horas**, con positividad para catalasa y oxidasa, adicional la siguiente confirmación bioquímica: No crecimiento en citrato , Ureasa negativa , Nitrato negativo , Motilidad negativa

Periodicidad de la notificación: Todos los casos de tos ferina deben **notificarse de manera super – inmediata.** Una vez una UPGD reporta en el aplicativo Sivigila el caso probable, genera una **alerta por correo electrónico a los actores determinados de INS**, secretarias de salud (de procedencia, notificación y residencia) y EAPB, aumentando la oportunidad en la detección y el inicio de las acciones individuales.

La obtención de **muestra para el diagnóstico de tos ferina debe realizarse antes del inicio del tratamiento antimicrobiano** en especial para análisis de cultivo. Sin embargo, en el caso de que el **paciente hubiese iniciado el tratamiento, se** podría únicamente **analizar la muestra respiratoria por ensayos moleculares** antes del tercer día que haya iniciado la antibioticoterapia. En caso de que la muestra se tome después de este plazo y el resultado sea negativo, se debe llevar a cabo un análisis más completo del caso para dar una clasificación final.

Notificación inmediata: La notificación inmediata es aquella que se consolida diariamente de los casos notificados por super – inmediata, en cada nivel del sistema.

Ajustes : Los ajustes y clasificación final de los casos probables de Tos ferina deben realizarse máximo en 4 semanas epidemiológicas desde la notificación del caso; los siguientes son los tipos de ajuste permitidos:

Ajuste 3: Confirmado por laboratorio
Ajuste 4: Confirmado por clínica
Ajuste 5: Confirmado por nexo epidemiológico
Ajuste 6: Descartado por laboratorio o unidad de análisis
Ajuste D: Error de digitación con envió de acta y reingreso del evento, pantallazo + HC +archivo /pantallazo SIVIGILA 4.0

Investigación epidemiológica de campo (IEC) Se debe realizar ante todo caso probable y confirmado en las primeras 72 horas posteriores a la notificación.

UNIDAD DE ANALISIS: Se debe llevar a cabo el análisis del 100 % de las muertes por tos ferina. Casos probables sin muestra y casos con resultado de cultivo negativo y con reporte de paraclínicos con leucocitos entre 15 000 a 100 000 mm3 en las fases catarral o 30 000 a 40 000 mm3 en la fase paroxística y linfocitosis entre 60 % a 80 %. Se deben enviar al Instituto Nacional de Salud en los tiempos establecidos en los lineamientos nacionales y subir al aplicativo de UA del INS. (el tiempo se tiene en cuenta a partir de la notificación del caso)

Realizar unidad de análisis de todo caso probable vivo o muerto sin muestra y a toda muerte con resultado positivo para *Bordetella pertussis* dentro de los tiempos establecidos en los lineamientos.

BUSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL: Se debe realizar de manera periódica y mensual en UPGD que presenten silencio epidemiológico mayor a cuatro semanas epidemiológicas. Para distrito Capital SE

DESARROLLO

TIENE la circular 08 del 20 de febrero de 2024, donde se establece alerta epidemiológica para infección respiratoria y tosferina donde la BAI se hace cada 8 días con los parámetros ya establecidos por referente SDS

Reporte de situación: El primer Reporte de Situación (SITREP) debe generarse dentro de las 24 horas posteriores a la notificación inicial. La frecuencia de los informes posteriores debe seguir las pautas establecidas por la entidad territorial o actualizarse en función de nueva información que surja durante la respuesta

Situación de alarma, brote y emergencia en salud pública Se define un brote de tos ferina como la aparición de dos o más casos relacionados, con al menos uno de ellos confirmado por laboratorio. Además, se considera brote cuando se presenta un solo caso en una población de seguimiento de interés para el evento, como población indígena, escuela o jardín infantil. En todos estos casos, se requiere una intervención epidemiológica para controlar la propagación de la enfermedad.

Cierre del brote: El brote se considera cerrado cuando no se presenten casos adicionales durante un periodo de incubación largo, que es de 42 días a partir de la fecha de inicio de síntomas del último caso confirmado. El informe final de cierre debe consolidar de manera detallada todas las acciones llevadas a cabo para controlar la situación

Comportamiento del Indicador para la Tos ferina el cual garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se revisa con regularidad utilizando en forma sistemática, los casos notificados mes a mes es así como se tiene un acumulado de cero por cada 100.000 menores de un año en la Subred Sur Occidente, donde se presentaron cero casos de tos ferina, según la clasificación del ajuste final por localidad se tiene un acumulado de 56 casos y por localidad Kennedy en total 31 casos de los cuales se descartan 27 , positivos cero casos, pendiente 4; Fontibón con un total 4,descartados 4, positivos cero, pendiente cero; Bosa 17 casos con ajuste de 13 descartados, positivos cero, 4 pendientes; Puente Aranda 4 casos , de los cuales se descartan 3, positivos cero, pendiente 1.

2. **VIGILANCIA DE RUBEOLA Y SARAMPION E INDICADORES**

Los ministros de salud de las Américas acordaron en 1994 la meta de erradicación del sarampión para el año 2000. En el año 2003 se estableció la meta de eliminación de la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) en toda la Región para el año 2010.Colombia el ministerio de Protección Social emitió la circular 006 de 2018 con instrucciones permanentes para prevención, atención, vigilancia y control de sarampión en el país ante la posible aparición de un caso importado. El 22 de enero de 2014 la Comisión Internacional de Expertos declaró a Colombia libre de la circulación de virus autóctonos de sarampión y rubéola, con lo cual la nación marca otro hito en la erradicación/eliminación de enfermedades prevenibles por vacuna y el 21 de enero de 2022 la OPS y OMS y la Comisión Regional para Seguimiento y Re-verificación del sarampión, rubeola y SRC, otorgaron a Colombia nuevamente la certificación de país libre de sarampión y rubéola

La eliminación del sarampión y la rubéola (SR) se mantienen como prioridad política sanitaria y en su contexto el país ha desarrollado intensas actividades los últimos 20 años. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), a través de la vacunación de rutina a los niños de 12 meses y de cinco años y por medio de campañas de seguimiento a la cohorte de uno a cuatro años ha obtenido coberturas de vacunación superiores al 90 %. Además, se han implementado otras estrategias para aumentar la inmunidad de la población como la vacunación del grupo de 14 a 39 años en 2005, entre otras. En Colombia, como parte de las estrategias para mantener los eventos en eliminación, se logró la certificación desde 2018 como un país libre de sarampión, rubéola y el síndrome de rubéola congénita.

DESARROLLO

Objetivo : Realizar el seguimiento continuo y sistemático de los casos sospechosos de sarampión y rubéola, mediante el proceso de notificación, recolección y análisis de los datos, con el fin de generar información oportuna, válida y confiable, que permita orientar las medidas de prevención y control del evento.

VIGILANCIA SALUD PÚBLICA DEL SARAMPION

El sarampión es una enfermedad eruptiva aguda, sumamente contagiosa causada por un virus; clínicamente se diferencian **dos etapas en la enfermedad: la primera, llamada fase prodrómica, pre-exantemática o catarral, se caracteriza por fiebre de 38,5° C a 40,5° C y síntomas de las vías aéreas superiores, tos y coriza (rinorrea), además de una fuerte conjuntivitis; en algunas ocasiones, es posible detectar las llamadas manchas de Koplik, signo característico del sarampión.**

La segunda fase, llamada exantemática o eruptiva, se presenta al tercer o cuarto día después del inicio de la enfermedad y se refiere a una erupción característica con manchas rojas parduscas, que comienzan en la cara y después se generalizan; dura de cuatro a siete días y a veces termina con una descamación fina

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, con el potencial de ser extremadamente grave, las complicaciones más frecuentes como neumonía y encefalitis requieren hospitalización en una cuarta parte de los casos pueden llevar a una discapacidad por daño cerebral, ceguera o pérdida auditiva

CARATERISTICAS GENERALES

Agente etiológico: El virus de sarampión pertenece al género *Morbillivirus* de la familia *Paramyxoviridae*

Modo de transmisión: Se transmite principalmente por medio de gotitas expulsadas del aparato respiratorio (por ejemplo, al toser o estornudar) o suspendidas en el aire, las cuales entran en contacto con las vías respiratorias superiores o la conjuntiva de una persona susceptible.

Período de incubación: Es de 7 a 21 días, con un promedio de 14 días desde la exposición hasta la aparición del exantema.

Período de transmisibilidad: El sarampión puede transmitirse desde cuatro días antes de la aparición del exantema (es decir, de uno a dos días antes del inicio de la fiebre) hasta cuatro días después. La mayor infectividad se produce tres días antes del inicio del exantema

Susceptibilidad: Todas las personas que no han sido inmunizadas adecuadamente o que no han padecido la enfermedad son susceptibles. Los recién nacidos (si su madre ha tenido la enfermedad o ha sido vacunada), suelen ser protegidos por los anticuerpos maternos, pero pierden la inmunidad entre los 5 a 12 meses de edad. Alrededor de 5-10 % de los niños vacunados puede no tener una respuesta inmune adecuada (falla vacunal), por lo que requerirán una segunda dosis para estar protegidos. Se han notificado tasas de ataque entre el 75 % al 80 % entre contactos en el hogar. La eficiencia de la transmisión del sarampión es tal que se han reportado brotes en poblaciones donde sólo entre 3 % y el 7 % de las personas era susceptible.

Reservorio: El ser humano es el único huésped natural del virus del sarampión.

Comportamiento del Indicador para el sarampión el cual garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se revisa con regularidad utilizando en forma sistemática, los casos notificados mes a mes es así como se tiene un acumulado de una Tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión de 2,5 x 100000 habitantes DANE, en la Subred Sur Occidente, donde

DESARROLLO

se tiene cero casos de sarampión positivos, según la clasificación del ajuste final por localidad se tiene un acumulado de 62 casos y por localidad Kennedy en total 27 casos de los cuales se descartan 14, positivos cero casos, pendiente 13; Fontibón con un total 10,descartados 8, positivos cero, pendiente 2; Bosa 23 casos con ajuste de 15 descartados, positivos cero, 8 pendientes; Puente Aranda 2 casos , de los cuales se descartan 1, positivos cero, pendiente 1.

VIGILANCIA SALUD RUBEOLA

Es una enfermedad infecciosa, exantemática, viral, aguda, altamente contagiosa, caracterizada por fiebre, rash máculo-papular difuso puntiforme; los niños usualmente presentan pocos o ningún síntoma, pero los adultos pueden presentar pródromos por 1-5 días de fiebre leve (<39°C), cefalea, malestar general, coriza y conjuntivitis

La característica clínica más relevante es la presencia de linfadenopatías pos-auriculares, occipitales y cervicales posteriores y precede al rash en 5-10 días. El exantema tiene máxima intensidad en el segundo día y desaparece hasta el sexto día; no se presenta descamación

Agente etiológico: Virus de la rubéola, del género *Rubivirus*, familia *Togaviridae*.

Modo de trasmisión: Contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas, también se describe el contagio por dispersión de partículas virales en el aire de ambientes cerrados y hacinados como reclusiones militares, escuelas, jardines infantiles, clínicas, entre otros. **Los niños con SRC albergan gran cantidad de virus en sus secreciones nasofaríngeas y en la orina, y sirven como medio de infección para sus contactos.**

Período de incubación: De 14 días, con un rango entre 12 – 23 días

Período de transmisibilidad: Las personas infectadas con rubéola son más contagiosas cuando presentan la erupción, pero pueden ser contagiosas 7 días antes hasta 7 días después de que aparezca la erupción, 25% a 50% de las infecciones son asintomáticas

Susceptibilidad: La susceptibilidad al virus de la rubéola es universal después de la pérdida de los anticuerpos maternos adquiridos a través de la placenta. La inmunidad activa es adquirida por la infección natural o por la vacunación; es usualmente permanente después de la infección natural y tiende a permanecer por largo tiempo, probablemente por toda la vida después de la vacunación. **Los hijos de madres inmunes están protegidos por 6-9 meses dependiendo de la cantidad de anticuerpos maternos adquiridos.**

Reservorio: El hombre es el único huésped natural del virus de la rubéola.

El sarampión y la rubéola se deben diferenciar de otras enfermedades febriles exantemáticas (EFE), síndrome febril ictérico agudo, síndrome febril respiratorio agudo, síndrome febril con manifestaciones neurológicas que presenten fiebre y erupción cutánea. Los principales agentes diferenciales son: roséola, eritema infeccioso, escarlatina, dengue, Chikunguña, Zika, COVID-19 y MIIS-C

La rubéola es prevalente en invierno y primavera (estacionalidad); en el trópico, el aumento del número de casos ocurre durante la estación seca; en poblaciones no inmunizadas es una enfermedad de la niñez. En poblaciones con niños bien inmunizados, la enfermedad se desplaza de manera importante a los adultos jóvenes y adolescentes, con epidemias en poblaciones cerradas

El 20 al 50 % de los casos de rubéola se presentan de manera subclínica. Esta proporción de casos subclínicos aumentan con la edad, se estima que por cada caso de enfermedad con signos y síntomas claros hay dos a tres casos de rubéola subclínica en niños, mientras que en el adulto esta relación es de 1:7 a 1:9, sobre todo en adultos jóvenes

DESARROLLO

Prevención

Se prefiere la vacuna combinada contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (vacuna triple viral o SRP) para garantizar la inmunidad contra los tres virus. En Colombia, la vacunación con triple viral se realiza al año de vida y con un refuerzo a los cinco años con el objetivo de captar niños susceptibles que no recibieron la primera dosis o que no respondieron a la vacuna.

DIAGNOSTICO: Es obligatorio la recolección de suero, hisopado nasofaríngeo o faríngeo y orina al momento de identificar el caso sospechoso. En caso de muerte se deben asegurar corte de tejido de 1x1 cm para los siguientes órganos: faringe, pulmón, cerebro, riñón, hígado y bazo.

El diagnóstico de sarampión y rubéola se realiza mediante la detección de anticuerpos IgM, seroconversión o aumento de títulos de anticuerpos IgG en muestras pareadas, pruebas de avidez o detección del material genético en pruebas moleculares.

Siempre que se obtenga un resultado positivo o dudoso para anticuerpos IgM, se debe solicitar la recolección de una segunda muestra de suero tomada 15-20 días después de la primera. Esta segunda muestra debe enviarse inmediatamente al laboratorio nacional de referencia del INS para realizar la cuantificación de anticuerpos IgG en las dos muestras del caso.

La muestra de suero debe recolectarse asépticamente en un volumen de 5 ml de sangre total en tubos estériles y libres de aditivos; se debe evitar la hemólisis. Para lograr el máximo rendimiento de los sueros, la sangre recolectada se debe dejar a temperatura ambiente por 15 minutos y luego se coloca en hielo o en refrigeración a 4°C hasta su centrifugación.

Toma de muestra para detección viral: se debe recolectar una muestra faríngea o nasofaríngea y de orina a todo caso sospechoso que se encuentre dentro de los siete días siguientes al inicio de la erupción. La detección viral por medio de la prueba de RT- PCR se realiza en el laboratorio nacional de referencia del INS. La muestra ideal es la primera orina de la mañana recolectada en envase estéril durante la mitad de la micción. • Se debe mantener y enviar al laboratorio de salud pública departamental a 4°C (refrigerada, NO congelada).

Para la recolección de la muestra faríngea o nasofaríngea se debe tener en cuenta lo siguiente. Se pueden utilizar hisopos de madera, pero son preferibles los de alginato. Se debe frotar las fosas nasales y la faringe (separadamente, con hisopos diferentes) de manera que se obtengan células, las cuales se re suspenden en el MTV agitando el hisopo y escurriéndolo contra las paredes del recipiente. Conservar a 4°C y enviar refrigerado dentro de las 24 horas siguientes al LNR

ANALISIS DE RESULTADOS LABORATORIO

Primera muestra: Si el resultado de la primera muestra IgM es negativo se descarta el caso. Si el resultado de IgM es positivo o dudoso se toma una segunda muestra de suero (a los 15 días de la primera muestra). En muestras de suero recolectadas de manera temprana (antes de 3 días del inicio de la erupción) es necesario analizar en conjunto con los resultados de pruebas moleculares para el hisopado y orina

Segunda muestra : Si el resultado de IgM es negativo se descarta el caso (es importante verificar si hay aumento en los títulos de IgG). Si el resultado de IgM es positivo se procesa títulos de anticuerpos IgG y PCR (reacción en cadena de la polimerasa)

Si el resultado de IgG tiene un aumento en los títulos comparando primera y segunda muestra de cuatro veces el título, se confirma el caso. Se debe analizar con antecedente de vacunación reciente. Si el resultado de IgG en las muestras pareadas es negativo o no hay aumento en los títulos se descarta el caso. Alta avidez descarta caso

Baja avidez confirma caso

DESARROLLO

Con un resultado positivo de PCR se confirma el caso

Con un resultado negativo de PCR se descarta el caso.

Situación de alarma, brote y emergencia en salud pública: un caso confirmado se considera brote, el análisis de la información se realizará de manera oportuna e inmediata, tomando como fuente la información epidemiológica producto de la caracterización inicial de los casos, la investigación epidemiológica de campo, la información clínica de cada caso y la información proveniente de las pruebas de laboratorio realizadas de acuerdo con los lineamientos publicados por la Dirección de Redes en Salud Pública. El cierre del brote se realizará después de doce semanas desde la fecha de inicio de erupción del último caso confirmado. Se debe garantizar que todos los casos sospechosos notificados en este periodo se encuentren clasificados, documentar el seguimiento de contactos y realizar BAI y BAC

Los ajustes y clasificación final de los casos: se deben realizarse máximo en ocho (8) semanas epidemiológicas desde la notificación del caso, demanda los siguientes tipos de ajuste:

▪ Ajuste 3: confirmado por laboratorio
▪ Ajuste 4: confirmado por clínica
▪ Ajuste 5: confirmado por nexo epidemiológico
▪ Ajuste 6: descartado por laboratorio o unidad de análisis
▪ Ajuste D: error de digitación con envió acta, archivo, ficha e HC

DEPURACION DE BASE

- Para la depuración de la base de casos sospechosos se debe excluir los casos con ajuste D (error de digitación), casos repetidos por número de documento y por nombres y apellidos. El análisis de la información se realiza a partir de la fecha de inicio de erupción y la procedencia del caso. Para el indicador de tasa de notificación se calcula
- En los casos sospechosos sin antecedente de riesgo, analizar el antecedente vacunal para clasificar como posible reacción inmunológica post vacunal
- En casos confirmados se debe evaluar antecedente vacunal, antecedente de viaje a países con circulación viral para identificar la fuente de infección. Se requiere tener resultados de secuenciación genómica y analizar la ancestralidad de la cepa detectada. Calcular tasa de incidencia por grupo de edad.

Unidad de análisis: Las unidades de análisis de casos de sarampión/rubéola con resultados IgM dudosos o positivos sin segunda muestra, casos sin muestra o de casos fallecidos, se realizarán de conformidad a la metodología propuesta por el grupo de unidad de análisis de casos especiales del INS

Intervenciones

• Búsqueda activa comunitaria: Parte desde la vivienda del caso sospechoso y se deben cubrir nueve manzanas alrededor del caso, siguiendo las manecillas del reloj

- Investigación epidemiológica de campo: debe realizarse dentro de las primeras 48 horas siguientes a la notificación ,realizar censo de contactos hospitalario y comunitarios verificar antecedente vacunal y signos y síntomas compatibles con la enfermedad , BAC de 9 manzanas a la redonda y promover la vacunación con triple viral o adicional SR

- Garantizar coberturas óptimas de vacunación para sarampión y rubéola en las 9 manzanas del caso.

- En caso de muerte sospechosa, asegurar los procesos de **necropsia, toma de muestras, procesamiento y envío de muestras al laboratorio Nacional** de Referencia para análisis

DESARROLLO

patológicos y virológicos. En el caso de necropsia médico-legal, deberá asegurar que el prestador de servicios de salud en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando corresponda, envié las muestras al INS de acuerdo con sus lineamientos.

- Remitir en los tiempos establecidos las unidades de análisis de casos de SR con resultados IgM positivo o dudoso y casos sin muestra independiente de la condición final (vivos o muertos)
- Orientar las medidas de control con: higiene de manos, uso de tapabocas, limpieza y desinfección de áreas y utensilios, aislamiento del caso sospechoso, evitar el contacto innecesario.
- Seguimiento de contactos durante 30 días desde la fecha de erupción del caso índice. Si identifica un caso sospechoso asegurar la notificación, recolección, envío de muestras y demás acciones individuales mencionadas anteriormente

Periodicidad de los reportes

Notificación super inmediata: Una vez la UPGD reporta en el aplicativo Sivigila 4.0, el caso sospechoso de SR genera un archivo plano inmediato a correos determinados en INS y de las secretarias de salud (procedencia, notificación y residencia) aumentando la oportunidad en la detección y el inicio de las acciones individuales

Notificación inmediata: Todos los casos sospechosos de sarampión y rubéola deben notificarse de manera inmediata e individual en cada nivel del sistema.

Notificación semanal: Los casos sospechosos de sarampión y rubéola deben reportarse semanalmente de manera acumulada, de conformidad a la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.

Notificación negativa: Cada semana se debe indicar si no se reportaron casos de sarampión o rubéola

Comportamiento del Indicador para rubeola el cual garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se revisa con regularidad utilizando en forma sistemática, los casos notificados mes a mes es así como se tiene un acumulado de una Tasa de notificación de casos sospechosos de rubéola de 0,49 x 100000 habitantes DANE, en la Subred Sur Occidente, donde se tiene cero casos de rubeola positivos, según la clasificación del ajuste final por localidad se tiene un acumulado de 12 casos y por localidad Kennedy en total 4 casos de los cuales se descartan 3, positivos cero casos, pendiente 1; Fontibón con un total 3, descartados 0, positivos cero, pendiente 3; Bosa 3 casos con ajuste de 1 descartados, positivos cero, 2 pendientes; Puente Aranda 2 casos , de los cuales se descartan cero, positivos cero, pendiente 2.

3. VIGILANCIA SALUD PUBLICA SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA SRC

OBJETIVOS

- Describir en términos de variables de persona, tiempo y lugar el comportamiento de los casos notificados de SRC.
- Realizar seguimiento a los indicadores establecidos para mantener la certificación de la eliminación de SRC.
- Detectar y confirmar oportunamente la circulación del virus salvaje de la rubéola.

La rubéola es una causa frecuente de exantema y fiebre en la población infantil y su importancia para la salud pública radica en los efectos teratógenos de la primoinfección rubeólica en la mujer embarazada . La

DESARROLLO

pandemia mundial de rubéola entre 1962 y 1965 puso de manifiesto la importancia del síndrome de rubéola congénita.

Cuando la infección se presenta en el primer trimestre del embarazo, el riesgo de aborto espontáneo aumenta aproximadamente en 50.% (12). Las manifestaciones clínicas del SRC pueden ser transitorias (púrpura), estructurales permanentes (sordera, defectos del sistema nervioso central, cardiopatía congénita o cataratas) o afecciones de aparición tardía (diabetes mellitus).

La infección materna antes de la 19ª semana de gestación puede causar sordera neurosensorial, mientras que la catarata y la cardiopatía sólo se producen cuando la infección es anterior a la 9ª semana de gestación. El riesgo de defectos congénitos varía de acuerdo con la semana de gestación en la que se presentó la infección

Características del virus de la rubéola y la enfermedad

Agente etiológico: Es un virus RNA que pertenece a la familia Togavirus (*Togaviridae*) y al género *Rubivirus* y no tiene reacción cruzada con otros miembros de la familia. Es un virus inestable, termolábil, y es rápidamente inactivado por agentes químicos, cambios del pH, y sensible a la luz ultravioleta.

Modo de transmisión : La mujer embarazada entra en contacto con secreciones nasofaríngeas de las personas infectadas, por contacto directo con la secreción o a través de gotas expulsadas por una persona enferma al hablar, estornudar o toser. Se estima que de 25 % a 50 % de las infecciones son asintomáticas. En la mujer embarazada durante la viremia, el virus puede infectar la placenta. Al parecer la replicación en la placenta precede a la infección fetal y permite la entrada del virus en la circulación fetal seguida de la infección fetal de los órganos. Los lactantes con rubéola congénita expulsan grandes cantidades de virus con las secreciones faríngeas y con la orina, y, en consecuencia, son fuente de infección para sus contactos susceptibles.

Período de incubación : El periodo de incubación es de 14 a 23 días desde el momento de la exposición hasta la aparición de los primeros síntomas. La mayoría presentan el exantema después de 14 a 17 días de haber estado expuesto al virus.

La susceptibilidad es general después que el recién nacido pierde los anticuerpos adquiridos a partir de los anticuerpos maternos. Los lactantes generalmente permanecen protegidos por los **anticuerpos de la madre durante los primeros seis a nueve de meses de vida**. La inmunidad activa se adquiere por medio de la infección natural o por la vacunación. La inmunidad activa es duradera, y se ha establecido que se prolonga toda a vida. Ocasionalmente se ha demostrado reinfección. La susceptibilidad es general en poblaciones no vacunadas o que no han sido expuestas al virus. Se estima que en América Latina de 25 % a 30% permanece susceptible. La rubéola congénita depende del número de mujeres en edad fértil susceptibles.

Reservorio: El ser humano es el único huésped natural del virus de la rubéola

Diagnóstico: A todos los casos de sebe Tomar sangre del cordón umbilical del recién nacido, o recolectar muestra de sangre periférica en el momento de captación del caso. **Recolección de muestras para aislamiento viral o detección viral** Las muestras para detección deben ser recolectadas de preferencia a niños menores de tres meses de edad. **La rubéola congénita puede ser diagnosticada por serología a través del procesamiento de IgM o persistencia de IgG en la sangre del recién nacido y detección del virus.**

Los exámenes de laboratorio son imprescindibles para establecer el diagnóstico definitivo. Para la investigación de casos sospechosos de SRC debe extraerse una muestra de sangre para detección de IgM y una muestra de hisopado faríngeo o nasofaríngeo y orina para aislamiento viral después del nacimiento, cuando las sospechas confirmen la infección materna durante la gestación o bien después de surgir la sospecha diagnóstica en menores de un año.

Los niveles de IgM en el niño con SRC son detectables por más de un año. Se reporta que hasta en

DESARROLLO

100 % de los menores de seis meses con SRC son IgM (+) y que 60 % continúa con títulos positivos al año. en los análisis de anticuerpos IgM, en los casos de obtener resultado positivo o dudoso, envían la muestra al laboratorio del INS para confirmar el resultado. En los análisis de anticuerpos IgM, en los casos de obtener resultado positivo o dudoso, envían la muestra al laboratorio del INS para confirmar el resultado.

Detección viral Un resultado de RT-PCR (Real Time - Polymerase Chain Reaction) positivo para rubéola en muestras de las secreciones de oro/nasofaríngeo o de orina, demostrará la presencia del virus y confirmará el caso. Pruebas moleculares de secuenciación permitirán establecer el genotipo circulante

Pruebas serológicas : Primera muestra Si el resultado de anticuerpos IgM es negativo se descarta el caso.

Segunda muestra: Se procesa anticuerpos IgM.

Se procesa anticuerpos IgG (primera y segunda muestra, el mismo día, el mismo examinador).

Si el resultado de anticuerpos IgM es negativo se descarta el caso.

Si el resultado de anticuerpos IgG en la primera muestra es negativo se descarta el caso.

Si el resultado de anticuerpos IgG en la primera y segunda muestra es negativo se descarta el caso

Si el resultado de anticuerpos **IgG entre la primera y segunda muestra evidencia aumento al doble en los títulos (seroconversión) se confirma el caso**

Si el resultado de anticuerpos IgG entre la primera y segunda muestra no evidencia aumento en los títulos se descarta el caso.

Con el resultado negativo de PCR se descarta el caso.

En casos con hallazgos **serológicos de difícil interpretación** se debe realizar pruebas adicionales para otros virus como **Parbovirus B19, citomegalovirus, herpesvirus entre otros.**

Además, a criterio del laboratorio del INS se realizará **prueba de Avidez para anticuerpos IgG específicos de rubéola y con ello establecer un contacto reciente (menor a 3 meses) o antiguo con el virus de la rubéola.**

La clasificación final los casos se realizará de acuerdo con el análisis epidemiológico, factores de riesgo y los resultados de laboratorio.

La OPS aconseja a todos los países de las Américas fortalecer la vigilancia activa y preservar una alta inmunidad en la población mediante la vacunación. Por ende, la vigilancia de este evento es esencial para conservar los logros alcanzados en la eliminación de estas enfermedades en Colombia y para realizar un seguimiento eficaz del cumplimiento de los indicadores internacionales de vigilancia

Realizar el seguimiento continuo y sistemático de casos sospechosos de SRC, mediante el proceso de notificación, recolección y análisis de los datos, con el fin de generar información oportuna, válida y confiable, que permita orientar las medidas de prevención y control del evento. Un caso confirmado debe ser considerado como un brote.

Definiciones operativas de caso para Síndrome de Rubéola Congénita

CASO SOSPECHOSOS : Menor de 1 año en quien se sospecha SRC debido a:

1. Se le ha **detectado una o más de las siguientes anormalidades luego del nacimiento**: defectos cardiacos congénitos, ductus arterioso persistente (documentado), estenosis de arteria pulmonar, cataratas congénitas, retinopatía, sordera, hipoacusia, microcefalia, hepatomegalia, esplenomegalia, púrpura, ictericia persistente asociada a la hiperbilirrubinemia directa; o
2. **Existe una historia de infección por rubéola** (confirmada o sospechosa) de la madre durante el embarazo. **Nota: el bajo peso al nacer como único signo no debe ingresar al Sistema de vigilancia como sospecha de SRC**.

CASOCONFIRMADO POR LABORATORIO Todo caso sospechoso de SRC que tenga una de las siguientes pruebas de laboratorio positivas:

DESARROLLO

1. Demostración de anticuerpo IgM específico para rubéola
2. Aumento significativo en los títulos de anticuerpos IgG para rubéola en dos muestras de suero pareadas (fase aguda y convaleciente) tomadas con un mes de diferencia
3. Detección del virus de rubéola en nasofaringe, orina o suero por PCR o cultivo positivo para virus de rubéola

Caso confirmado clínicamente: Todo caso sospechoso de SRC que no está confirmado por laboratorio y que carece de evidencia de cualquier otra etiología y para el cual no hay una muestra adecuada de suero o para aislamiento viral (**se considera una falla de la vigilancia**).

Infección por Rubeola Congénita IRC Esta designación se usa **para lactantes con anticuerpos IgM anti-rubéola positivos, pero sin hallazgos clínicos de SRC**. Estos no son casos de SRC. Sin embargo, el diagnóstico de SRC no será definitivo hasta no haber descartado la sordera mediante algún método confiable (sensibilidad y especificidad elevadas) como los potenciales evocados. Por ello, estos casos **deben ser objeto de seguimiento en los consultorios de crecimiento y desarrollo.**

CASO DESCARTADO Caso sospechoso con una muestra adecuada de suero **cuyo resultado ha sido negativo para anticuerpos tipo IgM** específicos de rubéola.

CASO IMPORTADO: Lactante con SRC confirmado cuya madre adquirió la infección por el virus de la rubéola fuera de Colombia, en ausencia de una infección documentada por rubéola, la madre estaba fuera de Colombia durante el periodo en el que pudo haber estado expuesta a la rubéola que afectó a su embarazo (de 23 días antes de la concepción o hasta la semana 24 de gestación).

CASO RELACIONADO CON UNA IMPORTANCION: Lactante con SRC confirmado cuya madre, según pruebas epidemiológicas o virológicas, estuvo expuesta localmente al virus y formó parte de una cadena de transmisión que se inició con un caso importado.

ESTRATEGIA DE LA VIGILANCIA:

Notificación super-inmediata, inmediata.

Notificación negativa semanal: indicar si no se presentó ningún caso de SRC.

Durante la notificación es fundamental verificar la calidad del dato de todas las variables con énfasis en la procedencia del caso.

Reporte y diferenciación entre los casos de infección por rubéola congénita y casos de SRC.

La vigilancia activa se realizará mediante: Búsqueda secundaria de casos (Búsqueda activa institucional): Servicios de sala de partos. Atención Primaria (consultorios). Atención segundo nivel: (consultorios especializados, pediatría). Atención tercer nivel: Hospitales de referencia (Neonatología e Infectología). Laboratorio clínico (muestras de laboratorio).

Revisión de registros de defunción Estadísticas Vitales (Defunciones RUAF).

Se realiza seguimiento a los medios de comunicación nacionales, departamentales y locales para identificar noticias, rumores del evento y generar alertas tempranas para el seguimiento del evento.

Medidas de prevención

Si una mujer está embarazada y ha estado en contacto cercano con alguien que ha tenido fiebre y erupciones cutáneas temporales, debe acudir a un centro médico y comunicar esta situación al profesional de la salud. Este determinará si existe riesgo de que la mujer haya contraído el virus de la rubéola y evaluará el posible riesgo de transmisión al feto; por otro lado, deben estar atentas de asistir a los controles prenatales.

Se deben estar atentas al cronograma de vacunación de sus hijos. La primera vacuna se pone al año y el refuerzo a los cinco años.

Sensibilización a la mujer en edad fértil, si planea quedar en embarazó, se recomienda que se asegure de estar vacunada contra la rubéola, de esta manera se disminuye el riesgo de que él bebe se infecte durante el embarazo de la madre.

UNIDAD DE ANÁLISIS SRC : Realizar e incluir en el aplicativo UACE (Unidad de análisis de casos especiales) del INS, en los tiempos establecidos en los lineamientos nacionales las unidades de análisis de casos de SRC en casos vivos o muertos con IgM positiva o dudosa o con aumento de títulos IgG dos

DESARROLLO

veces con muestra fallida. Así mismo, en todos los casos en los que no se disponga de muestra, se debe proceder con la realización de esta. La clasificación final los casos se realizará de acuerdo con el análisis epidemiológico, factores de riesgo y los resultados de laboratorio.

PERIOCIDAD DE LA NOTIIFCACION SRC: Realizar notificación super inmediata, inmediata y semanal de casos de los casos SRC siguiendo el flujo de información establecido por el sistema de Vigilancia en Salud Pública.
Notificación inmediata: Los casos sospechosos de SRC deben ser **ingresados de manera inmediata al subsistema de información – Sivigila**, se genera archivo plano inmediato, se envía correo electrónico con periodicidad diaria siguiendo el flujo de información establecido por el sistema.

NOTIFICACION NEGATIVA: Semanalmente cada unidad, de acuerdo con el flujo de información (UPGD,UNM y UND) realice la notificación negativa de SRC

AJUSTE A SIVIGILA 4.0
Los ajustes a la información de casos sospechosos SRC y la clasificación final se tendrán en **cuenta los tiempos de ajustes (8 semanas**) para cumplir con los indicadores internacionales. En ocasiones casos con resultado de IgM positivo o dudoso pueden requerir más tiempo para clasificación final.
La clasificación o ajuste final de casos en el aplicativo Sivigila demanda los siguientes criterios o códigos:
Ajuste 3: caso confirmado por laboratorio.
Ajuste 6: caso descartado por laboratorio
Ajuste D: por error de digitación, envió acta, ficha , HC pantallazo
Se deben excluir los casos ajuste D (error de digitación) e identificar los casos repetidos primero por número de documento y posteriormente por nombres y apellidos. Para el análisis de la información se tiene en cuenta la **procedencia del caso y el ajuste 6 con el fin de calcular el indicador de tasa de notificación**.
Investigación epidemiológica de campo: Se debe realizar ante todo casos sospechosos de SRC en las primeras 48 horas posteriores a la notificación.
Visita domiciliaria: identificar y realizar censo de contactos familiares.
Recolección de información como antecedentes clínicos y vacunales para Rubéola en la madre.
Identificar y caracterizar el caso según tiempo, lugar y persona y situaciones de riesgo.
Realizar Monitoreo Rápido de vacunación (MRV): indagar antecedente vacunal para rubéola especialmente en mujeres en edad fértil
Operación Barrido Vacunal BAC: cubrir como mínimo nueve manzanas alrededor del domicilio de la persona afectada
Búsqueda activa institucional BAI: Se debe realizar de manera periódica incluye: silencio por más de dos (2) semanas epidemiológicas, se recomienda realizar BAI a toda UPGD que atienden partos.
Registros individuales de Prestación de Servicios de Salud - RIPS.
Historias clínicas.
Registro de defunción – tomado del Registro Único de Afiliados - RUAF.
Registro de pruebas de laboratorio – tomado de sivilab.

REPORTE SITUACION SITREP: En caso de confirmar un caso para SRC, El primer Reporte de Situación (SITREP) debe generarse dentro de las 24 horas posteriores a la notificación inicial. La frecuencia de los informes posteriores debe seguir las pautas establecidas por la entidad territorial o actualizarse en función de nueva información que surja durante la respuesta.
Comportamiento del Indicador para síndrome de rubeola congénita SRC el cual garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se revisa con regularidad utilizando en forma sistemática, los casos notificados mes a mes es así como se tiene un acumulado de una Tasa de

DESARROLLO

notificación de casos sospechosos de síndrome de rubeola congénita SRC notificados al Sivigila de 16 x 1000 nacidos vivos , en la Subred Sur Occidente, donde se tiene cero casos de rubeola positivos, según la clasificación del ajuste final por localidad se tiene un acumulado de 90 casos y por localidad Kennedy en total 57 casos de los cuales se descartan 36, positivos cero casos, pendiente 21; Fontibón con un total 11, descartados 8, positivos cero, pendiente 3; Bosa 16 casos con ajuste 6 descartados, positivos cero, 10 pendientes; Puente Aranda 6 casos , de los cuales se descartan 4, positivos cero, pendiente 2.

4. **VIGILANCIA DE LA MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCOCICA E INDICADO MENINGITIS POR LOS AGENTES COMO HAEMOPHILUS INFLUENZAE (Hi), STREPTOC PNEUMONIAE (Spn) Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA**

LA MENINGITIS: Enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges (en ocasiones meninges y encéfalo) provocada por invasión bacteriana del sistema nervioso central (SNC) Enfermedad grave y potencialmente mortal (pocas horas) La mayoría de las personas se recupera de la meningitis. Sin embargo, la infección puede tener como consecuencia discapacidades permanentes (como daño cerebral, pérdida auditiva y dificultades de aprendizaje)

MENINGOCOCCEMIA: Es una forma rara de la infección que ocurre cuando se disemina por la vía sanguínea, o sea, una septicemia, la cual puede presentarse con o sin meningitis. Se observa un exantema que, al comienzo, es de tipo eritematoso y macular y que evoluciona rápidamente a erupción petequial y, eventualmente, equimosis. META: Para 2030, la estrategia cuenta con tres objetivos visionarios: Eliminar las epidemias de meningitis bacterianas —la forma más letal de la enfermedad. Reducir el número de casos de meningitis bacteriana prevenible mediante vacunación en un 50 % y las defunciones en 70 %. Reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida después de una meningitis debida a cualquier causa

CASO PROBABLE Meningitis bacteriana: Paciente que presente cuadro clínico de inicio súbito con fiebre mayor de 38 °C, cefalea y al menos uno de los siguientes síntomas y signos: Rigidez de nuca, Alteraciones de conciencia, Señales de irritación meníngea, Rash purpúrico o petequial (meningococo), En menores de un año, abombamiento de la fontanela. El examen de líquido cefalorraquídeo (LCR) deberá contar con las siguientes condiciones: LCR turbio, Recuento de leucocitos mayor de 100/mm3 con recuento de neutrófilos mayor o igual 80%, Elevación de la proteína mayor de 100 mg/dl, Disminución de la glucosa menor de 40 mg/dl, Gram de LCR positivo para bacterias

CASO PROBABLE DE ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA: Enfermedad meningocócica: paciente que presente deterioro rápido del estado de conciencia con sepsis de origen desconocido y rash purpúrico o petequial, o que en cultivo de sangre u otro fluido corporal estéril se identifique crecimiento de diplococos Gram negativos intra o extracelulares. DIAGNOSTICO: Punción lumbar para realizar estudio citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. VALORES NORMALES DEL LCR: Presión de apertura: 8-25 mmH2O Proteínas: 15-50 mg/dl Glucosa: 45-81 mg/dl Aspecto: Claro (cristal de roca). Recuento leucocitos: 1 a 2/mm³. VIGILANCIA TODAS las cepas implicadas en meningitis o enfermedad meningocóccica aisladas de sangre o LCR. *N. meningitidis, H. Influenzae, S. pneumoniae, L. monocytogenes, entre otros* con ficha de laboratorio para cada microorganismo según el caso. **Análisis Químico: Proteínas y glucosa Análisis citológico Recuento de hematíes y de glóbulos blancos. Análisis microbiológico Coloración de Gram, Tinta China y cultivo microbiológico**

AGENTES BACTERIANOS Se vigilan: Haemophilus *influenzae*: coco bacilo Gram negativo, serotipos B, A y no tipificable. PI: 2 a 4 días

***Streptococcus pneumoniae*:** diplococo Gram positivo, se han descrito 90 serotipos diferentes; sin embargo, la experiencia clínica mundial acumulada muestra que son pocos los serotipos con mayor impacto clínico y es así como 12 serotipos (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19 y 23) son responsables del 80 % o más de las infecciones neumocócicas invasoras. PI: 1 a 4 días. ***Neisseria meningitidis*:** diplococo Gram

DESARROLLO

negativo, se han descrito 13 serogrupos, de los cuales los que causan enfermedad invasora son: A, B, C, W, X y Y; sin embargo, en la literatura se ha descrito a los ser grupos A, C y W como los de mayor potencial epidémico. PI: 2 a 10 días, con promedio de 4 días. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON EL EVENTO: Orientar medidas de control como aislamiento respiratorio del caso, uso de tapabocas, higiene de manos, limpieza y desinfección de áreas y utensilios, evitar el contacto innecesario. POBLACIÓN ESPECIAL Cautiva y vulnerable (cárceles, URI, lugares de retención, batallones, habitantes de calle, migrantes, etnias, centros de adulto mayor) 1 caso probable o confirmado se desplaza ERI de la subred junto con el epidemiólogo de transmisibles para realizar IEC conjunta y de manera articulada Cierre 20 días sin nuevos casos

Confinada (empresarial y centros educativos) 1 caso probable o confirmado se activará ERI de la subred y se trasladará con el epidemiólogo de transmisibles para realizar IEC, BAC y acciones de control Cierre 20 días sin nuevos casos. POBLACIÓN GENERAL: Familiar 1 caso probable o confirmado de enfermedad meningocócica es un brote Cierre 10 días sin nuevos casos. Solo en casos que se identifique el caso índice tiene nexo con institución se activa a ERI para la BAC

CONTACTO ESTRECHO COMUNITARIO: Contactos familiares (persona que habita en la misma vivienda por al menos 10 días antes de la aparición de los síntomas del caso probable) Menores de 2 años, Contactos en jardines, colegios o universidades: Todos los niños y personal del aula en la que ha concurrido el enfermo en los 10 días que preceden al inicio de la enfermedad, Contactos laborales, Exposición directa a secreciones del caso, Persona que haya tenido contactos próximos y repetidos en los últimos 10 días durante más de 4 horas consecutivas al día, Pasajeros sentados directamente al lado de un caso índice durante un viaje en avión en vuelo de más de 8 horas

1. **VACUNACION**: compuesta por oligosacáridos meningocócicos A (10 µg), C (5 µg), W135 (5 µg) y Y (5 µg), conjugados con proteína CRM 197 de Corynebacterium diphtheriae. Tipo de vacuna: Polisacáridos capsulares inactivos o muertos de cada serotipo.

Dosis: De 2 a 55 años la dosis es única. Aplicación: se administra vía intramuscular. No caminadores: vasto externo tercio medio cara anterolateral del muslo. Caminadores: región superior central del músculo deltoides (brazo) Serogrupos: A, C, Y y W135 de *Neisseria meningitidis.*

CONTACTO ESTRECHO INSTITUCIONAL: Exposición directa a las secreciones del paciente. Reanimación boca a boca sin protección, Contacto sin protección durante la intubación orotraqueal, aspirado de secreción nasofaríngea, Personal de salud que no ha utilizado adecuadamente los elementos de protección personal para la atención de estos casos, El personal de salud se considerará contacto si ha tenido relación estrecha con el paciente (intubación OT, manejo sobre vía aérea, contacto con secreciones respiratorias) sin utilizar medidas de barrera, previo a las 24 horas de iniciado de tratamiento

Ajuste: La clasificación o ajuste final de casos en Sivigila, demanda los siguientes criterios o códigos: Ajuste 0: casos que cumplen con la definición caso probable, con cultivo de LCR negativo y diagnóstico final de egreso meningitis bacteriana. Casos sin muestra o cultivo con clínica compatible y diagnostico final de egreso de meningitis bacteriana, Ajuste 3: caso confirmado por laboratorio, Ajuste 6: caso descartado por laboratorio, descartado por clínica o no cumple con definición de caso, Ajuste D: caso descartado por error de digitación (en cumplimiento con los criterios de ajuste D, se debe volver a notificar correctamente).

Para el 2024 en la Subred Sur Occidente la incidencia de casos probable de meningitis bacteriana notificados al Sivigila como meningitis por Haemophilus influenzae (Hi), Streptococcus pneumoniae (Spn) y enfermedad meningocócica en población general en menores de cinco años. es de Incidencia 2,1 por 100.000 menores de 5 años. Dentro del acumulado para la Subred Sur Occidente se notificaron 18 casos, por localidad se tienen para Kennedy 9 casos, descartado (3), positivos (5), pendientes (1); Fontibón con 2 casos, según clasificación final descartado (1), positivo (1) pendientes (0); Bosa con 4 casos según clasificación descartado (2), positivo (2) pendientes (0);Puente Aranda con un acumulado 3 y

DESARROLLO

clasificación final descartado (1), positivo (1) pendientes (0). (Fuente: SIVIGILA PE I 2024, RUAF, base de IEC laboratorios de la Subred Sur Occidente 2024). Dentro del seguimiento de las intervenciones de VSP por parte de epidemióloga de caso sin muestra semanalmente se hace énfasis en la necesidad de tomar muestras oportunas y según agente etiológico se da quimioprofilaxis y/o vacunación, unidad de análisis para las UPGDs criticas

Comportamiento del Indicador para meningitis bacteriana y enfermedad meningococica el cual garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se revisa con regularidad utilizando en forma sistemática, los casos notificados mes a mes es así como se tiene un acumulado de Incidencia de meningitis por Haemophilus influenzae (Hi), Streptococcus pneumoniae (Spn) y enfermedad meningocócica en población general en menores de cinco años 2,1 X 100.000 menores de 5 años DANE y la Incidencia de meningitis por enfermedad meningocócica en población general en menores de cinco años 2,1 2,1 X 100.000 menores de 5 años en la Subred Sur Occidente, donde se tiene un acumulado de 43 casos notificados, según la clasificación del ajuste final por localidad por localidad Kennedy en total 23 casos de los cuales se descartan 7, positivos 15 casos, pendiente 1; Fontibón con un total 5, descartados 4, positivos 1, pendiente cero; Bosa 9 casos con ajuste 4 descartados, positivos 5, pendientes cero; Puente Aranda 6 casos , de los cuales se descartan 2, positivos 4, pendiente cero.

5.VIGILANCIA DE LA TUBERCULOSIS E INDICADORES DE VSP DE TUBERCULOSIS

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis, la cual puede afectar cualquier órgano o tejido. Sin embargo, la forma más común de la enfermedad es la pulmonar, cuando la infección afecta órganos diferentes al pulmón, esta se denomina tuberculosis extrapulmonar, la localización más frecuente de esta forma de la enfermedad es la pleural, seguida por la ganglionar. La tuberculosis extrapulmonar incluye diversas manifestaciones las cuales están asociadas al comportamiento del bacilo. La enfermedad puede tener periodos de latencia o evolución lenta, o periodos de reactivación focal, diseminación y compromiso de múltiples órganos. Esto dificulta el diagnóstico y su tratamiento oportuno. Una de las formas más graves de la tuberculosis extrapulmonar es la meningitis tuberculosa, esta infección se produce como consecuencia de la diseminación hematógena del bacilo en el espacio subaracnoideo. Esto se conoce como una complicación de la tuberculosis primaria y puede ocurrir años después como una reactivación endógena de una tuberculosis latente o como consecuencia de una reinfección exógena (4). Ver tabla 1. Las definiciones de sintomático respiratorio son las incluidas en la Resolución 227 de 2020. En población general, se considerará sintomático respiratorio a toda persona que presente tos y expectoración por más de 15 días (5). Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis pueden variar según la edad, el estado inmunológico, la presencia de comorbilidades y el órgano afectado, por lo cual, el profesional de medicina podrá definir la presunción de la enfermedad frente a una tos persistente sin expectoración. En personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o que presenten patologías o tratamientos inmunosupresores, se considerará sintomático respiratorio a quien presente tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso, o sudoración nocturna, de cualquier tiempo de duración.

En privados de la libertad, grupos étnicos, habitantes de calle, migrantes, trabajadores de la salud, población rural o rural dispersa, el criterio para sintomático respiratorio será tos y expectoración por más de 15 días; cuando exista difícil acceso a la atención en salud, podrá tomarse un tiempo menor a 15 días cuando exista presunción de la enfermedad. Para contactos de personas afectadas por tuberculosis, se tomará como criterio tos y expectoración de 1 o más días de duración. En los niños menores de 15 años, los síntomas clínicos más relevantes para sospechar tuberculosis son tos con o sin expectoración por más de 15 días, fiebre mayor de > 8 días, pérdida o no ganancia de peso en los tres meses precedentes, disminución del nivel de actividad o juego, e historia de contacto con un adulto con tuberculosis. La

DESARROLLO

tuberculosis presuntiva se refiere a una persona con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis identificados a partir de una valoración médica. Corresponde a los casos conocidos anteriormente como con sospecha de tuberculosis. Aunque bajo este término se incluyen quienes cumplen el criterio de sintomático respiratorio, el profesional de la medicina podrá definir la presunción de la enfermedad fundamentado en síntomas o signos como fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, astenia, adinamia u otras manifestaciones sugestivas, así no se cumplan los criterios de una persona sintomática respiratoria.

Tuberculosis Resistente: La bacteria causante de la tuberculosis (TB) puede volverse resistente a los antimicrobianos utilizado para curar la enfermedad. La resistencia a los medicamentos aparece como consecuencia de un uso indebido de los antibióticos al tratar con ellos a pacientes afectados de tuberculosis sensible. La resistencia del Mycobacterium tuberculosis puede ser primaria o secundaria también llamada adquirida. La primaria se define como aquella en la que se presentan cepas aisladas en pacientes que nunca antes han recibido tratamiento antituberculoso. La secundaria es la consecutiva a una quimioterapia incorrecta provocada por la utilización de un esquema terapéutico inicial errónea, una indicación inadecuada de tratamiento de infección tuberculosa (quimioprofilaxis) al no descartar enfermedad activa o un incumplimiento del tratamiento. Las causas de la multirresistencia son la mala gestión de tratamiento de la tuberculosis y la propagación de persona a persona. La mayoría de los casos se curan con una estricta observancia de un régimen terapéutico de 12 -18 meses registrado bajo supervisión.

Lepra: Enfermedad ocasionada por el agente Mycobacterium Leprae, de origen bacteriano que se transmite de persona a persona por vía respiratoria, la cual ingresa a los pulmones y se distribuye a todo el cuerpo principalmente a la piel, nervios, ojos, manos y pies. La enfermedad se diagnostica mediante la observación de la piel, valoración de la sensibilidad de la misma, y mediante la toma de baciloscopia de linfa para orientar el diagnóstico. La enfermedad cuenta con tratamiento el cual es gratuito y efectivo en todos los casos, el tratamiento es de estricto control por parte del personal de salud y se debe fomentar el apoyo al paciente y otras medidas para prevenir la discapacidad asociada a su causa.

Gestión de la información del componente transmisible con énfasis en eventos por Micobacterias: la identificación, caracterización, priorización e intervención de las enfermedades producidas por micobacterias (Notificación al SIVIGILA) las acciones realizadas que permitan tener información confiable y con calidad (ajustes, cierre de casos y concordancia). Los eventos producidos por micobacterias se enmarcan en los protocolos nacionales del INS (evento 813 y 450).

En el proceso de recepción de la notificación, notificación Inter local monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP incluye la Depuración, Pre crítica, critica, ajuste y Realimentación, en caso información faltante para los evento TB Todas las formas (incluye TB FR) y lepra dentro de la pre critica está incluido la verificación de los reportes confirmatorios o complementarios de TB según sea el ingreso confirmado por laboratorio o por clínica; es importante verificar que al caso se le hayan procesado pruebas de confirmación bacteriológica como baciloscopia, cultivos, pruebas moleculares si los reportes son negativos debe aparecer en la ficha y aplicativo sivigila

AGENTE ETIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis. **MODO DE TRANSMISION**: A través de la inhalación de microgotas suspendidas en el aire que contienen el bacilo, expulsadas por personas con tuberculosis pulmonar, o a través de las vías respiratorias por el esfuerzo espiratorio de toser, hablar, cantar o estornudar. La exposición cercana a un caso infeccioso de manera prolongada o repetida puede producir la infección de 15 a 20 personas durante un año. La tuberculosis extrapulmonar, con excepción de la laríngea, no es transmisible salvo en aquellas situaciones en las que exista una fístula secretante. RESERVORIO: Principalmente los seres humanos; en raras ocasiones los animales. **PERIODO DE INCUBACION**: El período de incubación de la tuberculosis es indefinido y depende de diversos factores, sin embargo, se ha estimado que de 2 a 10 semanas es el período promedio desde el momento de la infección hasta la aparición de una lesión primaria demostrable o una reacción tuberculina significativa; sin embargo, en algunos individuos la infección puede permanecer latente toda la vida.

PERIODO DE TRASMISION: La probabilidad de desarrollar la tuberculosis puede variar ampliamente y

DESARROLLO

tardar varios años después de la infección. Se estima que alrededor del 10% de los infectados desarrollará la enfermedad; adicionalmente, existen factores de riesgo como la edad, el estado nutricional e inmunológico, que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. De igual manera, la infección por VIH incrementa notablemente el riesgo y acorta tiempo de aparición de la tuberculosis.

FACTORES DE RIESGO: El riesgo de infección y el desarrollo posterior de la enfermedad dependen de factores asociados con el bacilo (viabilidad, transmisibilidad y virulencia), el huésped (estado inmune, susceptibilidad genética, duración e intensidad de la exposición) y de la interacción bacilo-huésped (lugar de afectación, gravedad de la enfermedad). Por lo tanto, se pueden señalar los siguientes factores de riesgo: • Presencia de casos de tuberculosis pulmonar no diagnosticados o no tratados. • Condiciones de hacinamiento. • Desnutrición, inmunocompromiso de cualquier etiología (infección por VIH, uso de medicamentos inmunosupresores), diabetes, cáncer, insuficiencia renal crónica, silicosis, alcoholismo y drogadicción.

CASO CONFIRMADO: Caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado: es aquel caso que se configura por el resultado positivo para alguna de las pruebas de laboratorio como baciloscopia (coloración directa de la muestra), cultivo en medio líquido o prueba molecular.

CASO CONFIRMADO POR CLINICA: Caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado: es aquel caso diagnosticado por un profesional de la medicina, quien ha decidido darle un ciclo completo de tratamiento antituberculoso, con pruebas bacteriológicas negativas. Esta definición incluye casos diagnosticados sobre la base de un cuadro clínico sugestivo acompañado de anomalías en exámenes radiográficos (radiografía simple o tomografía), o histopatología sugestiva o nexo epidemiológico (contacto con un caso de tuberculosis confirmado) y en el cual no se tuvo o no fue posible la confirmación bacteriológica. Si alguno de los casos diagnosticados por la clínica, posteriormente resulta ser bacteriológicamente positivo (antes o después de iniciar el tratamiento), debe ser reclasificado como un caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado.

CASO CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO: Caso compatible de tuberculosis con criterio bacteriológico negativo, que presenta criterios clínico y epidemiológico positivos, y en quien el médico ha decidido iniciar tratamiento antituberculosis. Estar expuesto o ser contacto de un caso confirmado de tuberculosis bacilífera, hace positivo el criterio epidemiológico (signo de Combe positivo).

CASO DESCARTADO: Estos se definen como las personas que iniciaron tratamiento para tuberculosis por criterio médico, pero como resultado de pruebas diagnósticas y por criterio clínico del equipo médico tratante se descarta el diagnóstico de tuberculosis. Para efectos del diagnóstico de egreso en el registro del Programa Nacional de tuberculosis y para la gestión de medicamentos, se deben reportar los casos de tuberculosis que hayan sido descartados; así mismo, se deberán ajustar por descarte en el SIVIGILA.

CASO CONFIRMADO POR LABORATORIO: Caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado: es aquel caso que se configura por el resultado positivo para alguna de las pruebas de laboratorio como baciloscopia (coloración directa de la muestra), cultivo en medio líquido o prueba molecular.

CASO NUEVO: Aquel que nunca ha sido tratado por tuberculosis o que ha recibido medicamentos antituberculosos por menos de un mes.

CASO PREVIAMENTE TRATADO: Persona que ha recibido un mes o más de tratamiento con medicamentos antituberculosos en el pasado. Se clasifica además por el resultado de su más reciente ciclo de tratamiento, de la siguiente manera: Reingreso tras recaída: persona que ha sido previamente tratada por tuberculosis, fue declarada como curada o con tratamiento terminado al final de su último ciclo de tratamiento y ahora se le diagnostica con un episodio recurrente de tuberculosis (ya sea una verdadera recaída o un nuevo episodio de tuberculosis causado por reinfección). Reingreso tras fracaso: persona previamente tratada por tuberculosis, cuyo tratamiento fracasó, evidenciado mediante un resultado de baciloscopia o cultivo de esputo positivo en el cuarto mes, o posterior, durante el tratamiento. Recuperado tras pérdida de seguimiento: persona que había sido tratada previamente por tuberculosis y fue declarada pérdida en el seguimiento realizado al final de su tratamiento más reciente y reingresa nuevamente al Programa. Otros casos previamente tratados: son aquellos que han sido previamente tratados por

DESARROLLO

tuberculosis, pero cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o no se ha documentado

TUBERCULOSIS PULMONAR: Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis, que afecta el parénquima pulmonar o el árbol laringotraqueobronquial. La tuberculosis laríngea y la miliar se deben clasificar como tuberculosis pulmonar. **TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR**: La Tuberculosis extrapulmonar se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis, que afecta otros órganos que no sean los pulmones; por ejemplo, la pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos y meninges. Las linfoadenopatías tuberculosas intratorácicas (mediastinales o hiliares) o el derrame pleural causado por la tuberculosis sin alteraciones radiográficas de los pulmones, configuran un caso de tuberculosis extrapulmonar.

PERSONA CON TUBERCULOSIS Y VIH: Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis y que tiene un resultado positivo de la prueba del VIH realizado al momento del diagnóstico de tuberculosis, o que reporta evidencia documentada de atención en un programa de VIH o de tener confirmado el diagnóstico de VIH (por ejemplo, estar reportado en la base histórica de VIH del Sivigila o como persona que vive con VIH en la Cuenta de Alto Costo - VIH).

PERSONA CON TUBERCULOSIS SIN VIH: Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis y que tiene un resultado negativo de la prueba de VIH realizada al momento del diagnóstico de la tuberculosis. Cualquier persona con tuberculosis y sin VIH que posteriormente se encuentra que tiene VIH, debe ser reclasificada en el Programa y debe actualizarse su condición en el Sivigila

PERSONA CON TUBERCULOSIS Y CON ESTADO VIH DESCONOCIDO Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que no tiene ningún resultado de la prueba de VIH, y no hay otra evidencia documentada de atención en un programa de VIH o de que se le hubiese confirmado el diagnóstico con anterioridad al evento de tuberculosis. Si posteriormente se determina el estado de VIH de la persona, esta debe ser reclasificada en los registros del programa y realizar actualización en el Sivigila. Se incluyen en esta categoría las personas que fallecieron antes de realizarse la prueba de VIH o cuando existe un disentimiento informado de la realización del examen para VIH.

DIAGNOSTICO: El diagnóstico de la tuberculosis se realiza mediante la demostración de la micobacteria, por diferentes métodos bacteriológicos o microbiológicos, fenotípicos o genotípicos (a todos los casos se les debe realizar pruebas de sensibilidad a fármacos de tuberculosis) y según lo establecido en la Resolución 227 de 2020. El estudio microbiológico se realiza a través de cultivo en medio líquido y/o pruebas de biología molecular (Se deberán utilizar las pruebas de biología molecular controladas por el INS y avalada por la Organización Mundial de la Salud). Para el 2024 en la Subred Sur Occidente el Porcentaje de casos por tipo de tuberculosis, notificados al Sivigila es de 100% de casos de tuberculosis pulmonar y extra pulmonar. Dentro del acumulado para la Subred Sur Occidente se notificaron 122 casos, por localidad se tienen para Kennedy 56 casos, descartado (0), positivos (56), pendientes (0); Fontibón con 14 casos, según clasificación final descartado (0), positivo (14) pendientes (0); Bosa con 33 casos según clasificación descartado (0), positivo (33) pendientes (0); Puente Aranda con un acumulado 19 y clasificación final descartado (0), positivo (19) pendientes (0). (Fuente: SIVIGILA PE III 2024, RUAF, base de IEC laboratorios de la Subred Sur Occidente 2024). Dentro del seguimiento de las intervenciones de VSP por parte de epidemióloga de caso sin muestra semanalmente se hace énfasis en la necesidad de tomar muestras oportunas y entrega tratamiento, visita articulada con la enfermera del programa a los casos de menores, tuberculosis fármaco resistente, casos de persona en cárceles. El Porcentaje de casos de confección tuberculosis /VIH SIDA es del 8,9% de los casos de tuberculosis todas las formas confirmadas corresponden a coinfeccion tuberculosis / VIH en 2024 (11/123*100)

DESARROLLO

Comportamiento del Indicador para tuberculosis el cual garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se revisa con regularidad utilizando en forma sistemática, los casos notificados mes a mes es así como se tiene un acumulado del Porcentaje de casos confirmados por tipo de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar es de 100% (203/203x100), con una porcentaje de casos de coinfeccion tuberculosis /VIH SIDA de 8,4% (17/203*100) , Porcentaje de casos de tuberculosis con investigación de campo realizada es de 77,8% (158/2023*100), porcentaje de contactos por caso de tuberculosis 144,8% (294/203*100); en la Subred Sur Occidente, donde se tiene un acumulado de 202 casos notificados, según la clasificación del ajuste final por localidad por localidad Kennedy en total 96 casos de los cuales se descartan 0, positivos 79 casos, pendiente 17; Fontibón con un total 24, descartados 0, positivos 21, pendiente 3; Bosa 52 casos con ajuste 0 descartados, positivos 45, pendientes 7; Puente Aranda 30 casos , de los cuales se descartan 0, positivos 21, pendiente 9.

6.VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA, E INDICADORES E INDICADORES PFA:

La parálisis se define como la pérdida parcial o total de la capacidad para realizar movimientos voluntarios; lo que incluye no solamente movimientos de los cuatro miembros, sino también aquellos con un componente automático como la respiración, la deglución y los movimientos oculares anatómicos. En términos clínicos, la parálisis puede resultar de la lesión en uno de los cuatro sitios anatómicos: neurona motora superior, neurona motora inferior (incluidas raíces, plexos, nervios periféricos, unión neuromuscular y músculo), unión neuromuscular y músculo estriado. La denominación de parálisis aguda indica la instalación abrupta de la debilidad muscular, pero también que la parálisis progresa hasta su acmé en uno a diez días, usualmente en tres a cuatro días. Se describen como causas más frecuentes de PFA en niños la poliomielitis por poliovirus, la neuropatía periférica (unidad de Guillain-Barré), la mielitis aguda (mielitis transversa aguda, absceso epidural, hematoma y tumores), las lesiones de la unión neuromuscular (miastenia gravis, botulismo, neurotoxinas vegetales, insecticidas organofosforados) y en músculo, la polimiositis o miopatía inflamatoria idiomática, la parálisis periódica familiar hipocalémica o hipercaliémica y la triquinosis. Las características del agente en cuanto a su modo de transmisión, período de incubación y período de transmisibilidad se resumen

Poliomelitis por Poliovirus: La poliomielitis es una enfermedad aguda, febril, caracterizada por meningitis aséptica y debilidad o parálisis de una o más extremidades. La manifestación de la infección por poliovirus varía desde enfermedad inaparente hasta parálisis y muerte; más del 90 % de las infecciones por poliovirus ocurridas naturalmente son subclínicas. La poliomielitis aguda clínica tiene dos fases distintas: la menor, con una **incubación de tres a siete días**, consistente en viremia, síntomas no específicos como fiebre, dolor de cabeza, malestar de la garganta y anorexia. Entre 4 y 8 % de personas infectadas experimenta síntomas de enfermedad menor que se resuelven en uno o dos días después del inicio. La enfermedad mayor está asociada a síntomas de afección del sistema nervioso central (entre 0,1 y 1 % de los infectados) que aparecen después de la enfermedad menor, estos incluyen fiebre, dolor de cabeza, vómito y meningitis.

Una característica de la poliomielitis es la debilidad motora asimétrica, la cual se desarrolla en uno a dos días. La gravedad de la enfermedad va desde debilidad en una sola extremidad hasta la cuadriplejia. Los músculos proximales están frecuentemente involucrados más que los dístales, y las piernas, más comúnmente que los brazos. La ubicación de la parálisis depende de la localización de la destrucción neuronal y su persistencia por más de 60 días puede indicar parálisis permanente. Los reflejos están ausentes, la sensibilidad se conserva y las parecías pueden durar desde varias horas hasta varios días. Los nervios craneales pueden verse involucrados en 5 a 35 % de los casos paralíticos (poliomielitis bulbar). Cualquier miembro craneal motor puede verse involucrado, pero los nervios IX y X son los más comúnmente afectados. La falla respiratoria por la parálisis de los músculos intercostales y del diafragma representa la complicación más seria de la poliomielitis paralítica.

CARACTERSITICAS DEL VIRUS DE LA POLIOMIELITIS: AGENTE ETIOLOGICO: Poliovirus tipo 1, 2 y

DESARROLLO

3 del género Enterovirus humano grupo C, todos los serotipos pueden causar parálisis. El tipo 1 es el que más ocasionó epidemias en América.

MODO DE TRASMISION: La principal vía de transmisión en áreas en donde existen deficiencias sanitarias es **oro–fecal**, mientras que en condiciones sanitarias satisfactorias es por diseminación de tipo faríngeo (persona a persona); esta vía es también importante en condiciones de brote. **PERIODO DE INCUBACION**: Es de siete a 14 días y puede variar de tres a 35 días. **MODO DE TRASMISION**: Persiste en la garganta menos de seis días después de la infección, se multiplica en el intestino y es excretado en las heces durante cuatro a seis semanas. El poliovirus es demostrable en las secreciones faríngeas después de 36 horas de la exposición a la infección y persiste durante una semana; en las heces, se demuestra después de 72 horas y persiste de tres a seis semanas, tanto en los casos clínicos como en los asintomáticos

SUCEPTIBILIDAD: La susceptibilidad es común en menores de cinco años y todas las personas que **no estén inmunizadas son susceptibles**. Los recién nacidos de madres inmunizadas están protegidos naturalmente durante varias semanas. La inmunidad adquirida con la infección natural o con la vacuna de tipo oral produce inmunidad de tipo humoral, anticuerpos específicos en sangre, e inmunidad local de la mucosa intestinal.

La **VOP* confiere inmunidad de por vida al 95 % de los vacunados después de recibir tres dosis**. Su eficacia se comprobó con la erradicación de la enfermedad en más de 160 países; pueden ocurrir casos asociados a la vacuna, con una probabilidad de un caso por cada 3’600.000 de dosis aplicadas cuando se asocia a la primera dosis y un caso por cada 11’000.000 de dosis aplicadas cuando se asocia a la tercera dosis.

*VOP: Vacuna de Polio Oral

RESERVORIO : El hombre es el único reservorio del virus.

Las vacunas para prevenir la poliomelitis : Con el desarrollo y evaluación en 2009 de la vacuna antipoliomielítica oral bivalente, la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis tiene ahora disponibles cinco vacunas distintas para detener la transmisión de la poliomielitis :Antipoliomielítica oral (VOP), Antipoliomielíticas orales monovalentes (mVOP1 y mVOP3), Antipoliomielítica con virus inactivado, Antipoliomielítica oral bivalentes (bVOP), Antipoliomielítica con virus inactivado . Las siguientes definiciones se han desarrollado, teniendo en cuenta consideraciones virológicas y epidemiológicas **a) Poliovirus derivado de la vacuna (PVDV):** • Cepas VOP que son > 1 % divergentes (≥10 cambios en las bases de nucleótidos (NT), para los tipos 1 y 3) en la región genómica VP1. • Cepas VOP que son > 0,6 % divergentes (≥ 6 cambios de NT, para el tipo 2) en la región genómica VP1. b) **PVDV circulante (PVDVc):** aislamiento de PVDV en la cual existe evidencia de transmisión de persona a persona en la comunidad. De al menos dos personas (no necesariamente los casos de PFA) y que no son contactos en el hogar. • De una persona y uno o más muestras del me-dio ambiente. c) **PVDV asociado con inmunodeficiencia (PVDVi):** PVDV aislados de las personas con evidencia de inmunodeficiencia primaria. d) **PVDV ambiguo (PVDVa):** PVDV aislado a partir de muestras de personas sin inmunodeficiencia conocida o del medio ambiente, sin evidencia de circulación.

Dentro de las recomendaciones de la SDS se hace énfasis en la necesidad de tomar 2 muestras de materia fecal en los primeros 14 días de iniciado los síntomas para parálisis flácida aguda y el otro estudio de Campylobacter en Guillaim Barre, con envió al LSP mas ficha de notificación del caso

Comportamiento del Indicador para Parálisis Flácida Aguda PFA en el cual se garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se revisa con regularidad utilizando en forma sistemática, los casos notificados mes a mes en la Subred Sur Occidente es así como se tiene un acumulado de 5 casos con investigación epidemiológica de campo según localidad de tiene para Bosa 2 , Kennedy 3

7.VIGILANCIA SALUD PUBLICA EVENTO ADVERSO ASOCIADO A VACUNACION

DESARROLLO

En el lineamiento general para la gestión del evento adverso posterior a la Vacunación, por parte del grupo de Farmacovigilancia y la dirección de medicamentos y productos biológicos, describe la ruta, el objetivo y el canse de los 10 subprocesos. *La finalidad de la vigilancia es contribuir a la detección temprana y la clasificación de los EAPV e identificar los casos graves y las señales de riesgo a fin de generar una respuesta rápida y apropiada. Ya que los objetivos específicos del sistema de vigilancia son: Obtener y analizar información en tiempo real para la toma de decisiones; determinar distintos tipos de EAPV en relación a: reacción relacionada con la vacuna, reacción a un defecto de calidad de la vacuna, reacción relacionada con un error en la inmunización, d) reacción relacionada con el nerviosismo ante la vacunación y e) evento coincidente con asociación temporal con la vacunación y mantener y aumentar la confianza y aceptación de las vacunas mediante la retroalimentación.*
La vigilancia de los eventos adversos posteriores a la vacunación **permite identificar los problemas relacionados con la seguridad, calidad y efectividad de la vacuna.** La detección de estos casos puede identificar errores de prescripción o uso, calidad inferior o subestándar, falta de efectividad, usos indebidos e interacción con otros medicamentos, alimentos o bebidas. Los casos notificados por UPGD (IPS) a Sivigila aportan al Programa Nacional de Farmacovigilancia y a su Red. Esta información permite al INVIMA analizar la información para detectar casos individuales de seguridad que deben ser reportados, señales de alerta ante incremento de casos o comportamientos inusuales por características de tiempo, persona y lugar. Cada caso reportado al Sivigila será transferido al VigiFlow® para su respectivo análisis y clasificación en el nivel territorial por el Comité de Expertos para evaluación de reacciones adversas

Caso sospechoso grave: Persona que presenta cualquier signo, síntoma, trastorno o síndrome después de la administración de una vacuna, que cause una incapacidad, discapacidad, ponga en riesgo la vida, requiera hospitalización u ocasione la muerte, o genere clúster de eventos graves y que, la persona, sus cuidadores o los trabajadores de la salud consideren que podría atribuirse a la vacunación o proceso de inmunización

Hace 28 años el INVIMA viene regulando el manejo de las vacunas en el país es así como en 1995 establece el Decreto 677/95 donde estable las responsabilidades de los actores para manejo de medicamentos y las vacunas, donde año a año va ajustando la política de manejo importación y compra ,hasta llegar al 2023 donde se cuenta con un protocolo y lineamiento para la vacuna COVID_19.Ya el 14 de agosto /23 se finalizó el convenio INS /INVIMA y se está a la espera de las nuevas directrices para la vigilancia de EAPV. **Clasificación Final de Casos Relacionados con Evento Adversos Posterior a la Vacunación en Bogotá D.C :** Para la clasificación final de los casos relacionados con evento adverso posterior a vacunación, se debe realizar unidad de análisis, con participación de los actores más visita del punto de vacunación.
INSCRIPCION A LA PLATAFORMA DE VIGIFLOW- Y MANEJO A TODAS LAS IPS CON SE FARMACEUTICO Y PUNTO DE VACUNACION
Con el fin de realizar seguimiento, al perfil de seguridad de los Biológicos para vacunación, se evidencia que se requiere un plan de necesidades de asistencia técnica a los diferentes puntos de vacunación y al personal que interviene en el proceso, dado que al retroalimentar, asesorar y fortalecer el conocimiento de los colaboradores se mitiga el riesgo de cometer errores en el proceso de vacunación. Por lo que se tiene la Normatividad Invima **Circular 3000- 05262021.**
2. Solicitar la creación del Usuario a la entidad Territorial (SDS). La Solicitud se debe hacer por Correo Electrónico a farmacovigilanciabogota@saludcapital.gov.co Y Se debe adjuntar: Certificado de Realización del Curso, Correo electrónico propuesto para usuario, Nit del prestador, Código de inscripción al PNF, Nombre del Referente, Teléfono de Contacto, la vigilancia epidemiológica continua bajo lo establecido en el protocolo de farmacovigilancia, donde al SIVIGILA ingresan los EAPV graves por las vacunas de COVID_19, EAPV del esquema regular. VIGIFLOW se notifican EAPV leves de la vacuna COVID_19,

DESARROLLO

errores programáticos de COVID_19, EAPV leves, graves y errores programáticos del esquema del PAI esquema regular. **No olvidar que los errores programáticos causan una incapacidad, discapacidad, ponen en riesgo la vida, requieren hospitalización u ocasionan la muerte, o generan un clúster.**
Dentro del flujograma de la información si el paciente vacunado que presenta Evento Posvacunal, investige, se debe preguntar si cumple definición de caso sospechoso o grave?, Reporte en SIVIGILA como evento 298 y Plataforma VigiFlow, Reporte desde VSP, IPS a VSP local y químico farmacêutica. Reporte inmediato Envío HC, Ficha de Notificación, realice Acciones individuales, colectivas; Cierre y clasificación del caso de acuerdo con el lineamiento. Por consiguiente, Si es un evento No Grave o Error Programático, y corresponde a la aplicación para todos los biológicos y Covid-19,Esquema Permanente; entonces Reporte a VigiFlow https://farmacoweb.invima.gov.co/reportesfv/login/loginUsuario.jsp.
La Secretaría de Salud Distrital continua el a**acompañamiento Comités con el INVIMA y el** Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en : 1. Cove Locales, 2. Asistencias técnicas Instituciones Públicas y Privadas., Articulación con los Subsistemas: 1.Programa Ampliado de Inmunización (PAI) , 2.Farmacovigilancia , 3.Tecnovigilancia.4. Seguridad al Paciente. 5. Epidemiologia. Con Lineamiento para el manejo de Errores Programáticos: PAI en Subredes e Instituciones Públicas y Privadas, Epidemiologia, Infectología , Pediatría, Seguridad al paciente, Químico Farmacéutico, Tecnovigilancia. EL **Fortalecimiento en manual administrativo** PAI para la adherencia en los inmunobiológicos y procesos de vacunación segura a las UPGD: Cadena frío, Almacenamiento adecuado de dispositivos médicos y técnica para disminuir el error programático, Evitar la pérdida real o potencial de la confianza en la vacunación, Continuar con el fortalecimiento de la farmacovigilancia de vacunas en las UPGD y notificación para el Evento Adverso Posterior a la Vacunación

Comportamiento del Indicador para el evento adverso posterior a vacunación en el cual se garantiza plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se revisa con regularidad utilizando en forma sistemática, los casos notificados mes a mes es así como se tiene un acumulado de 21 caso, según localidad se tiene Bosa 9 , Kennedy 9, Fontibón 3, y Puente Aranda no hay casos. Para la visita a punto de vacunación se cuenta con el apoyo de una de las enfermeras del Programa Ampliado de Inmunización PAI DE LA Subred Suroccidente y es así como se tiene una acumulado de 18 y por localidad en Bosa se realizan 6 visitas a punto de vacunación, Kennedy 8, Fontibón 2 Puente Aranda 2

8. VIGILA SALUD PUBLICA VIRUELA SÍMICA

La viruela símica es endémica en África Central y Occidental, en las selvas tropicales habitadas por mamíferos portadores. Hay dos cepas genéticamente diferenciadas: el cual presenta mayor morbilidad, mortalidad y tasa de transmisión de persona a persona que la occidental y letalidad de hasta el 10 %, en tanto que la letalidad del 1 % . Los síntomas iniciales, cuadro clínico, se presentan durante dos a cuatro días, con fiebre, fatiga y linfo-adenopatía, cefalea y dolor de espalda. La fiebre se reduce tres días después de la aparición de la erupción que comienza en la cara y se propaga rápidamente por el cuerpo, incluidas las mucosas bucales, los genitales y las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las lesiones aparecen simultáneamente y evolucionan a un ritmo similar, con una duración hasta de cuatro semanas, comenzando como máculas que se forman secuencialmente, se transforman en pápulas, vesículas, pústulas y finalmente costras que descaman.

Puede generar complicaciones como infecciones bacterianas secundarias, bronconeumonía, afectación gastrointestinal, sepsis, encefalitis e infección de la córnea con pérdida de visión y deshidratación severa. Las muertes en África Occidental están asociadas con edad temprana o infección por VIH no tratada.
En los casos estudiados durante los brotes de 2022, la presentación clínica ha sido atípica, con pocas lesiones en el área genital, perineal/perianal o peri oral y una erupción asincrónica previa a una fase

DESARROLLO

sintomática (linfo-adenopatía, fiebre, malestar general). Con respecto a la infección durante la gestación y la transmisión materno-perinatal, Se considera a las gestantes como población de alto riesgo, por la posibilidad de complicaciones, tales como: en el primer trimestre, aborto espontáneo; en el segundo trimestre, parto prematuro y en el tercero, muerte fetal intrauterina. Para el periodo IV se tiene un acumulado de 27 casos , uno confirmado de Bosa, 23 IEC efectivas, 4 fallidas; según el sexo 3 son mujeres y 24 hombres , 10 casos cursan con coinfección con HIV(+).

Los síntomas iniciales, descritos históricamente, se presentan durante dos a cuatro días, con fiebre, fatiga, linfo-adenopatía, cefalea y dolor de espalda. La fiebre se reduce tres días después de la aparición de la erupción que comienza en la cara y se propaga rápidamente por el cuerpo, incluidas las mucosas bucales, los genitales y las palmas de las manos y las plantas de los pies (25). Las lesiones aparecen simultáneamente y evolucionan a un ritmo similar, con una duración hasta de cuatro semanas, comenzando como máculas que se forman secuencialmente, se transforman en pápulas, vesículas, pústulas y finalmente costras que descaman

Es una enfermedad autolimitada; sin embargo, puede generar complicaciones como infecciones bacterianas secundarias, bronconeumonía, afectación gastrointestinal, sepsis, encefalitis, mielitis transversa, infección de la córnea con pérdida de visión y deshidratación severa. Entre el 1 y el 13 % requieren atención hospitalaria, dentro de los grupos con mayor riesgo de presentar la forma grave de la enfermedad se encuentran los niños, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas, incluidas las personas que viven con VIH no controlada.
Las lesiones suelen durar 2 a 3 semanas y progresan a través de varias etapas, primero en máculas de 2-5 mm que evolucionan a pápulas, vesículas y luego pseudopústulas; están bien circunscritas y a menudo se desarrollan, entre 7 y 14 días después del inicio de la erupción, luego forman costras, que se secan y caen; en algunos casos pueden presentar lesiones en diferentes etapas a la vez y no todas las lesiones progresan de una fase a otra en orden. La mayoría de los casos presentan entre 1 a 20 lesiones; sin embargo, se reportaron casos con una única lesión o más de 100 lesiones, principalmente en inmunocomprometidos. Con respecto a la infección durante la gestación y la transmisión materno-perinatal, los datos son limitados a nivel mundial y están sujetos al sesgo de notificación.

Los estudios muestran que podría ser más grave en gestantes y neonatos que en el resto de la población, con riesgo de transmisión vertical, enfermedad grave, aborto espontáneo, muerte fetal y parto prematuro. Por analogía con la viruela, se espera que la enfermedad sea más grave en embarazadas especialmente en el tercer trimestre
Dentro de las complicaciones en **gestantes se puede presentar: en el primer trimestre, aborto espontáneo; en el segundo trimestre, parto prematuro y en el tercero, muerte fetal intrauterina**

Agente etiológico: Es una enfermedad viral causada por el virus MPXV que pertenece al género *Orthopoxvirus*, familia *Poxviridae.* Incluye al virus variola (causante de la viruela).

Modo de trasmisión: se presenta de animal hacia humano (zoonótica), puede ocurrir por contacto directo con la sangre, fluidos corporales, o lesiones cutáneas o mucosas, de animales infectados.
La transmisión de persona a persona se produce por contacto con el exudado de la lesión o el material de la costra, a través de la saliva, excreciones respiratorias, y podría darse por materiales contaminados, como la ropa de cama o utensilios para comer. **El contacto físico durante las relaciones sexuales son el principal modo identificado** durante este brote
Periodo de incubación: es de 5 a 21 días. Varía de acuerdo con el tipo de transmisión:
Exposiciones no invasivas (contacto con la piel intacta o transmisión de gotas), el período de incubación es de 13 días

DESARROLLO

Exposiciones complejas e invasivas (contacto con piel lesionada o membranas mucosas en regiones anal o genital), el período de incubación es de 9 día

Periodo de Trasmisibilidad: es de uno a cinco días (pródromo) antes del comienzo del exantema y persiste hasta que todas las costras se hayan caído

Susceptibilidad: Toda persona que no haya enfermado previamente por el virus tiene riesgo de infectarse

Reservorio: El reservorio son mamíferos, pero se desconoce el huésped natural, el virus se ha aislado en una ardilla de cuerda en la República Democrática del Congo y en un mangabey tiznado en Costa de Marfil

Inmunidad: En la población vacunada contra la viruela el nivel de inmunidad serológica es del 25,7 %. Sin embargo, el número de cohortes no vacunadas, la disminución de la inmunidad a la vacuna contra la viruela aumenta el riesgo de transmisión de persona a persona.

Definiciones operativas de caso

Caso probable: Un caso probable debe cumplir con los criterios clínicos y epidemiológicos

Criterios clínicos Persona que presenta :

Lesión única o múltiples en cualquier parte del cuerpo (puede ser de tipo mácula, pápula, vesícula, pústula) o Úlcera genital/perianal con o sin proctitis

Acompañado o no de: Fiebre, mialgias, linfo-adenopatía, cefalea, odinofagia o astenia.

Criterios epidemiológicos

Tener uno de los siguientes antecedentes en los **últimos 21 días**:

✓ Contacto con un caso confirmado o probable de Mpox

✓ Antecedente de contacto estrecho, inclusive el intimo o sexual, con persona procedente del exterior.

✓ Nuevas o múltiples parejas sexuales. ✓ Participación en eventos masivos o sociales, inclusive aquellos donde se tienen relaciones sexuales.

✓ Antecedente de contacto con animales vivos o muertos potenciales reservorios del virus.

✓ Paciente que según **criterio del médico** (clínico o epidemiólogo) es un caso probable.

Caso confirmado por laboratorio: Un caso probable con resultado positivo en la prueba de laboratorio de infección por *orthopoxvirus* mediante PCR positiva específica para *orthopoxvirus*.

Caso descartado por laboratorio: Caso probable al que se tomó, conservó y procesó en forma adecuada una muestra para el diagnóstico por laboratorio y el resultado fue negativo.

En el caso de descartar Mpox, es importante considerar diagnósticos diferenciales para enfermedad exantemática o eruptiva que expliquen el cuadro clínico y correspondan a la situación local: varicela, herpes zóster, sarampión, enfermedad de manos, pie, y boca (virus *coxsackie*), zika, dengue, chikunguña, herpes simple, herpes genital, infecciones bacterianas de la piel (impétigo), infección gonocócica diseminada, sífilis primaria o secundaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, reacción alérgica (por ejemplo, a las plantas). Esto quiere decir, establecer otros diagnósticos que correspondan al caso bajo atención.

Es importante, no olvidar la verificación del estado de vacunación contra sarampión y rubéola y en el caso de menores de 15 años cuyo exantema no sea vesicular, notificar como caso sospechoso de sarampión/rubéola. Los casos con enfermedad vesicular o pustular NO son compatibles con sarampión o rubéola.

Muerte confirmada por laboratorio: Caso con condición final fallecido y que, mediante unidad de análisis, basados en el análisis clínico, epidemiológico y por laboratorio (PCR positiva o hallazgos histopatológicos compatibles específicos para orthopoxvirus), se identifica que la **causa básica** de la muerte fue debida a la Mpox .

DESARROLLO

Muerte confirmada por clínica: Caso con condición final fallecido y que, mediante unidad de análisis, basados en el análisis clínico y epidemiológico, en quien, por cualquier motivo, cuenta con una muestra no adecuada, se identifica que la causa básica de la muerte fue debida a la Mpox
Muerte descartada: Caso con condición final fallecido y que, mediante unidad de análisis, basados en el análisis clínico, epidemiológico y de laboratorio, se identifique que la causa básica de la muerte fue debida a otras causas y no a la Mpox.

Para la definición de la fuente, los casos deben ser clasificados de la siguiente forma:

Caso importado: Caso confirmado en una persona con antecedente de viaje a otro país donde circula el virus, durante el período de posible exposición (5 a 21 días antes del inicio del pródromo).
Caso relacionado con la importación: Caso confirmado que, según las pruebas epidemiológicas y virológicas, estuvo expuesto localmente al virus y forma parte de una cadena de transmisión originada por un caso importado.
Caso de fuente desconocida: Caso confirmado al cual no se le pueden identificar cadenas de transmisión o fuente de infección.
Relacionado con fuente desconocida: Caso confirmado que hace parte de una cadena de transmisión secundaria o un caso confirmado de fuente desconocida.
Vigilancia La vigilancia pasiva se realiza mediante la notificación inmediata de casos probables en la ficha Código 880.
La vigilancia activa se realiza mediante: Vigilancia intensificada en instituciones prestadoras que ofrezcan servicios de infectología, dermatología, coloproctología, gastroenterología, urología, ginecología, ginecobstetricia, medicina interna, medicina familiar, pediatría y odontología; en programas especiales de atención de personas con VIH, servicios de salud sexual y reproductiva y en hospitales de referencia

Vigilancia intensificada en población con potencial vulnerabilidad tales como trabajadoras/es sexuales, personas trans, personas en situación de calle, personas en alojamientos temporales, de acuerdo con los programas o proyectos locales para su abordaje.

Investigación epidemiológica de campo de todo caso probable, en las primeras 24 horas después de la notificación o identificación, para los municipios donde no se han confirmado casos y hasta 72 horas

Revisión de registros de defunción Estadísticas Vitales (Defunciones RUAF), realizando búsqueda de diagnósticos relacionados.

Dentro de la vigilancia basada en comunidad (VBC) el evento Mpox hace parte del grupo de eventos de síndrome eruptivo, motivo por el cual el agente comunitario (vigía o gestor comunitario) reportará las situaciones de personas que tengan una o varias lesiones en cualquier parte del cuerpo (tipo vesícula, pústula, lesión ulcerada), junto con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ojos rojos, dolor en las articulaciones, vómitos, diarrea, dolor de espalda, fatiga, escalofríos, dolor detrás de los ojos o sensibilidad a la luz.

Realizar investigación epidemiológica de campo de todo caso probable, en las primeras 24 horas después de la notificación o identificación y seguimiento de contactos

Realizar monitoreo de los casos de gestantes confirmadas no aseguradas residentes en su territorio hasta culminar la gestación, garantizando la atención requerida según el caso.

Realizar el monitoreo de los nacidos vivos de gestantes confirmadas no aseguradas por al menos 12

DESARROLLO

meses, garantizando la atención requerida según el caso.

Diagnóstico: Realizar la recolección de muestras de casos, bien sea como caso probable, caso de mortalidad o caso de gestantes – neonatos – muerte fetal o posparto.

Periodicidad de la notificación

Super inmediata: Una vez una UPGD reporta en el aplicativo Sivigila 4.0 el caso probable de Mpox, genera un archivo plano inmediato a correos determinados de INS y de las secretarías de salud (de procedencia, notificación y residencia), aumentando la oportunidad en la detección y el inicio de las acciones individuales.
Inmediata: Los casos probables de Mpox deben ser ingresados de manera inmediata al subsistema de información – Sivigila, se genera archivo plano inmediato, se envía correo electrónico con periodicidad diaria siguiendo el flujo de información establecido por el sistema.
Ajuste
La clasificación de los casos se realizará de acuerdo con el cumplimiento de la definición de caso y los resultados de laboratorio para confirmar o descartar los casos. Los tiempos para realizar ajustes serán de 4 semanas epidemiológicas para los casos con muestra y condición final vivo y 5 semanas epidemiológicas para los casos sin muestra y casos fallecidos, desde la notificación.
La clasificación o ajuste final de casos en el aplicativo Sivigila demanda los siguientes criterios o códigos:
Ajuste 3: caso confirmado por laboratorio.
Ajuste 6: caso descartado por laboratorio, unidad de análisis o que no cumple definición de caso.
Ajuste D: descartado por error de digitación. Enviar acta, ficha de notificación , HC reporte de laboratorio , pantallazo Sivigila 4.0
Clasificación y condición finales de casos: tablas con la clasificación final de los casos (probable, confirmado o descartado), fuente de infección (importado, relacionado con la importación, desconocida, relacionado con fuente desconocida, comunitaria y evolución clínica (vivo o muerto).

Unidad de análisis: Se debe llevar a cabo a todo caso probable o confirmado con condición final fallecido o que registre Mpox en alguna de las causas del certificado de defunción. En el caso de muertes con resultado de laboratorio negativo, se debe verificar que las causas descritas en el certificado de defunción descarten la Mpox.
Las unidades de análisis se ingresarán al aplicativo UACE, en un periodo máximo de cinco semanas epidemiológicas posteriores a la notificación del caso o fecha de muerte
Búsqueda activa institucional: periódica y mensual en UPGD que presenten silencio epidemiológico mayor a cuatro semanas epidemiológicas

Reporte sitrep: El Sitrep del brote en comunidad debe generarse con periodicidad semanal, el miércoles y debe ser enviado al correo emergentes@ins.gov.co, con la información acumulada de los casos notificados y de manera actualizada. Ante un brote en una población cerrada o confinada, se debe generar Sitrep específico, no se debe combinar con el Sitrep del brote en la comunidad
Definición de contacto : Persona que ha tenido una o más de las siguientes exposiciones con un caso probable o confirmado desde el pródromo y hasta cuándo desecaron todas las costras: Contacto físico directo o íntimo como besarse o abrazarse, incluido el contacto sexual, Exposición prolongada cara a cara (incluidos los trabajadores de la salud, sin el equipo de protección personal adecuado), Contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama, fómites o elementos de uso personal (celulares, cigarrillos electrónicos, etc.).

DESARROLLO

Mediadas de prevención

Revisar los antecedentes epidemiológicos de importancia durante los últimos 21 días tales como viajes, contactos con animales, contactos estrechos con personas procedentes del exterior, contacto con casos probables o confirmados, nuevos o múltiples contactos sexuales, asistencia a eventos masivos o eventos sociales, entre otros.
Desinfectar el material contaminado con fluidos y secreciones de casos probables o confirmados con hipoclorito de sodio,

Aislamiento en casa en una habitación individual para la persona, se recomienda que cuente con flujo de ventilación., Los familiares deben evitar el contacto con el paciente y en caso de no ser posible, se debe usar los elementos de protección personal todo el tiempo, Evitar manipular las lesiones, sin elementos de protección personal e higienizar lo antes posible posterior al contacto, la ropa de cama y de la persona debe ser manipulada con guantes y con mascarilla; y se recomienda lavar de manera individual., Evitar cuidar o tener contacto cercano con las mascotas.
Aislamiento en establecimientos de población confinada Tener identificada un área de aislamiento, Tener en cuenta los posibles desplazamientos, por ejemplo, a los baños, Asegurar medidas higiénicas y sanitarias adecuadas tanto para la población confinada como para los profesionales que prestan sus servicios en la institución, El área de aislamiento debe contar con flujo de ventilación.
La investigación epidemiológica de campo se realizará para todo caso probable, en las primeras 24 horas después de la notificación o identificación y envió informe a las 48 horas
Indagar sobre antecedentes de viaje o desplazamientos en los 21 días anteriores, que incluya países, ciudades y lugares visitados, número de vuelos y asiento utilizado para el transporte.

En el brote multipaís se considera poco probable: Los pasajeros sentados en la fila anterior, posterior y lateral, y los compañeros de fila, en el transporte en avión, tren o bus, especialmente si hay exposición cara a cara. En el brote multipaís se considera poco probable

Seguimiento a contactos: Los contactos asintomáticos pueden continuar con las actividades rutinarias, tales como ir al trabajo o el estudio. Se recomienda evaluar si los niños en edad preescolar no asistan a las guarderías u otros entornos grupales
Los contactos no deben donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o semen mientras estén bajo vigilancia de síntomas,
Se sugiere evitar contacto cercano con mascotas. Se debe suspender la lactancia
Unidad de análisis: Las unidades de análisis se ingresarán al aplicativo UACE, en un periodo máximo de cinco semanas epidemiológicas posteriores a la notificación del caso o fecha de muerte.
Comportamiento del Indicador para Viruela Símica MPOX el cual garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia, se revisa con regularidad utilizando en forma sistemática, los casos notificados mes a mes es así como se tiene un acumulado 28 casos de los cuales hay 4 confirmados por laboratorio ;en relación a las investigaciones de campo se tienen 20 efectiva , fallida 5 , Coinfección VIH se tienen 11 casos.

DESARROLLO

5. CALIDAD DEL AGUA

Desarrollo

Se realiza explicación del comportamiento y evaluación del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua denominado IRCA, el cual se determina por medio de la subdivisión de 3 categorías de la siguiente manera:

Físicas (pH, Cloro Residual Libre, Turbiedad, Color).
Químicas (Alcalinidad, Dureza, Cloruros, Manganeso).
Microbiológicas (Coliformes Totales, E. Coli)

Por medio de esta evaluación se establecen 5 niveles de riesgo que permiten identificar el riesgo a la salud humana.

Posteriormente se explica el IRCA durante el mes de enero, durante el cual se presentaron parámetros no aceptables de acuerdo con la Res. 2115 de 2007, siendo el 13% de las muestras totales siendo estos parámetros distribuidos de la siguiente manera Turbiedad (12), Manganeso (8) y Cloro Residual (1).

De igual manera se explica el IRCA durante el mes de febrero, durante el cual se presentaron parámetros no aceptables de acuerdo con la Res. 2115 de 2007, siendo el 8% de las muestras totales siendo estos parámetros distribuidos de la siguiente manera Turbiedad (12), Manganeso (8), Hierro (2) y Color (4).

Se explica el IRCA durante el mes de marzo, durante el cual se presentaron parámetros no aceptables de acuerdo con la Res. 2115 de 2007, siendo el 19% de las muestras totales siendo estos parámetros distribuidos de la siguiente manera Turbiedad (22), Manganeso (28), Color (8) y Cloro Residual (3).

Se explica el IRCA durante el mes de abril, durante el cual se presentaron parámetros no aceptables de acuerdo con la Res. 2115 de 2007, siendo el 5% de las muestras totales siendo estos parámetros distribuidos de la siguiente manera Turbiedad (5), Manganeso (3), Hierro (3) y Cloro Residual (1).

Se explica el IRCA durante el mes de mayo, durante el cual se presentaron parámetros no aceptables de acuerdo con la Res. 2115 de 2007, siendo el 5% de las muestras totales siendo estos parámetros distribuidos de la siguiente manera Turbiedad (9), Manganeso (1), Hierro (1) y Cloro Residual (1).

Adicionalmente se indica el comportamiento de los embalses y del consumo de agua en Bogotá durante el racionamiento, evidenciándose una tendencia en aumento de estos sin embargo el consumo de agua en Bogotá se aumentó a comparación del comienzo del racionamiento, retornando a un consumo promedio de 16 m3/s, el cual es considerado el consumo normal de la ciudad, por esta razón se brindan recomendaciones sobre continuar con las medidas de ahorro implementadas en hogares y establecimientos.

Finalmente, se brindan recomendaciones frente a la prevención de las EDA´s de acuerdo a solicitud presentada por participantes en COVES anteriores, de acuerdo con esto se brindan las siguientes recomendaciones:

Use agua potable o agua segura, es decir, hervida por 5 minutos, la cual debe mantenerse tapada en un recipiente limpio y usarla en el menor tiempo posible. No consumir bebidas de las que se desconoce su modo de preparación.

DESARROLLO

Lave con agua y jabón las verduras y frutas. Aquellas que no se puedan pelar, preferiblemente lávelas con agua potable, dejarlas reposar 30 minutos y escurrir sin enjuagar o desinfectarlas con productos específicos para tal fin, seguir las instrucciones de uso.

Nunca reutilizar agua para el lavado o preparación de alimentos

Los alimentos perecederos como carnes y lácteos deben estar almacenados a temperaturas de refrigeración o congelación. Siempre estar en buen estado.

Utilizar cuchillos y tablas de picado diferentes para alimentos crudos y cocidos.

Lavar carnes y vísceras antes de su preparación.

Cocinar, hornear o freír muy bien los alimentos.

No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas.

En caso de utilizar leche cruda, hervirla antes de consumirla.

No consumir alimentos después de su fecha de vencimiento.

Los productos enlatados o que estén envasados, deben limpiarse antes de abrirlos y consumirlos.

Mantener los alimentos tapados, en caso de requerirse.

El uso de guantes no exime el lavado de manos.

Evitar estornudar, toser o escupir frente a los alimentos para evitar su contaminación.

Si come en establecimientos comerciales evite siempre consumir alimentos ubicados en la vía pública y en sitios de expendio callejeros.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Recuerda que el lavado de manos es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades respiratorias y gastrointestinales, incluso en situaciones de escasez de agua, así que es importante seguir estas recomendaciones:

- Uso eficiente del agua y jabón: utiliza solo la cantidad necesaria de agua para el lavado de manos. No desperdicies jabón y agua durante el proceso (recuerda cerrar la llave mientras te refriegas las manos con jabón); utiliza cualquier jabón, preferiblemente líquido, si es en barra verifica que no tenga grietas ni este húmedo.
- Priorice el uso de alcohol en gel solo al salir de lugares públicos, transporte, monedas, celulares, entre otros.

- Almacenamiento adecuado del agua: si estás almacenando agua en casa debido al racionamiento, asegúrate de usar recipientes limpios y seguros para almacenar el agua. Los recipientes deben estar tapados para evitar la contaminación por insectos, polvo u otros contaminantes.

DESARROLLO

6. TEMA CENTRAL: ESTADISTICAS VITALES

La información estadística de nacimientos y defunciones permite describir y medir variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia del hecho vital, e identificar las características de las personas. Esta información es útil para análisis demográfico y para la focalización de la política pública en salud.

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR SALUD

- Planeación, ejecución y evaluación de políticas en salud.
- Análisis de eventos vitales en grupos específicos y algunos factores de riesgo asociados.
- Vigilancia epidemiológica. Ej. Programa de control de Tuberculosis, Malaria.
- Construcción de indicadores en salud.
- Diagnóstico de la situación salud de una población específica (perfil epidemiológico).
- Toma de decisiones en torno a programas y planes de gestión en salud a nivel territorial e institucional.

INDICADORES ESTADÍSTICAS VITALES – EEVV

El subsistema de Estadísticas vitales, realiza seguimiento a las instituciones de salud que generan hechos vitales, a través de los indicadores de cobertura, oportunidad, calidad y cabalidad. Los cuales se evaluaban con calificación excelente a partir del 98%, de acuerdo a la vigencia junio – julio 2024, para el mes de julio el rango excelente se evaluará a partir del 99%.

1. **Indicador de Cobertura:** logra la captura del 100% de los hechos vitales en RUAF ND, controla el subregistro y dispone de información confiable, para el cálculo de indicadores.
2. **Indicador de Oportunidad**: La oportunidad se mide con el tiempo de diferencia que es ingresado un certificado a RUAF ND y la fecha del hecho vital. Los certificados deben ser ingresados al aplicativo RUAF de manera inmediata o en un tiempo no mayor a 24 horas
3. **Indicador de Calidad:** tiene como finalidad identificar, ubicar y caracterizar los principales errores y dificultades en el registro de las EEVV en forma permanente, que permita orientar las acciones de mejora continua para la obtención de datos confiables.
4. **Indicador de Cabalidad:** en certificado de defunción se verifica secuencia de la causalidad, terminología y diagnósticos correspondientes a muertes naturales. En Certificado de nacido vivo se verifica peso, talla, edad gestacional.

ACTIVIDADES DE LAS IPS EN ESTADÍSTICAS VITALES

- Realizar ajustes según la base enviada cada semana por parte del equipo de EEVV
- Asistir a las capacitaciones programadas por el subsistema de EEVV
- Responder a requerimientos por parte de la subred (ajustes, anulaciones, enmiendas).

DESARROLLO

MUERTE NO NATURAL

DIFERENCIA ENTRE MUERTE NATURAL Y NO NATURAL

"Una muerte deberá ser considerada entonces como violenta sí es el resultado de una acción extrínseca una fuerza química o física, o ha de ser considerada como natural cuando se produce por alteraciones bioquímicas, inmunológicas, degenerativas, o infecciosas."

Fuente: Manera de muerte homicida: Concepto médico legal vs Jurídico - Foro - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

REPORTE DE MUERTES NO NATURALES

La muerte no natural que se presente en la IPS, se debe reportar a la línea de emergencia o a el cuadrante de la Policía Nacional, luego la reportan a la Central de la Policía Nacional, a Unidad Satélite de la fiscalía general de la nación y posteriormente asignan Laboratorio Técnico de Investigación Criminal (CTI, SIJIN o Transito).

NORMATIVIDAD

Resolución 561 de 24 abril de 2020 - artículo 7 incumplimiento de funciones: cuando el asegurador, a través de su red de prestadores de servicios, no realice en forma oportuna la expedición del certificado de defunción, la solicitud de la necropsia clínica o la justificación de la judicialización de la muerte y fuera necesaria la intervención de la autoridad sanitaria, se harán acreedores a los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar y dicha situación será informada de manera inmediata a la Superintendencia Nacional de Salud para que ejerza las actuaciones de su competencia.

Código de Procedimiento Penal Colombiano ley 906 de 2004 - Artículo 67. Deber de denunciar: Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente.

Código de ética médica colombiano - capitulo I. Declaración de principios artículo 1. El médico es auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley, ora como funcionario público, ora como perito expresamente designado para ello. En una u otra condición, el médico cumplirá su deber teniendo en cuenta las altas miras de su profesión, la importancia de la tarea que la sociedad le encomienda como experto y la búsqueda de la verdad y solo la verdad.

Artículo 2.8.9.6. Decreto 780 de 2016 - Las autopsias médico-legales procederán obligatoriamente en los siguientes casos:

a) Homicidio o sospecha de homicidio

b) Suicidio o sospecha de suicidio

c) Cuando se requiera distinguir entre homicidio y suicidio

d) Muerte accidental o sospecha de la misma

e) Otras muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa, o la autopsia sea necesaria para coadyuvar a la identificación de un cadáver cuando medie solicitud de autoridad competente.

Artículo 2.8.9.7. Decreto 780 de 2016

a) Las practicadas en casos de muertes ocurridas en personas bajo custodia realizada u ordenada por autoridad oficial, como aquellas privadas de la libertad o que se encuentren bajo el cuidado y vigilancia de entidades que tengan como objetivo la guarda y protección de personas.

b) Las practicadas en casos de muertes en las cuales se sospeche que han sido causadas por

DESARROLLO

enfermedad

profesional o accidente de trabajo.

c) Las realizadas cuando se sospeche que la muerte ha sido causada por la utilización de agentes químicos o

biológicos, drogas, medicamentos, productos de uso doméstico y similares.

d) Las que se llevan a cabo en cadáveres de menores de edad cuando se sospeche que la muerte ha sido causada por abandono o maltrato.

e) Las que se practican cuando se sospeche que la muerte pudo haber sido causada por un acto médico.

f) Las que se realizan en casos de muerte de gestantes o del producto de la concepción cuando haya sospecha de aborto no espontáneo.

MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA

Objetivo general

Establecer las directrices del sistema de cadena de custodia colombiano, durante las diferentes etapas asociadas al hallazgo, recolección, embalaje, transporte, análisis y almacenamiento de los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física (EMP y EF), con el fin de garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa, mientras que la autoridad competente ordena su disposición final.

Elementos Materiales Probatorios (EMP) y Evidencia Física (EF)

Se entiende por EMP y EF cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento conducente al descubrimiento de la verdad cuyo análisis proporciona las bases científicas o técnicas para encaminar la investigación penal, lograr la identificación del autor autores, y así confirmar o descartar la comisión de una conducta punible y la reconstrucción de los hechos.

Almacenes de evidencias

Es la unidad de servicio en la estructura organizacional de cada entidad, laboratorio o particular que custodie EMP y EF, que estén involucrados en el sistema de cadena de custodia y bajo el curso de una investigación formal, cuya función es minimizar el riesgo de pérdida, deterioro exógeno y daño.

Manejo de los EMP y EF provenientes de entidades prestadoras de servicios de salud públicas o privada

Quien, en un hospital, puesto de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento similar de servicio público o particular, reciba o diligencie documentos de ingreso de una persona a la cual se le hubiese ocasionado daño en el cuerpo o en la salud con ocasión de un posible delito, debe dar aviso inmediatamente a la Policía Nacional, Policía Judicial o en su defecto a la primera autoridad del lugar.

Las instituciones de salud cumplen una doble función que cumplen dichas entidades:

1. Cuando los EMP y EF son recuperados como parte de la atención en salud: deben ser entregados a los funcionarios de Policía Judicial o a la primera autoridad del lugar

2. Cuando los EMP y EF son recuperados como parte de una actuación forense y requieran análisis por parte de los laboratorios: deben ser entregados a los laboratorios del INML Y CF, y de las entidades que cumplen funciones de policía judicial (CTI, Policía Nacional)

La entidad prestadora de salud es responsable de capacitar, aplicar y suministrar el recurso humano y

DESARROLLO

logístico. Se debe registrar la recuperación de los EMP y EF en la historia clínica. La recolección y embalaje de los EMP y EF se debe hacer de conformidad al Manual de cadena de custodia. Todo EMP y EF recolectado debe estar acompañado del rótulo y registro de continuidad.

EVIDENCIAS PARA CASOS DE LESIONES U HOMICIDIOS
Recolección y embalaje

Proyectil: si usa pinzas, deben ser con punta recubierta de material plástico. Se debe embalar por separado, vainillas, proyectiles, postas y perdigones, envueltas en papel Kraft, crepado o gasa para así evitar alteraciones como micro - rayados en la evidencia.
Arma blanca: se debe manipular por la empuñadura y atar el arma inmovilizando sobre el fondo del contenedor con cordones, fibras o abrazaderas plásticas, sobre cartón o madera asegurando el EMP-EF.
Prendas: para su embalaje se debe usar pliegues de papel kraft o bond limpio no impreso, posteriormente se debe aislar los pliegues de la prenda para evitar contaminación de las manchas o desgarros.

EVIDENCIAS PARA CASOS DE QUEMADURAS POR AGENTE QUÍMICO
Resolución 4568 de 2014 - 11.2.7. Recolección de evidencia forense

En el caso de la ropa contaminada por el químico, el embalaje se realiza de la siguiente manera, obtenga un fragmento patrón:

- Ubique una porción de la prenda que no se encuentre impregnada con la sustancia utilizada en el evento y recorte un fragmento de 3 cm por 3 cm.
- Seque el fragmenten caso de que se encuentre húmedo.
- Empaque el fragmento en papel tipo Kraft o similar. Nunca utilice papel que
- contenga impresiones.
- Embale el empaque en una bolsa plástica, preferiblemente transparente.
- Selle la bolsa con cinta de seguridad u otro medio que brinde seguridad al
- embalaje y su contenido.
- Rotule indicando claramente que se trata del "Fragmento Control".

DESARROLLO

7. SIVIGILA INDICADORES

Tabla 1. Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Semanal Sivigila 4.0 SEM_ 23_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0						
	NOTIFICACION OPORTUNA	NOTIFICACION FIN DE SEMANA	NOTIFICACION VIERNES	DIGITACION EISP CAPTURA LINEA	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS EVALUADAS PARA EL MES	% CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	0	0	0	4	4	4	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM	3	0	0	1	4	4	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA	4	0	0	0	4	4	100%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	2	0	0	2	4	4	100%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	3	0	0	1	4	4	100%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	1	0	0	3	4	4	100%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	1	1	0	2	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	1	0	0	3	4	4	100%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	4	0	0	0	4	4	100%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	2	0	0	2	4	4	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE	3	1	0	0	4	4	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-	0	0	0	4	4	4	100%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE	0	1	0	3	4	4	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS	4	0	0	0	4	4	100%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y	3	1	0	0	4	4	100%
EUSALUD MANDALAY	1	0	0	3	4	4	100%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES	2	0	0	2	4	4	100%
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	0	2	0	2	4	4	100%
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	4	0	0	0	4	4	100%
VIRREY SOLIS IPS SA-KENNEDY	0	0	0	4	4	4	100%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	1	0	0	3	4	4	100%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	1	0	0	3	4	4	100%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	3	0	0	1	4	4	100%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	0	0	0	4	4	4	100%
VIVA 1A IPS ALQUERIA	3	0	0	1	4	4	100%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	1	0	0	3	4	4	100%
VIVA 1A IPS VENECIA	3	0	0	1	4	4	100%
CLINICA MEDICAL SAS	2	0	0	2	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE	3	0	0	1	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO	4	0	0	0	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO	1	0	0	3	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 10 ABASTOS	1	0	0	3	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 30 BOMBEROS	1	0	0	3	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 50 MEXICANA	0	0	0	4	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 63 ALQUERÍA	3	0	0	1	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 68 BRITALIA	1	0	0	3	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 79 CARVAJAL	1	0	0	3	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 92 PATIOS	1	1	0	2	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 105 CATALINA	0	0	0	4	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL	0	0	0	4	4	4	100%
SERVISALUD QCL KENNEDY	1	0	0	3	4	4	100%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	3	0	0	1	4	4	100%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS	4	0	0	0	4	4	100%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	3	0	0	1	4	4	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 100% (n= 44) de las UPGDs realizaron entrega oportuna del informe semanal SIVIGILA 4.0 .

DESARROLLO

Tabla 2 Porcentaje De Silencio Epidemiológico Acumulado Sem_23_ 2024 - Subred Sur Occidente Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO	
	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD NO CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	% INCUMPLIMIENTO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	0	0%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM	0	0%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA	0	0%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0	0%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	0	0%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	0	0%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	0	0%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	0	0%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	0	0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE	0	0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-	0	0%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE	0	0%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS	0	0%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y	0	0%
EUSALUD MANDALAY	0	0%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES	0	0%
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	0	0%
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	0	0%
VIRREY SOLIS IPS SA-KENNEDY	0	0%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	0	0%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	0	0%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	0	0%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	0	0%
VIVA 1A IPS ALQUERIA	0	0%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	0	0%
VIVA 1A IPS VENECIA	0	0%
CLINICA MEDICAL SAS	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 10 ABASTOS	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 30 BOMBEROS	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 50 MEXICANA	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 63 ALQUERÍA	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 68 BRITALIA	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 79 CARVAJAL	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 92 PATIOS	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 105 CATALINA	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL	0	0%
SERVISALUD QCL KENNEDY	0	0%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	0	0%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS	0	0%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	0	0%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas NO establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 100% (n= 44) de las UPGDs no presentan silencio epidemiológico

DESARROLLO

Tabla 3 Cumplimiento Acumulado De La Notificación Sivigila Escritorio Sem_23_2024 - Subred Sur Occidente Localidad Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LA NOTIFICACION SIVIGILA ESCRITORIO			
	% DE SEMANAS NOTIFICADAS POSITIVAS	% DE SEMANAS NOTIFICADAS NEGATIVAS	% SEMANAS SILENCIOSA	% DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA	100%	0%	0%	100%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	100%	0%	0%	100%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	100%	0%	0%	100%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	100%	0%	0%	100%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	100%	0%	0%	100%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	100%	0%	0%	100%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	100%	0%	0%	100%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS	100%	0%	0%	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	100%	0%	0%	100%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	100%	0%	0%	100%
EUSALUD MANDALAY	100%	0%	0%	100%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	95%	5%	0%	100%
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	100%	0%	0%	100%
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	100%	0%	0%	100%
VIRREY SOLIS IPS SA-KENNEDY	95%	0%	5%	95%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	100%	0%	0%	100%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	100%	0%	0%	100%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	100%	0%	0%	100%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	100%	0%	0%	100%
VIVA 1A IPS ALQUERIA	100%	0%	0%	100%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	100%	0%	0%	100%
VIVA 1A IPS VENECIA	100%	0%	0%	100%
CLINICA MEDICAL SAS	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO TINTAL	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO BONITO	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 10 ABASTOS	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 30 BOMBEROS	95%	5%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 50 MEXICANA	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 63 ALQUERÍA	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 68 BRITALIA	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 79 CARVAJAL	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 92 PATIOS	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 105 CATALINA	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL	100%	0%	0%	100%
SERVISALUD QCL KENNEDY	100%	0%	0%	100%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de la notificación positiva o negativa de la presencia de eventos objeto de vigilancia en salud pública en la semana epidemiológica de estudio. El 100% (n=44) de las UPGDs presentan cumplimiento de notificación positiva

DESARROLLO

Tabla 4 Desagregación De Eventos Individuales Notificados -Clasificación Inicial De Caso Acumulado Sem_23_ 2024, Kennedy

SECRETARÍA DE SALUD	DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACION INICIAL DE CASO					
NOMBRE RAZON SOCIAL	TOTAL DE CASOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS POR LA UPGD	SOSPECHOSOS	PROBABLES	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	65	24	4	8	28	0
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	173	82	6	33	51	0
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA	387	0	1	385	0	0
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	159	78	7	3	70	0
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	33	1	0	18	12	0
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	66	33	0	13	18	1
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	1040	175	252	53	555	0
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	158	31	9	62	55	0
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	21	2	0	6	3	0
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	875	187	40	120	526	1
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	61	26	1	9	19	0
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	32	14	2	3	11	0
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS	16	1	0	2	11	0
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	57	15	6	26	8	0
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	56	3	14	5	29	0
EUSALUD MANDALAY	53	5	3	0	43	0
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	121	0	0	1	116	0
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	9	0	0	3	0	0
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	98	0	0	97	0	0
VIRREY SOLIS IPS SA-KENNEDY	15	5	0	2	6	0
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	80	20	6	6	47	0
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	29	14	1	5	6	0
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	758	106	3	121	524	3
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	2	0	0	0	0	0
VIVA 1A IPS ALQUERIA	22	10	0	8	3	0
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	44	17	0	23	2	1
VIVA 1A IPS VENECIA	48	23	2	12	7	0
CLINICA MEDICAL SAS	120	15	1	21	81	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	1343	546	49	170	571	6
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO TINTAL	852	626	39	19	167	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO BONITO	97	22	5	1	67	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 10 ABASTOS	5	0	0	4	0	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 30 BOMBEROS	34	22	0	2	7	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 50 MEXICANA	145	135	1	4	3	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 63 ALQUERÍA	13	2	0	3	2	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 68 BRITALIA	7	4	0	0	1	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 79 CARVAJAL	5	0	0	3	0	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 92 PATIOS	8	1	0	0	3	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 105 CATALINA	15	14	0	0	0	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL	43	37	0	3	2	0
SERVISALUD QCL KENNEDY	18	9	1	0	6	0
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	36	19	3	2	10	0
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	177	52	18	47	57	0
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	181	73	18	34	55	0

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Describe la clasificación inicial de los eventos individuales notificados a SIVIGILA por la UPGD. Las UPGDs que presentan mayor notificación son : Unidad de servicios de Salud occidente de Kennedy 1343 eventos, ,Colsubsidio Roma 875 eventos, Clínica de occidente 758 eventos

DESARROLLO

Tabla 5 Oportunidad En La Notificación Semanal Acumulado Sem_23_ 2024 Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE LOS 8 DIAS DE CONSULTA	% DE OPORTUNIDAD
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	32	32	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	64	62	97%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA	385	102	26%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	72	72	100%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	22	21	95%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	25	23	92%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	703	702	100%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	89	89	100%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	7	7	100%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	557	551	99%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	26	26	100%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	15	15	100%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS	11	11	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	41	37	90%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	43	41	95%
EUSALUD MANDALAY	35	35	100%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	75	75	100%
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	3	3	100%
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	97	97	100%
VIRREY SOLIS IPS SA-KENNEDY	7	6	86%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	30	28	93%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	12	10	83%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	527	526	100%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	0	0	NA
VIVA 1A IPS ALQUERIA	10	10	100%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	25	22	88%
VIVA 1A IPS VENECIA	17	13	76%
CLINICA MEDICAL SAS	89	87	98%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	726	705	97%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO TINTAL	361	360	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO BONITO	62	62	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 10 ABASTOS	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 30 BOMBEROS	5	5	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 50 MEXICANA	6	6	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 63 ALQUERÍA	3	3	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 68 BRITALIA	0	0	NA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 79 CARVAJAL	3	3	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 92 PATIOS	1	1	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 105 CATALINA	0	0	NA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL	4	4	100%
SERVISALUD QCL KENNEDY	7	7	100%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	14	14	100%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	64	56	88%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	74	70	95%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación rutinaria son 8 días . El 67% (n=29) de las UPGDs realizaron oportunamente la notificación semanal

DESARROLLO

Tabla 6 Oportunidad En La Notificación Inmediata Acumulado Sem_23 _ 2024 Localidad De Kennedy

LUD	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION INMEDIATA		
NOMBRE RAZON SOCIAL	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE 1 DIAS	% DE OPORTUNIDAD
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	23	17	74%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	86	76	88%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA	1	1	100%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	86	76	88%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	1	1	100%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	33	26	79%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	284	268	94%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	31	27	87%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	2	2	100%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	253	188	74%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	26	18	69%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	14	11	79%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS	1	1	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	13	6	46%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	7	7	100%
EUSALUD MANDALAY	8	7	88%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	42	42	100%
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	0	0	NA
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	0	0	NA
VIRREY SOLIS IPS SA-KENNEDY	5	4	80%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	24	24	100%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	14	9	64%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	212	194	92%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	0	0	NA
VIVA 1A IPS ALQUERIA	10	9	90%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	17	12	71%
VIVA 1A IPS VENECIA	22	20	91%
CLINICA MEDICAL SAS	20	18	90%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	555	508	92%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO TINTAL	406	335	83%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO BONITO	29	20	69%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 10 ABASTOS	0	0	NA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 30 BOMBEROS	22	21	95%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 50 MEXICANA	135	105	78%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 63 ALQUERÍA	2	2	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 68 BRITALIA	4	4	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 79 CARVAJAL	0	0	NA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 92 PATIOS	1	1	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 105 CATALINA	14	13	93%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL	37	35	95%
SERVISALUD QCL KENNEDY	9	9	100%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	20	17	85%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	59	39	66%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	74	57	77%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación inmediata es un día. El 25% (n=11) de las UPGDs realizaron el 100% de la notificación inmediata oportuna.

DESARROLLO

Tabla 7 Oportunidad En El Ajuste De Casos/ Cumplimiento En El Ajuste De Caso Acumulado Sem_23_ 2024 Localidad De Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO										
	TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBALES NOTIFICADOS	AJUSTADOS DESCARTADOS (AJUSTE 6)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR LABORATORIO (AJUSTE 3)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR CLINICA (AJUSTE 4)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO (AJUSTE 5)	AJUSTADOS ERROR DE DIGITACIÓN (AJUSTE D)	TOTAL DE CASOS AJUSTADOS	CASOS PENDIENTES POR AJUSTE	% DE CASOS AJUSTADOS	NO APLICA MEDICION	% DE CASOS AJUSTADOS OPORTUNOS
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	28	7	0	0	0	0	2	0	100%	26	100%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	88	3	2	0	0	0	3	2	98%	83	33%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA	1	0	0	0	0	0	0	1	0%	0	
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	85	3	1	0	0	3	4	3	96%	78	100%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	33	0	0	0	0	0	0	0	100%	33	
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	427	151	93	6	0	1	3	3	99%	421	67%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	40	6	3	0	0	1	1	1	98%	38	100%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	2	0	0	0	0	1	0	1	50%	1	
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	227	7	30	4	0	1	7	2	99%	218	86%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	27	0	0	0	0	0	0	1	96%	26	
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	16	1	1	0	0	0	0	0	100%	16	
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	21	4	1	0	0	0	0	0	100%	21	
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	17	8	7	0	0	0	5	0	100%	12	100%
EUSALUD MANDALAY	8	2	0	0	0	0	2	1	88%	5	50%
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
VIRREY SOLIS IPS SA-KENNEDY	5	0	0	0	0	0	0	0	100%	5	
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	26	7	0	0	0	2	7	6	77%	13	86%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	15	1	0	0	0	0	1	0	100%	14	100%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	109	3	1	1	0	0	1	2	98%	106	100%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
VIVA 1A IPS ALQUERIA	10	0	0	0	0	1	0	1	90%	9	
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	17	0	0	0	0	0	0	0	100%	17	
VIVA 1A IPS VENECIA	25	1	0	0	0	0	0	0	100%	25	
CLINICA MEDICAL SAS	16	0	1	0	0	0	0	0	100%	16	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	595	67	86	2	0	4	137	56	91%	402	85%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO TINTAL	665	54	160	0	0	7	202	83	88%	380	86%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO BONITO	27	2	0	3	0	0	1	0	100%	26	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 10 ABASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 30 BOMBEROS	22	0	0	0	0	0	0	0	100%	22	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 50 MEXICANA	136	0	0	0	0	2	0	3	98%	133	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 63 ALQUERÍA	2	0	0	0	0	0	0	0	100%	2	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 68 BRITALIA	4	1	0	0	0	0	1	0	100%	3	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 79 CARVAJAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 92 PATIOS	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 105 CATALINA	14	0	0	0	0	0	0	0	100%	14	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL	37	0	0	0	0	0	0	0	100%	37	
SERVISALUD QCL KENNEDY	10	0	1	0	0	0	0	0	100%	10	
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	22	2	1	0	0	0	1	0	100%	21	100%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	70	27	4	1	0	3	21	7	90%	42	100%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	91	10	9	0	0	0	4	4	96%	83	75%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

La Oportunidad mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la investigación realizada por la entidad territorial notificadora, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El cumplimiento Mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la revisión realizada por la Subred, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El 23% (n=10) de las UPGDs realizaron el ajuste de casos oportunamente.

DESARROLLO

Tabla 8 Cumplimiento Y Calidad En El Ingreso De Laboratorios De Los Eventos Confirmados Por Laboratorio Sem_23_ 2024 Kennedy

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO		
	NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO (INGRESO Y AJUSTE)	NUMERO CASOS CON REPORTE POSITIVO, REACTIVO O COMPATIBLE INGRESADO EN EL MODULO LABORATORIO DEL SISTEMA	% CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	8	8	100,0%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM KENNEDY	31	31	100,0%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA	385	385	100,0%
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	3	2	66,7%
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	18	15	83,3%
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS SAS	11	11	100,0%
CRUZ ROJA COLOMBIANA SCB SEDE ALQUERIA	143	142	99,3%
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY - COMPENSAR	63	61	96,8%
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA	6	6	100,0%
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	147	147	100,0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERA DE MAYO	9	9	100,0%
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA-KENNEDY	4	4	100,0%
CONSULTORIO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS	2	2	100,0%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	25	25	100,0%
EUSALUD CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	12	12	100,0%
EUSALUD MANDALAY	0	0	
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORAL	0	0	
IVAN ORTIZ ORDOÑEZ	3	3	100,0%
CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENNEDY	92	92	100,0%
VIRREY SOLIS IPS SA-KENNEDY	2	2	100,0%
VIRREY SOLIS IPS SA OCCIDENTE	4	4	100,0%
VIRREY SOLIS IPS SA BOSA	5	5	100,0%
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	121	118	97,5%
ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	0	0	
VIVA 1A IPS ALQUERIA	8	6	75,0%
VIVA 1A IPS SA KENNEDY	20	18	90,0%
VIVA 1A IPS VENECIA	12	12	100,0%
CLINICA MEDICAL SAS	21	21	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	249	239	96,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO TINTAL	175	175	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO BONITO	1	1	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 10 ABASTOS	4	3	75,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 30 BOMBEROS	2	2	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 50 MEXICANA	4	4	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 63 ALQUERÍA	3	3	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 68 BRITALIA	0	0	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 79 CARVAJAL	3	3	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 92 PATIOS	0	0	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 105 CATALINA	0	0	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL	3	3	100,0%
SERVISALUD QCL KENNEDY	1	1	100,0%
SERVISALUD QCL OCCIDENTE	3	3	100,0%
CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS	43	43	100,0%
CENTRO MEDICO KENNEDY EPS SANITAS	43	43	100,0%

Fuente: Bases Sivigila SE 17 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado del ingreso de laboratorios positivos, reactivos o compatibles de eventos notificados y ajustados como confirmados por laboratorio. 66% (n=29) presentan el 100% de cumplimiento. En el ingreso de laboratorios confirmados por laboratorio.

DESARROLLO

Tableros De Indicadores Localidad De Puente Aranda

Tabla 9 Cumplimiento En La Entrega Del Reporte Semanal Sivigila 4.0 SEM_ 23_ 2024 Subred Sur Occidente. Localidad De Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL REPORTE SEMANAL SIVIGILA 4.0						
	NOTIFICACION OPORTUNA	NOTIFICACION FIN DE SEMANA	NOTIFICACION VIERNES	DIGITACION EISP CAPTURA LINEA	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS EVALUADAS PARA EL MES	% CUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	0	0	0	5	5	5	100%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SA	0	1	0	4	5	5	100%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	3	1	0	1	5	5	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	1	2	0	2	5	5	100%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	1	0	0	4	5	5	100%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	3	2	0	0	5	5	100%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE	0	0	0	5	5	5	100%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	0	2	0	3	5	5	100%
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	0	0	0	5	5	5	100%
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	0	0	0	5	5	5	100%
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	0	0	0	5	5	5	100%
FERNANDO BARON BARRERA	0	0	0	5	5	5	100%
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	1	1	0	3	5	5	100%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	0	0	0	5	5	5	100%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AMERICAS	2	2	0	1	5	5	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 26 ALCALÁ MUZÚ	1	0	0	4	5	5	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 35 CUNDINAMARCA	0	0	1	4	5	5	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 36 ASUNCIÓN BOCHICA	0	0	0	5	5	5	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALAN	1	0	0	4	5	5	100%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	0	0	0	5	5	5	100%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	2	3	0	0	5	5	100%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	0	2	0	3	5	5	100%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	1	1	0	3	5	5	100%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	0	1	0	4	5	5	100%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	3	1	0	1	5	5	100%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	0	0	0	5	5	5	100%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	4	0	0	1	5	5	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 100% (n=27) de las UPGDs no cumplieron con la entrega del reporte semanal del SIVIGLA 4.0.

DESARROLLO

Tabla 10 Porcentaje De Silencio Epidemiológico Acumulado Sem_23_ 2024 - Subred Sur Occidente Localidad De Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	PORCENTAJE DE SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO	
	NUMERO DE SEMANAS EN LAS QUE LA UPGD NO CUMPLIO CON LA NOTIFICACION SEMANAL (DIA Y HORA ESTABLECIDA)	% INCUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	0	0%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SA	0	0%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	0	0%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	0	0%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	0	0%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	0	0%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE	0	0%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	0	0%
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	0	0%
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	0	0%
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	0	0%
FERNANDO BARON BARRERA	0	0%
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	0	0%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	0	0%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AMERICAS	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 26 ALCALÁ MUZÚ	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 35 CUNDINAMARCA	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 36 ASUNCIÓN BOCHICA	0	0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALAN	0	0%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	0	0%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	0	0%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	0	0%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	0	0%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	0	0%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	0	0%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	0	0%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	0	0%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Corresponde al % semanal, de la entrega del reporte de notificación los días y horas NO establecidos para cada nivel del flujo de información, a través del Sivigila, sin exceptuar los festivos. El 100% (n=27) de las UPGDs no cumplió con la notificación semanal en este periodo.

DESARROLLO

Tabla 11 Cumplimiento Acumulado De La Notificación Sivigila Escritorio Sem_23_ 2024 - Subred Sur Occidente Localidad Puente Aranda.

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LA NOTIFICACION SIVIGILA ESCRITORIO			
	% DE SEMANAS NOTIFICADAS POSITIVAS	% DE SEMANAS NOTIFICADAS NEGATIVAS	% SEMANAS SILENCIOSA	% DE CUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	100%	0%	0%	100%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SA	100%	0%	0%	100%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	100%	0%	0%	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	100%	0%	0%	100%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	100%	0%	0%	100%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE	100%	0%	0%	100%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	68%	32%	0%	100%
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	91%	0%	9%	91%
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	95%	0%	5%	95%
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	86%	0%	14%	86%
FERNANDO BARON BARRERA	95%	0%	5%	95%
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	100%	0%	0%	100%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	100%	0%	0%	100%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AMERICAS	73%	27%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 26 ALCALÁ MUZÚ	86%	14%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 35 CUNDINAMARCA	91%	9%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 36 ASUNCIÓN BOCHICA	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALAN	100%	0%	0%	100%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	91%	9%	0%	100%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	100%	0%	0%	100%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	100%	0%	0%	100%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	100%	0%	0%	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado de la notificación positiva o negativa de la presencia de eventos objeto de vigilancia en salud pública en la semana epidemiológica de estudio. El 96% (n=26) de las UPGDs presentan un cumplimiento acumulado de la notificación SIVIGILA escritorio.

DESARROLLO

Tabla 12 Desagregación De Eventos Individuales Notificados -Clasificación Inicial De Caso Acumulado Sem_23_2024, Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	DESAGREGACIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS -CLASIFICACION INICIAL DE CASO					
	TOTAL DE CASOS INDIVIDUALES NOTIFICADOS POR LA UPGD	SOSPECHOSOS	PROBABLES	CONFIRMADO POR LABORATORIO	CONFIRMADO POR CLINICA	CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	54	39	2	4	7	0
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SA	47	29	0	7	9	0
IPS SURA PLAZA CENTRAL	78	15	1	39	21	0
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	236	180	0	1	53	0
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	78	21	3	28	23	0
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	1018	459	47	56	454	1
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE	10	0	0	6	0	0
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	109	1	0	51	48	0
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	2	0	0	0	0	0
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	2	0	0	0	0	0
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	3	0	0	0	0	0
FERNANDO BARON BARRERA	2	0	0	0	0	0
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	77	30	0	30	16	0
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	31	9	0	5	15	0
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AMERICAS	19	2	1	5	2	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 26 ALCALÁ MUZÚ	7	1	0	0	0	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 35 CUNDINAMARCA	15	1	1	2	2	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 36 ASUNCIÓN BOCHICA	15	10	0	1	2	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALAN	136	31	2	4	95	0
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	12	9	0	0	0	0
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	54	32	0	12	9	0
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	72	36	2	10	23	0
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	33	3	1	22	5	0
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	98	40	3	27	24	0
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	324	132	0	92	98	0
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	132	107	5	5	12	0
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	1257	223	135	217	679	0

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Describe la clasificación inicial de los eventos individuales notificados a SIVIGILA por la UPGD , Las instituciones que presentaron mayor numero de eventos notificados en este periodo fueron las UPGDs : Unidad de Urgencias Puente Aranda EPS SANITAS 1257 eventos ,Virrey Solís IPS Américas 1018 eventos , Centro médico Zona IN 100 324 eventos.

DESARROLLO

Tabla 13 Oportunidad En La Notificación Semanal Acumulado Sem_23_ 2024 Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE LOS 8 DIAS DE CONSULTA	% DE OPORTUNIDAD
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	12	12	100%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SA	14	14	100%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	50	48	96%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	20	17	85%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	31	30	97%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	463	458	99%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE	6	5	83%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	0	0	NA
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	0	0	NA
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	0	0	NA
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	0	0	NA
FERNANDO BARON BARRERA	0	0	NA
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	30	29	97%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	15	14	93%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AMERICAS	4	2	50%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 26 ALCALÁ MUZÚ	0	0	NA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 35 CUNDINAMARCA	4	3	75%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 36 ASUNCIÓN BOCHICA	3	3	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALAN	95	95	100%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	0	0	NA
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	8	8	100%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	33	33	100%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	8	8	100%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	39	35	90%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	83	83	100%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	14	13	93%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	831	828	100%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación rutinaria son 8 días). El 93% (n= 27) de las UPGDs presentan oportunidad en la notificación dentro de los 8 días de consulta .

DESARROLLO

Tabla 14 Oportunidad En La Notificación Inmediata Acumulado SEM_23_ 2024 Localidad De Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION INMEDIATA		
	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS	TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS DENTRO DE 1 DIAS	% DE OPORTUNIDAD
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	39	36	92%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SA	29	23	79%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	16	10	63%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	180	140	78%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	20	20	100%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	468	363	78%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE	0	0	NA
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	1	1	100%
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	0	0	NA
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	0	0	NA
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	0	0	NA
FERNANDO BARON BARRERA	0	0	NA
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	30	28	93%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	10	4	40%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AMERICAS	3	1	33%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 26 ALCALÁ MUZÚ	1	1	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 35 CUNDINAMARCA	1	1	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 36 ASUNCIÓN BOCHICA	10	7	70%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALAN	32	28	88%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	9	9	100%
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	32	31	97%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	36	29	81%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	3	3	100%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	40	35	88%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	133	99	74%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	108	85	79%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	310	280	90%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Mide el promedio de días comprendidos entre la consulta y la notificación del caso al Sivigila. (para los eventos de notificación inmediata es un día. El 70% (n=19) de las UPGDs presentaron oportunidad en la notificación inmediata dentro de 1 día.

DESARROLLO

Tabla 15 Oportunidad En El Ajuste De Casos/ Cumplimiento En El Ajuste De Caso Acumulado Sem_23_ 2024 Localidad De Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO										
	TOTAL DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBALES NOTIFICADOS	AJUSTADOS DESCARTADOS (AJUSTE 6)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR LABORATORIO (AJUSTE 3)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR CLINICA (AJUSTE 4)	AJUSTADOS CONFIRMADO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO (AJUSTE 5)	AJUSTADOS ERROR DE DIGITACIÓN (AJUSTE D)	TOTAL DE CASOS AJUSTADOS	CASOS PENDIENTES POR AJUSTE	% DE CASOS AJUSTADOS	NO APLICA MEDICION	% DE CASOS AJUSTADOS OPORTUNOS
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	41	1	1	0	0	0	0	0	100%	41	
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SA	29	0	0	0	0	0	0	0	100%	29	
IPS SURA PLAZA CENTRAL	16	1	0	0	0	0	1	0	100%	15	100%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	180	2	0	1	0	2	2	2	99%	176	50%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	24	4	0	0	0	1	0	1	96%	23	
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	506	48	14	1	0	4	17	6	99%	483	71%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
FERNANDO BARON BARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	30	0	0	0	0	0	0	0	100%	30	
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	9	0	0	0	0	0	0	0	100%	9	
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AMERICAS	3	1	0	0	0	0	1	0	100%	2	100%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 26 ALCALÁ MUZÚ	1	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 35 CUNDINAMARCA	2	0	0	0	0	0	0	0	100%	2	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 36 ASUNCIÓN BOCHICA	10	0	0	0	0	0	0	0	100%	10	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALAN	33	0	2	0	0	0	0	0	100%	33	
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	9	0	0	0	0	0	0	0	100%	9	
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	32	0	0	0	0	0	0	0	100%	32	
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	38	1	0	0	0	1	0	1	97%	37	
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	4	0	1	0	0	0	0	0	100%	4	
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	43	2	0	1	0	0	3	3	93%	37	100%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	132	1	0	0	0	0	1	0	100%	131	100%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	112	4	1	0	0	0	1	0	100%	111	100%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	358	57	78	0	0	0	51	3	99%	304	96%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

La Oportunidad mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la investigación realizada por la entidad territorial notificadora, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación.

El cumplimiento Mide el % de casos notificados al Sivigila con clasificación inicial de probables o sospechosos, se debe definir su clasificación final de caso, posteriormente a la revisión realizada por la Subred, esta clasificación puede ser confirmación, descarte por laboratorio o unidad de análisis, descarte por error de digitación. El 22% (n= 6) de las UPGDs presentaron oportunidad en los ajustes de casos acumulados

DESARROLLO

Tabla 16 Cumplimiento Y Calidad En El Ingreso De Laboratorios De Los Eventos Confirmados Por Laboratorio Sem_23_ 2024 Puente Aranda

NOMBRE RAZON SOCIAL	CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN EL INGRESO DE LABORATORIOS DE LOS EVENTOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO		
	NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO (INGRESO Y AJUSTE)	NUMERO CASOS CON REPORTE POSITIVO, REACTIVO O COMPATIBLE INGRESADO EN EL MODULO LABORATORIO DEL SISTEMA	% CUMPLIMIENTO
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE PLAZA CENTRAL	5	5	100,0%
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SA	7	6	85,7%
IPS SURA PLAZA CENTRAL	39	39	100,0%
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	2	2	100,0%
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	28	28	100,0%
VIRREY SOLIS IPS AMERICAS	67	67	100,0%
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE	5	5	100,0%
RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	0	0	
TOMAS FERNANDO PEREIRA ARMERO	0	0	
JESUS ALBERTO PEREIRA ARMERO	0	0	
CONSULTORIO MEDICO JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA	0	0	
FERNANDO BARON BARRERA	0	0	
VIVA 1A IPS LAS AMERICAS	22	22	100,0%
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA	5	3	60,0%
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AMERICAS	2	2	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 26 ALCALÁ MUZÚ	0	0	
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 35 CUNDINAMARCA	2	2	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 36 ASUNCIÓN BOCHICA	1	1	100,0%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALAN	6	6	100,0%
POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	0	0	
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	11	11	100,0%
CENTRO DE REHABILITACION BASAN	10	10	100,0%
DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	23	23	100,0%
CENTRO MEDICO CALLE 13 LOCAL 17 EPS SANITAS	25	24	96,0%
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100 EPS SANITAS	81	81	100,0%
CENTRO MEDICO PLAZA CENTRAL EPS SANITAS	6	4	66,7%
UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS	291	287	98,6%

Fuente: Bases Sivigila SE 23 Subred Suroccidente

Mide el % acumulado del ingreso de laboratorios positivos, reactivos o compatibles de eventos notificados y ajustados como confirmados por laboratorio. El 59% (n=16) de las UPGDs realizaron el ingreso de los laboratorios de eventos confirmados por laboratorio con calidad

DESARROLLO

NOTIFICACION SIVIGILA 4.0 Y ESCRITORIO

a. Antes de 12 m semanal: todos los lunes inmediatos: todos los días.

b. se solicita enviar pantallazo de soporte de notificación Sivigila 4.0 que incluya hora y fecha

c. la notificación a nivel distrital cambio, de esta manera **los martes no se recibirán notificaciones**, y quienes no cumplan con él envió el lunes hasta las 12 del mediodía generaran silencio epidemiológico.

d. Desde la subred se realizará **requerimiento inmediato** a todas las UPGD que no reporten eventos de interés en salud pública por semana epidemiológica – silencio epidemiológico- (se hará búsqueda activa institucional – BAI - Acta de seguimiento) dado el incumplimiento de oportunidad en la notificación.

e. Una notificación tardía (después de las 12 M) es considerada Notificación en **SILENCIO en** SIVIGILA 4.0 Y ESCRITORIO

f. se oficiará los silencios en SIVIGILA 4.0, Y en la asistencia técnica periódica se evaluará los silencios reiterativos dejando Plan de Mejora. Recuerde que si presento silencio, inoportunidad o error en carga de archivos en 4,0 se le citara a reunión virtual obligatoria en el transcurso de la semana con el grupo técnico

Semana epidemiológica

a. Se recuerda que la semana epidemiológica es de domingo a sábado, de acuerdo a lo anterior la notificación semanal se debe realizar de acuerdo al horario de prestación de servicios de la institución,

b. Si tienen consultas los días sábados se debe notificar hasta terminarlas, en los casos que atienden urgencias solo se podrá notificar hasta el domingo o lunes antes de mediodía. Recuerden por favor que ahora se está validando fecha y hora de **Novedades Notificación SVIIGLA**

por direccionamiento de la secretaria distrital de salud a todas las UPGD, que a las 11:00am no han notificado se enviara un correo electrónico a las 11:30am solicitando la notificación

DESARROLLO

Notificaciones errores de carga - tardío semanal Sivigila 4.0 – Semana 18
Localidad Puente Aranda

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110012376501	CENTRO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y REHABILITACIÓN	GINA PATRICIA VALENCIA	06/05/2024 08:20.16	110012376501_18.zip	6/05/2024 08:20.16	18	ya fue cargado anteriormente
110012376501	CENTRO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y REHABILITACIÓN	GINA PATRICIA VALENCIA	06/05/2024 08:19.43	110012376501_18.zip	6/05/2024 08:19.43	18	Ya fue cargado anteriormente

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110017103601	POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	STHEFANYA ACOSTA CRUZ	06/05/2024 15:32.05	110017103601_18.ZIP	06/05/2024 15:32.05	18	TARDIO

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

Notificación errores de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 18 Kennedy

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA INICIAL CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110010735901	LUIS ANTONIO ARROYO OROZCO	LUIS ANTONIO ARROYO OROZCO	06/05/2024 11:33.05	110010735901_17.zip	6/05/2024 11:33.05	17	OTRAS SEMANAS
110010735901	LUIS ANTONIO ARROYO OROZCO	LUIS ANTONIO ARROYO OROZCO	06/05/2024 11:32.32	110010735901_15.zip	6/05/2024 11:32.32	15	YA FUE CARGADO - OTRAS SEMANAS
110010735901	LUIS ANTONIO ARROYO OROZCO	LUIS ANTONIO ARROYO OROZCO	06/05/2024 11:31.58	110010735901_16.zip	6/05/2024 11:31.58	16	ERROR DE CARGA - OTRAS SEMANAS
110013383001	LUIS ALFREDO SIBAJA ESCALANTE	LUIS ALFREDO SIBAJA ESCALANTE	05/05/2024 20:24.12	110024654684_18.zip	5/05/2024 20:24.12	18	CODIGO MAL

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

DESARROLLO

Notificaciones errores de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 19
Localidad Puente Aranda

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110018511382	DISPENSARIO MEDICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	JUAN CAMILO SANCHEZ GRAJALES	11/05/2024 11:16.06	110018511382_18.zip	11/05/2024 11:16.06	18	YA FUE CARGADO ANTERIORMENTE/OTRAS SEMANAS
110013510501	RUBEN DARIO GUTIERREZ MARTINEZ	ADRIANA TORRES	11/05/2024 08:57.27	PLANOS_SEMANA_19_2024-05-11T08_45_10.zip	11/05/2024 08:57.27		NO CONTIENE LA ESTRUCTURA CORRECTA
110013510501	RUBEN DARIO GUTIERREZ MARTINEZ	ADRIANA TORRES	11/05/2024 08:48.53	PLANOS_SEMANA_19_2024-05-11T08_45_10.zip	11/05/2024 08:48.53		NO CONTIENE LA ESTRUCTURA CORRECTA
110013510501	RUBEN DARIO GUTIERREZ MARTINEZ	ADRIANA TORRES	11/05/2024 08:45.53	PLANOS_SEMANA_19_2024-05-11T08_45_10.zip	11/05/2024 08:45.53		NO CONTIENE LA ESTRUCTURA CORRECTA
110013510501	RUBEN DARIO GUTIERREZ MARTINEZ	ADRIANA TORRES	11/05/2024 08:45.18	PLANOS_SEMANA_19_2024-05-11T08_45_10.zip	11/05/2024 08:45.18		NO CONTIENE LA ESTRUCTURA CORRECTA
110011804201	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	10/05/2024 18:28.26	110011804201_19.zip	10/05/2024 18:28.26	19	YA FUE CARGADO ANTERIORMENTE
110011804201	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	10/05/2024 18:22.40	110011804201_19.zip	10/05/2024 18:22.40	19	YA FUE CARGADO ANTERIORMENTE
110011804201	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	10/05/2024 18:22.17	110011804201_19.zip	10/05/2024 18:22.17	19	YA FUE CARGADO ANTERIORMENTE

Fuente: Base Sivigila SE 24, Subred suroccidente 2024

DESARROLLO

Notificación inoportuna semanal Sivigila 4.0 – Semana 19
Localidad Puente Aranda

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110011864101	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN MÉDICA SAS	HUMBERTO REYNALES LONDOÑO	14/05/2024 7:40.06	110011864101_19.zip	14/05/2024 7:40.06	19	TARDIO

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

Notificación errores de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 19 Kennedy

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA INICIAL CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110011908622	VIVA 1A IPS VENECIA	NEBIS MARGARITA GOMEZ	13/05/2024 11:20.23	110011908622_18.zip	13/05/2024 11:20.23	18	OTRAS SEMANAS
110010262701	CARLOS PEREZ CASTILLO	CARLOS PEREZ CASTILLO CT20231222	11/05/2024 11:54.33	110010262701_19.zip	11/05/2024 11:54.33	19	YA FUE CARGADO
110010262701	CARLOS PEREZ CASTILLO	CARLOS PEREZ CASTILLO CT20231222	11/05/2024 11:54.33	110010262701_19_XLS.zip	11/05/2024 11:54.33		YA FUE CARGADO - NO CONTIENE LA ESTRUCTURA CORRECTA

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

DESARROLLO

Notificación inoportuna semanal Sivigila 4.0 – Semana 19
Kennedy

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA INICIAL CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110011768201	ADRIAN GUTIERREZ RUIZ	WILMER ADRIAN GUTIERREZ	13/05/2024 12:03.23	110011768201_19.zip	13/05/2024 12:03.23	19	TARDIO

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

Notificaciones errores de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 20
Localidad Puente Aranda

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110013378501	HEALTH SUPPORT AR SAS	ADRIANA RIVERA	20/05/2024 10:49.57	110013378501_20.zip	20/05/2024 10:49.57	20	ya fue cargado anteriormente
110011804201	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	18/05/2024 18:41.19	PLANOS_SEMANA_20_2024-05-18T18_39_04.zip	18/05/2024 18:41.19		No contiene la estructura correspondiente
110011804201	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	18/05/2024 18:41.01	PLANOS_SEMANA_20_2024-05-18T18_39_04.zip	18/05/2024 18:41.01		No contiene la estructura correspondiente
110013907101	IPS SAN MARTIN BOGOTA SAS	PAOLA VASQUEZ QUIROGA	18/05/2024 15:35.53	Resultados_Notificacion_2024-05-18T08_48_48.zip	18/05/2024 15:35.53		No contiene la estructura correspondiente

DESARROLLO

110013907101	IPS SAN MARTIN BOGOTA SAS	PAOLA VASQUEZ QUIROGA	18/05/2024 15:21.44	reporte de notificacion positiva negativa silencio.zip	18/05/2024 15:21.44		No contiene la estructura correspondiente
110011243705	RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	JOHANA MARCELA RICO ALEMAN	18/05/2024 09:10.03	110011243707_20.zip	18/05/2024 09:10.03	20	Código mal
110013510501	RUBEN DARIO GUTIERREZ MARTINEZ	ADRIANA TORRES	14/05/2024 13:08.28	110013510501_19.zip	14/05/2024 13:08.28	19	Otras semanas
110011864101	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN MÉDICA SAS	LIZETH DAYANNA PEREA DIAZ	14/05/2024 07:40.00	110011864101_19.zip	14/05/2024 07:40.00	19	Otras semanas

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

Notificación inoportuna semanal Sivigila 4.0 – Semana 20
Localidad Puente Aranda

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110012261601	ANTONIO JOSE LEONARDO AMAYA BERNAL	ANGIE LISETH CUESTA LOZANO		110012261601_19.zip		20	TARDIO
110010817159	CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	YEIMY MARTINEZ	20/05/2024 12:17.06	110010817159_20.zip	20/05/2024 12:17.06	20	TARDIO

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

DESARROLLO

Notificación errores de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 20 Kennedy

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA INICIAL CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110010672501	CENTRO DE ESPECIALISTAS DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	CRISTIAN MARTINEZ	18/05/2024 10:00.59	110011766001_20.zip	18/05/2024 10:00.59	20	Código mal
110013252605	IPS DE TODOS PATIO BONITO	NATALIA DEL PILAR RODRÍGUEZ SEPULVEDA	14/05/2024 09:17.08	110013252605_19.zip	14/05/2024 09:17.08	19	Otras Semanas

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

Notificación inoportuna semanal Sivigila 4.0 – Semana 21
Localidad Puente Aranda

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR	UI/UPGD- +/-
110011284801	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS	AIDA MARITZA REYES CASTAÑEDA	27/05/2024 12:04.06	110011284801_21.zip	27/05/2024 12:04.06	21	TARDIO	1 -

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

Relación de errores de carga semanal - semana 15 Puente Aranda

DESARROLLO

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL CARGA	SEM_CARGA	ERROR
110012123803	BIENESTAR IPS SAS	ERIKA TONGUNO	15/04/2024 11:29.33	110012123812_15.ZIP	15/04/2024 11:29.33	15	Código mal
110010918654	CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA	SANDRA MILENA MARTINEZ BRAVO	15/04/2024 10:04.58	110010918608_15.ZIP	15/04/2024 10:04.58	15	Código mal
110011243705	RIESGO DE FRACTURA SA CAYRE	JOHANA MARCELA RICO ALEMAN	13/04/2024 10:58.07	110011243705_15.ZIP	13/04/2024 10:58.07	15	Error de carga
110011140099	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE ARANDA	DIANA GAMBOA CELIS	09/04/2024 11:04.26	110011140099_14.ZIP	09/04/2024 11:04.26	14	Error de carga/Otras Semanas
110011140099	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO-PUENTE ARANDA	DIANA GAMBOA CELIS	09/04/2024 11:04.03	110011140099_14.ZIP	09/04/2024 11:04.03	14	Error de carga/Otras Semanas

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

Notificación con error de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 22
Localidad Puente Aranda

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR	UI/UPGD -+/-
110011779602	LUIS HERNANDO BUITRAGO ALDANA	LUIS HERNANDO BUITRAGO ALDANA	03/06/2024 07:37.16	110011779602_22.zip	03/06/2024 07:37.16	22	El archivo se encuentra vacío	1

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

DESARROLLO

Notificación con error de carga semanal Sivigila 4.0 – Semana 22
Kennedy

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL	SEM	ERROR	UPGD-UI
110010559733	CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	DIANA CAROLINA PARRA	01/06/2024 13:01.16	PLANOS_SEMANA_22_SIVIGILA_4_0_2024-06-01T12_37_36.zip	01/06/2024 13:01.16		EL NOMBRE NO CONTIENE LA ESTRUCTURA CORRECTA	2 +
110010559733	CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	DIANA CAROLINA PARRA	01/06/2024 12:55.35	PLANOS_SEMANA_22_SIVIGILA_4_0_2024-06-01T12_37_36.zip	01/06/2024 12:55.35		EL NOMBRE NO CONTIENE LA ESTRUCTURA CORRECTA	2 +
110010559733	CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM AVENIDA AMERICAS	DIANA CAROLINA PARRA	01/06/2024 12:54.04	PLANOS_SEMANA_22_SIVIGILA_4_0_2024-06-01T12_37_36.zip	01/06/2024 12:54.04		EL NOMBRE NO CONTIENE LA ESTRUCTURA CORRECTA	2 +
110013029612	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 50 MEXICANA	NAYSIUN LIZETH SIERRA BARRERA	31/05/2024 17:42.27	110013029612_21.zip	31/05/2024 17:42.27	21	OTRAS SEMANAS	2
110013029605	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 10 ABASTOS	ORLANDO MUÑOZ SANTIBAÑEZ	31/05/2024 15:05.09	110013029605_21.zip	31/05/2024 15:05.09	21	OTRAS SEMANAS	2
110010899504	PROFAMILIA KENNEDY	INGRID MARTINEZ AYALA	31/05/2024 11:33.36	110010899501_22.zip	31/05/2024 11:33.36	22	CODIGO MAL - PILOTO	1

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

DESARROLLO

Notificación inoportuna semanal Sivigila 4.0 – Semana 23
Localidad Fontibón

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO	FECHA FINAL DE CARGA	SEM_CARGA	ERROR	UI/ UPGD-+/-
110010198801	SAMUEL NIÑOTORRES	SAMUEL NIÑO TORRES	10/06/2024 22:29.54	110010198801_23.zip	10/06/2024 22:29.54	23	Tardio	1

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

Relación de tardíos semana 17 Puente Aranda

CODIGO	ENTIDAD	USUARIO	FECHA INICIAL CARGA	ARCHIVO CARGADO		SEM_CARGA	ERROR
110017103601	POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA	STHEFANYA ACOSTA CRUZ	29/04/2024 14:08.56	110017103601_17.zip	29/04/2024 14:08.56	17	Tardio
110011804201	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	29/04/2024 14:02.41	110011804201_17.zip	29/04/2024 14:02.41	17	Tardio
110013029609	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 35 CUNDINAMARCA	KAREN DANIELA MONTENEGRO REAL	29/04/2024 14:16.41	110013029609_17.zip	29/04/2024 14:16.41	17	Tardío

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

Notificación en sivigila escritorio de eventos colectivos – Semana 23

CÓDIGO UPGD	ENTIDAD	EVENTO	FECHA INICIAL CARGA	ERROR
110010135301	ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	998	8/06/2024	Evento habilitado en SIVIGILA WEB
110010135301	ANGEL MARIA RIVERA LEGUIZAMON	995	8/06/2024	Evento habilitado en SIVIGILA WEB
110012211801	GEORGE RENE NOEL CORONADO	995	8/06/2024	Evento habilitado en SIVIGILA WEB
110013029601	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	995	8/06/2024	Evento habilitado en SIVIGILA WEB
110010481401	ALBERTO FANDIÑO ÁVILA	995	8/06/2024	Evento habilitado en SIVIGILA WEB
110011804201	LUIS ERNESTO URIBE PEÑA	995	8/06/2024	Evento habilitado en SIVIGILA WEB

DESARROLLO

Fuente: Base Sivigila SE 23, Subred suroccidente 2024

NOVEDADES SIVIGILA WEB 4.0

República de Colombia

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 00002138 DE 2023

(19 DIC 2023)

Por la cual se adoptan los lineamientos de transversalización del enfoque de género en el sector salud para el cierre de brechas por razones de sexo, género, identidad de género y orientación sexual.

la inclusión de las variables se da por la sentencia t-033 de la corte constitucional

" guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional" del DANE, esto con el fin de cumplir el estándar definido por el sistema estadístico nacional

Desde el 24 de abril entra en disposición **del módulo de captura en línea de Sivigila 4.0** para los eventos de interés de interés en salud pública, esto permitirá mejorar la oportunidad en la captación de los casos y por ende la posibilidad de generar alertas y tomar medidas de control más efectivas en su entidad territorial.

DESARROLLO

EVENTOS AUTORIZADOS - CAPTURA EN LÍNEA

ORDEN	CODIGO EVENTO	NOMBRE EVENTO	HABILITADO DESDE.. PARA CARGA EN LINEA
1	113	DESNUTRICION AGUDA EN MENOR DE 5 AÑOS	25/04/2023
2	346	IRA POR VIRUS NUEVO	25/04/2023
3	348	IRAG INUSITADO	25/04/2023
4	210	DENGUE	25/04/2023
5	220	DENGUE GRAVE	25/04/2023
6	580	MORTALIDAD POR DENGUE	25/04/2023
7	465	MALARIA	25/04/2023
8	880	VIRUELA SIMICA	25/04/2023
9	452	LESIONES POR AE	25/04/2023
10	365	INTOXICACIONES	25/04/2023
11	591	MORTALIDAD INTEGRADA EN MENORES DE 5 AÑOS	25/04/2023
12	250	ENCEFALITIS DEL NILO OCCIDENTAL EN HUMANOS	25/04/2023
13	270	ENCEFALITIS EQUINA DEL OESTE EN HUMANOS	25/04/2023
14	275	ENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE EN HUMANOS	25/04/2023
15	290	ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA EN HUMANOS	25/04/2023
16	295	ENFERMEDADES DE ORIGEN PRIONICO	25/04/2023
17	320	FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	25/04/2023
18	330	HEPATITIS A	25/04/2023
19	551	MORTALIDAD MATERNA - DATOS BASICOS	25/04/2023
20	620	PAROTIDITIS	25/04/2023
21	630	PESTE (BUBONICA/NEUMONICA)	25/04/2023
22	780	TIFUS EPIDEMICO TRANSMITIDO POR PIOJOS	25/04/2023
23	790	TIFUS ENDEMICO TRANSMITIDO POR PULGAS	25/04/2023
24	831	VARICELA INDIVIDUAL	25/04/2023
25	342	ENFERMEDADES HUERFANAS	19/05/2023
26	900	EVENTO SIN ESTABLECER	19/05/2023
27	740	SIFILIS CONGENITA	8/06/2023
28	750	SIFILIS GESTACIONAL	8/06/2023
29	345	IRA GRAVE (VIGILANCIA CENTINELA)	28/06/2023
ORDEN	CODIGO EVENTO	NOMBRE EVENTO	HABILITADO DESDE.. PARA CARGA EN LINEA
30	230	DIFTERIA	2/08/2023
31	710	RUBEOLA	2/08/2023
32	730	SARAMPION	2/08/2023
33	420	LEISHMANIASIS CUTANEA	2/08/2023
34	430	LEISHMANIASIS MUCOSA	2/08/2023
35	440	LEISHMANIASIS VISCERAL	2/08/2023
36	901	EVENTO COLECTIVO SIN ESTABLECER	2/08/2023
37	998	EDA COLECTIVO	2/08/2023
38	830	VARICELA COLECTIVO	2/08/2023
39	621	PAROTIDITIS COLECTIVO	2/08/2023
40	549	MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	16/08/2023
41	560	MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	14/09/2023
42	610	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA	17/10/2023
43	670	RABIA HUMANA	17/10/2023
44	352	INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO - INDIVIDUAL	17/10/2023
45	362	INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO	17/10/2023
46	100	ACCIDENTE OFÍDICO	24/10/2023
47	535	MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA	24/10/2023
48	800	TOS FERINA	27/10/2023
49	205	CHAGAS	14/11/2023
50	217	CHIKUNGUNYA	14/11/2023
51	300	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	14/11/2023
52	200	COLERA	29/11/2023
53	450	LEPRA	29/11/2023
54	453	LESIONES DE CAUSA EXTERNA	29/11/2023
55	720	SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA	29/11/2023
56	760	TÉTANOS ACCIDENTAL	29/11/2023
57	455	LEPTOSPIROSIS	16/02/2024
58	355	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS ETAS (INDIVIDUAL)	16/02/2024

DESARROLLO

- **DISPONIBILIDAD DE LOS EVENTOS SIVIGILA 4.0**

❖ Leptospirosis (Cod.455)
❖ Enfermedades trasmitidas por alimentos ETAs (Individual)(Cod. 355)

EVENTOS CON DATOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS

- 113 - Desnutrición aguda en menores de 5 años
- 348 – IRAG inusitado
- 210 – Dengue
- 220 – Dengue grave
- 580 – Mortalidad por Dengue
- 465 – Malaria
- 880 – Viruela Símica
- 452 – Lesiones por AE
- 365 – Intoxicaciones
- 591 – Mortalidad integrada en menores de 5 años
- 342 – Enfermedades Huérfanas
- 900 – Evento individual sin establecer
- 740 - Sífilis congénita
- 750 - Sífilis gestacional
- 345 - ESI - IRAG (Vigilancia Centinela)
- 230- Difteria
- 710 – Rubeola
- 730 – Sarampión
- 549 – Morbilidad materna extrema
- 610 – Parálisis Flácida Aguda
- 420 - Leishmaniasis cutánea
- 430 - Leishmaniasis Mucosa
- 480 - Leishmaniasis Visceral
- 670 – Rabia Humana
- 560 - Mortalidad perinatal y neonatal tardía
- 352 - Infecciones De Sitio Quirúrgico Asociadas A Procedimiento Médico Quirúrgico – Individual
- 100 - Accidente ofídico
- 535 - Meningitis Bacteriana Y Enfermedad Meningocócica
- 800 - Tos Ferina
- 205 - Chagas
- 217 - Chikunguña
- 300 - Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia
- 200- Cólera
- 450- Lepra
- 453- Lesión de causa externa
- 720- Síndrome de rubeola congénita
- 760-Tetanos Accidental

EVENTOS CON SOLO DATOS BÁSICOS

- 250 – Encefalitis Del Nilo Occidental En Humanos
- 270 - Encefalitis Equina Del Oeste En Humanos

DESARROLLO

- 275 - Encefalitis Equina Del Este En Humanos
- 290 - Encefalitis Equina Venezolana En Humanos
- 295 - Enfermedades De Origen Priónico
- 320 - Fiebre Tifoidea Y Paratifoidea
- 330 - Hepatitis A
- 346 – IRA por virus nuevo
- 551 - Mortalidad Materna - Datos Básicos
- 620 – Parotiditis
- 630 - Peste (Bubónica/Neumónica)
- 780 - Tifus Epidémico Transmitido Por Piojos
- 790 - Tifus Endémico Trasmitido Por Pulgas
- 831 - Varicela Individual
- **EVENTOS COLECTIVOS**

- 901 – Evento colectivo sin establecer
- 998 – EDA Colectivo
- 830 – Varicela colectivo
- 621 – Parotiditis colectivo
- 362 - Infecciones De Sitio Quirúrgico Asociadas A Procedimiento Médico Quirúrgico

Directorio Subred Sur Occidente Localidad De Fontibón

LOCALIDAD	TECNICO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
KENNEDY	FRANKLIN DAVID LOZANO	3242846446	Tecnicosivigila8@subredsuroccidente.gov.co
PUENTE ARANDA	GIOVANNY ORTEGA	3502970073	Tecnicosivigila16@subredsuroccidente.gov.co

8. INDICADORES PAI

Recomendaciones

- Realizar correlación clínica y verificación de nexo epidemiológico al momento de notificar algún evento de interés en salud pública.

- La presentación finaliza socializando las recomendaciones que el Componente Geográfico consideró apropiadas, en un nivel sectorial, intersectorial e interinstitucional, por ello, se mencionan aquellas entidades que pueden tener injerencia en la problemática abordada.

- Se recomienda realizar constantemente el lavado de manos con el fin de disminuir los casos de EDA.

- Se recomienda implementar medidas de ahorro del agua en los procesos operativos de las UPGD e implementar los planes de contingencia durante los días de racionamiento en las zonas correspondientes.

DESARROLLO

Conclusiones

1. Se deben generar estrategias de ahorro y cambio de conciencia frente al uso responsable del agua en la comunidad.
2. Se deben generar estrategias de ahorro y cambio de conciencia frente al uso responsable del agua en la comunidad.

9. EVALUACION, LISTADO DE ASISTENCIA Y CIERRE.

Se realiza la evaluación con un QR generado en el Pre alistamiento y se comparte además otro QR para el listado digital de cierre.

FECHA: 17/05/2024	TEMA: Comité de Vigilancia Epidemiológica, correspondiente a la localidad de Kennedy-Puente Aranda

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Enviar las presentaciones a las UPGD a los correos registrados en el listado virtual de asistencia.	EQUIPO SIVIGILA	12 días después de la reunión.
Socializar la información recibida en la reunión al interior de las unidades notificadoras y dejar soporte por escrito de este proceso	UPGD	Máximo 15 días después de desarrollada la reunión.

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia.

VER ANEXO LISTADOS DE ASISTENCIAS

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | ACTA | Versión: 4 | Fecha de aprobación: 15-09/2021 | Código: 02-01-F0-0001 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 21-06-2024 | TEMA: Cove Local Kennedy - Puente Aranda (Expositores)

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Brayan Fernandez	1019123135	USS - Boston	Ing catastral	DGRSC	Brayan
2	Nicolás Montes S.	1032459053	USS Boston	Geógrafo	G. Geográfico	
3	Carlos Carrillo	1023924390	SDS- Subred Sur occidente	Ingeniero Ambiental	Subsidiario	Carlos Alcantara
4	Jesid Adrian Rojas	1070765585	USS-Boston	Epidemiologo	GRSC	
5	Camila Gabriela Garcia	1032415230	GAHO	Coordinadora	GAHO	
6	Erika Martinez	52704546	USS Boston	Enfermera EEVV	DGRSC	
7	Carlos Acevedo	1143369789	USS Boston	Medico	GRSC	
8	Nidia Alvarez Sanchez	28 386 926	Uss Boston	Epidemiologa	GRSC	Nidia Alvarez
9	Jaime García	79613097	USS Boston	Epidemiologo	GRSC	
10	FIRMADA HERRERA	1.032396090	UPA 11 Ronda Aranda & Especializado		GPAIS-PAC	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | ACTA | Versión: 4 | Fecha de aprobación: 15-09/2021 | Código: 02-01-F0-0001 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 27-06-2024 | TEMA: Cove Local Kennedy - Puente Aranda

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Mayra Porras Araiq	1030554571	CM Plaza de las Americas EPS Sanitas	Enfermera	Consulta externa	
2	Laura Katherin Castro	1024552477	Vivia la Puente Aranda	Enfermera	VSP.	
3	Judy Andrea Pinzón Jaimes	1.096.957773	Centro Medico Plaza centrales EPS sanitas	Enfermera	Apoyo SIVIGILA	
4	Maria Alejandra Cubo	52755593	Uss Kennedy	Coordinadora	G. Riesgo	
5	Jessica Lorena Abril	1012427113	Health Support	Gestor Salud	Gestor Riesgo	Jessica Abril
6	Yolima Florido P	52835608	Cruz Roja Sumo alberra	Aux de Enfermeria	Salud Publica	Yolima F
7	Alejandra Suárez Wiela	35490841	USS Tribilidad Bolon	Aux enfermeria	Ambulatorio	
8	Tatiana Mora R.	1069178031	CEDIT SAS	Recepcionista	Administrativo	
9	Pilar Hernandez	1030670919	UMS Kennedy	Enfermera	Salud Publica	Pilar H
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | ACTA | Versión: 4 | Fecha de aprobación: 15-09/2021 | Código: 02-01-F0-0001 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 21-06-2024 | TEMA: Cove Local Kennedy-Puente Aranda

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Karen Lorena Celis Cruz	1022406350	Viva 1A IPS las Americas	Enfermera	Sivigila	Karen Celis
2	Mayra Rojas A	1032421491	cra 11e 13 local 17 piso 2	Enfermera	Sivigila	
3	Gabriela Palencia G.	1098807681	Clinica Cafam	enfermera	Sivigila	Gabriela P.
4	Erika Viviana Sabogal	1032490887	Unidad medica Sante & Asesores	Enfermera	Sivigila	
5	Daniela Castro	52984067	CRH Bosan	Enfermera	Salud Publica	
6	ANGIE CARRILLO	1007707359	CAFE IPS	ENFERMERA	SIVIGILA	
7	Laura Ramos	1007370643	Maria auxiliadora	enfermeria	asistencial	Laura R.
8	Jenny Andrea O	1022367348	USS Fatima	Aux Enfer	Sivigila	
9	Giovanna Sosa M	1024518441	Cafam Americas	Enfermera jefe	SIVIGILA	
10	Cristina Parra	51854632	Drs. Pereira	Aux. Archivo	Archivo	Cristina Parra
11	Valentina Lopez Moreno	1035630294	Derisalud.	Enfermera	Sivigila	
12	Carlos Cortaza Cabana	1002280670	Consultorio Biologico	Aux. Adm.	SAdm.	Carlos C.
13	Eva Medina Vila	1002480372	C/Marca	Aux enfermeria	Sivigila	
14	Paula Andrea Saenz Arias	1007648249	IPS clinica Red Humana	Enfermera	Sivigila	Paula Saenz
15	Angie Lorena Cardozo	1233489548	Eusalud CTO	Aux Epidemiologia	Sivigila	Angie C.
16	Laura Cotes Bermudez	1006184	Eusalud Kennedy	Aux epidemiologia	Calidad	
17	Diana Gamboa Celis	1102385004	Canel Modelo	Enfermera	Sivigila	Diana Gamboa
18	karen paola pino G.	1022376690	cra kennedy Eps Sanitas	enfermera	Sivigila	karen pino

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | ACTA | Versión: 4 | Fecha de aprobación: 15-09/2021 | Código: 02-01-F0-0001 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 21-06-2024 | TEMA: Cove Local Kennedy - Puente Aranda

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Rosa Elena Triana	52835929	Britalde	Aux Enf	Ambulatorio	
2	Rosa Elena Triana	52835929	Tintal	Aux Enf	Ambulatorio	
3	Gud Astrid Ortiz Páez	52910214	Bomberos USS	Aux Enfermería	Ambulatorios	
4	Yiseth Katerine Morales Herrera	52983519	Centro médico Colmasistencia	Aux Enfermería	Consulta Externa	
5	Leidi Sanabria Zamudio	1026600430	Idime S.A	Aux. Puente Seguro	Puente Seguro	
6	Kelly Astrid Ceballos	1061720439	COA	Aux sivigila	Sivigila	
7	Olga Cecilia Pena	51 [illegible]	EM Manuela Beltrán	Enfermera	Vigilancia Epidemiológica	
8	Yeimy Liser Martinez	1020712725	CM Colsubsidio Plaza Central	Enfermera	Consulta Externa	
9	Martha Rocio Elias Sanchez R	51.933.335	USS Catalina Jose	Auxiliar de Enfermeria	Ambulatorio	
10	Ivett Rodriguez	52760922	Ips Dorsalud	Aux enfermeria	Vacunacion	
11	Yurley Tapiero V	52833591	Consimed cols plaza A	Aux Enfermeria	Sivigila	
12	Luz Dary Gil Alvarez	52773252	Dr Ivan Ortiz O.	Aux Enf.	Consulta Externa	
13	Jenny Silva	52951720	clinica del occidente	Auxiliar de epidemiologia	Epidemiologia	
14	Yeni Alexandra Barrera	1024202219	CM Juan Plaza central	Aux salud Publica	Salud Publica	
15	Angie Katerine Silva	1018497878	cm colsubsidio Plaza de las Americas	Enfermera	Vigilancia Epidemiologica	
16	Johanna Escobar R.	39679132	DMBOG Armada Nacional	Enfermera	SIVIGILA	
17	Angela Milena Castro Pena	52988858	DMEFA - Dispensario FAC	Auxiliar de Enfermeria	SIVIGILA	
18	Yolanda Aparicio V	1032404444	Dr Juan Jose Cedrel	AS. Administrativo	Administrativo	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | ACTA | Versión: 4 | Fecha de aprobación: 15-09/2021 | Código: 02-01-F0-0001 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 21-06-2024 | TEMA: Cove local Kennedy - Puente Aranda

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Angela Serrezuelo	52890258	Clinica Roma	Enfermera	Epidemiologia	Angela Serrezuelo
2	Yolesma Esther Lanado A.	1093784780	Clinicas ips	Aux. Enfermeria	Salud publica	
3	Mariana Valdes Romero	1.193.435.033	CM Ipanema Colsubsidio	Enfermera	PEP - VSP	Mariana Valdes
4	Yuly Alejandra Molina Avila	1024569232	VNA 19 Moreno	Enfermera	Salud Publica	Yuly Molina
5	Oscar Varela	1033609252	Hos SUR PATZ CENTRAL	Médico	Salud Pública	Oscar Varela
6	Andrea Rivero Fonseca	53028693	Compensar Kennedy	Aux. Enfermeria	Salud pública	Andrea R
7	Angie Viviana Garcia	1012362443	Capm Kennedy	Aux Enfermera	Salud Pública	Angie Garcia
8	Catalina Guevara C	1015465640	CM casa Luker	Medico	Consulta Externa	catalina G
9	Cristina Ramos L.	52634706	Secretaria Zonal JN/100	Enfermera	Sivigila	Cristina Ramos
10	Karen Agamez	1001937646	CAVIDA Kennedy	AUX ENFERMERIA	salud publica	Karen A
11	Carlos Diaz S	79459910	USS SANTOS	AUX ENF.	CONSULTA EXT.	
12	Monica Segura	1026594040	USS Castilla Real	Aux Enf	Ambulatorio	Monica S
13	Ana Maria Hernandez	1062674065	USS Argelia USS Asunción Bochica	Aux Enfermera	Ambulatorios	
14	Martha Yaneth Triviño G	52122519	USS Alcala Muzu	Aux Enferme	Ambulatorio	
15	Mario Carolino Cante	1006563820	CNSP	Coord Epidemiologia	Epidemiologia y SP	
16	Katherin Gallego	1019079370	Clinica Fontibon SAS	Aux Enfermera	Epidemiologia	Katherin G
17	Neyi Paola Medina	52287998	Patios 92	AUX Enfermeria	Ambulatorio	
18	Nayshin Sierra	1012404159	USS 50 Mexicana	Aux Enfermera	Ambulatorio	