




Lo que debes saber sobre MPOX

Es una **enfermedad infecciosa** causada por:



- ➔ Virus: **Orthopoxvirus**
- ➔ Familia: **Similitud con viruela**
- ➔ Gravedad: **Menos grave**

Definición de caso de MPOX

La **notificación de MPOX** debe basarse en el cumplimiento de criterios clínicos y epidemiológicos. Se debe priorizar la identificación de lesiones compatibles y antecedentes en los últimos 21 días, especialmente viaje al exterior o contacto con casos confirmados de Clado Ib, además de otros factores de exposición como contacto estrecho, nuevas parejas sexuales o eventos masivos.

SÍNTOMAS

- Dolor muscular.
- Dolor de espalda.
- Ganglios linfáticos inflamados.
- Fiebre 38°C +
- Dolor de cabeza.
- Cansancio.
- Escalofríos.
- Erupción cutánea distintiva: manchas, pústulas, costras, típicamente comienza en cara/ manos/ genitales.

MODO DE TRANSMISIÓN



Contacto directo con la erupción, costras o fluidos corporales.



Contacto prolongado cara a cara, a través de gotitas respiratorias.



Contacto con materiales contaminados, como ropa o sábanas de una persona infectada.

¿QUE HACER SI PRESENTAS SÍNTOMAS?



AISLARSE DE INMEDIATO
Evite contacto, use tapabocas.



CONSULTE A LOS SERVICIOS DE SALUD
Acuda a la unidad de servicios de salud o contacte a su EPS.



INFORME A SUS CONTACTOS ESTRECHOS
Avisé a contactos últimos 21 días.



NO SE AUTOMEDIQUE
No use cremas sin fórmula, no reviente lesiones.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón.



Vacunación para grupos de riesgo, según recomendaciones de salud.




Evita el contacto físico cercano con personas confirmadas o sospechosas, incluyendo sexual.




Limpieza y desinfección.


El comportamiento epidemiológico del evento MPOX por residencia durante el 2022-2026 semana 25 en la Subred Sur Occidente, con una incidencia de 0,6 casos por 100.000 habitantes. La caracterización molecular evidenció la circulación exclusiva del Clado IIB en 2026, con 15 casos confirmados, consolidándose como el Clado predominante; para los años 2022 a 2025 no se dispuso de resultados de caracterización molecular.



Fuente: Base SIVIGILA Evento 880 (MPOX) Año 2022-2026 Semana 25 Subred Sur Occidente-Saludata saludcapital.gov.co/osb/indicadores/mpox/ Proyecciones Poblacional DANE Año 2026




A semana epidemiológica 25 del 2026, se notificaron 39 casos sospechosos de MPOX, de los cuales 15 fueron confirmados, siendo Kennedy la localidad con mayor concentración de notificaciones (n=14 casos), Bosa y Fontibón registraron el mismo número de casos confirmados ambas con 5.




Localidad	Notificados	Confirmados	Tasa de incidencia por 100000 hab
Bosa	11	5	0,6
Kennedy	14	4	0,4
Fontibón	8	5	1,3
Puente Aranda	6	1	0,4
Total	39	15	0,6

Fuente: Base SIVIGILA Evento 880 (MPOX) Año 2022-2026 Semana 25 Subred Sur Occidente-Saludata saludcapital.gov.co/osb/indicadores/mpox/-Proyecciones Poblacional DANE Año 2026



Grupo de edad

Con mayor predominio en adultos jóvenes (20–39 años). El grupo de 35–39 años concentró el 33,3 % de los casos confirmados (n=5 casos), seguido de los grupos de 20–24 y 25–29 años, con 20 % (n=3 casos) cada uno, comportamiento que se asocia con una mayor interacción social, movilidad y redes de contacto propias de la población en edad productiva.



Fuente: Base SIVIGILA Evento 880 (MPOX) Año 2022-2026 Semana 25 Subred Sur Occidente-Saludata saludcapital.gov.co/osb/indicadores/MPOX



Régimen de afiliación


El 93,3 % de los casos confirmados correspondió al régimen contributivo (n=14 casos), lo que podría estar asociado con un mayor acceso y oportunidad en la atención en salud, así como con condiciones laborales, movilidad y mayor interacción social.

Régimende afiliación	Notificados		Confirmados	
	No.	%	No.	%
Contributivo	11	45,8 %	14	93,3 %
Especial	1	4,2 %		
No asegurado	2	8,3 %		
Excepción	3	12,5 %	1	6,7%
Subsidiado	7	29,2 %		
Total	24	100 %	15	100 %

Fuente: Base SIVIGILA Evento 880 (MPOX) Año 2022-2026 Semana 25 Subred Sur Occidente-Saludata saludcapital.gov.co/osb/indicadores/mpox

Orientación sexual de los casos de MPOX

Los casos confirmados se distribuyeron de forma similar entre personas heterosexuales y gay/lesbiana, con el 46,7 % (n=7) en cada grupo. Esta distribución refleja la circulación del evento en diferentes grupos poblacionales, asociada con las redes de contacto, las dinámicas de interacción social, el acceso a información para la prevención y la oportunidad en la consulta y el diagnóstico.



Orientación sexual	Notificados		Confirmados	
	No.	%	No.	%
Heterosexual	17	70,8 %	7	46,7 %
Gay/Lesbiana	5	20,8 %	7	46,7 %
Bisexual	2	8,3 %	1	6,7 %
Total	24	100 %	15	100 %

Fuente: Base SIVIGILA Evento 880 (MPOX) Año 2022-2026 Semana 25 Subred Sur Occidente-Saludata saludcapital.gov.co/osb/indicadores/mpox

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DESDE LA SUBRED SUR OCCIDENTE

- Vigilancia epidemiológica
 - Seguimiento y control
 - Fortalecimiento al personal de salud
- Notificación oportuna de casos
 - Toma de muestras
 - Educación y Comunicación del riesgo