


Cáncer de cuello uterino

¡La prevención salva vidas!

Es un tumor maligno que se origina en las células del cuello de la matriz (parte inferior del útero). También se conoce como cáncer de cérvix o cáncer cervicouterino.

Afecta a mujeres en edad productiva y reproductiva; su diagnóstico tardío incrementa los costos de atención.



El **Virus del Papiloma Humano (VPH)** es la principal infección de transmisión sexual.



Hay más de **100 tipos de VPH**. Los tipos **16 y 18** son los responsables del 70% de los cánceres de cuello uterino.

Factores de riesgo



Múltiples parejas sexuales



Infección por VPH




Otras Infecciones de Transmisión Sexual



Sistema inmunitario Debilitado



Inicio de relaciones sexuales a temprana edad



Uso prolongado de anticonceptivos orales.



Tabaquismo

Signos de alerta



Sangrado anormal y después de las relaciones sexuales



Flujo vaginal abundante o con mal olor



Dolor pélvico



Períodos menstruales prolongados y abundantes



Pérdida de peso, cansancio o falta de apetito

Prevención y detección temprana

- En Colombia es gratuita para niñas y niños entre 9 y 17 años (con enfoque principal en 9 años).

Vacunación VPH



- De 25 a 65 años.
- En el grupo de 25 a 29 años, la tamización se realiza mediante citología con una periodicidad de 3 años cuando el resultado es negativo.
- A partir de los 30 años y hasta los 65 años, se mantiene la citología dentro del proceso de tamización y adicionalmente se incorpora la prueba de ADN – VPH.

Citología Cervicouterina



- De 30 a 65 años.
- Esquema 1-5-5
- Cada 5 años ante resultado Negativo.

Prueba ADN - VPH



Cifras de cáncer de cuello uterino



En el Mundo 2022



Según datos de la Organización Mundial de la Salud -OMS- se registraron más de

600.000

nuevos casos en África Subsahariana, América Central y Asia Sudoriental, cerca de

350.000

mueres atribuibles a esta enfermedad



En Bogotá

2024

Se reportaron
2.018
casos nuevos, lo que equivale a
48,8
mujeres por cada 100.000

2025

Se reportaron
2.043
casos nuevos, lo que equivale a
49,5
mujeres por cada 100.000


En la Subred Sur Occidente

2024

Se registraron
420
casos nuevos

2025

Se registraron
406
casos nuevos



Objetivos de la estrategia de Eliminación del cáncer del cuello uterino de la OMS para 2030

90% de las niñas han sido vacunadas contra el VPH a los 15 años

70% de las mujeres se han sometido a una prueba de detección de alto rendimiento a los 35 años y, nuevamente, a los 45 años

90% de las mujeres a las que se ha diagnosticado enfermedad cervicouterina están en tratamiento

Referencias:

Organización Mundial de la Salud. Cáncer de Cuello Uterino [Internet]. 2025 [Citado 01 Mar 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
Instituto Nacional del Cáncer. Cáncer de Cuello Uterino. [Internet]. 2023 [Citado 1 Mar 2026]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/germenes-infecciosos/vph-y-cancer>
Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. [Internet]. [Citado 9 Mar 2026]. Disponible en: <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/morbilidad-cancer-de-cuello-uterino#>.
Ministerio de Salud y Protección Social. Observatorio Nacional de Cáncer. [Internet]. [Citado 1 Mar 2026]. Disponible en: https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncancer/Paginas/info_general_cuellouterino.aspx