

TOSFERINA

DEFINICIÓN

La tosferina es la consecuencia de una infección causada por la bacteria *Bordetella pertussis*, que afecta al aparato respiratorio (pulmones y vías respiratorias).

Síntomas

Secreción nasal



Malestar general



Ataques de tos



Fiebre



Vómito inducido por la tos



Dificultad para respirar



Coloración morado al toser (cianosis)




¿Cómo se transmite?



El contagio se produce de persona a persona, a través de gotas respiratorias producidas al toser o estornudar, o por contacto directo con secreciones.



Cualquier persona que tenga contacto con un caso de tosferina puede desarrollar la enfermedad.



Población vulnerable

- Menores de una año
- Niños con esquema de vacunación incompleto
- Gestantes y cuidadores
- Personas con comorbilidades

Complicaciones

- Neumonía
- Convulsiones
- Deshidratación
- Pérdida de peso

Prevención



Vacunación



Lavado de manos



Uso de tapabocas

Cumplir con el esquema es la medida mas eficaz y contempla


- Primera dosis a los 1,5 meses
- Segunda a los 3 meses
- Tercera a los 4,5 meses
- Refuerzos a los 18 meses y 5 años.
- Gestantes, su administración desde la semana 20 de embarazo

Fuentes: Protocolo del instituto Nacional de Salud
Tos ferina
Protocolo de vigilancia salud pública tosferina. V5
Guía de practica clínica ministerio de protección social



Secretaria Distrital de Salud de Bogotá
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
Vigilancia en Salud Pública

Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública

COMPORTAMIENTO TOSFERINA 2019 Y 2025



La subred Sur Occidente registro 91 casos positivos durante los años 2019 (n=19), 2024 (n=0) y 2025 (n=72), datos preliminares con un aumento del 2,8%



Grupos de edad	2019	2025	Total
Primera infancia	15	43	58
Infancia	1	4	5
Adolescencia	1	4	5
Juventud	2	7	9
Adultez	0	10	10
Vejez	0	4	4
Total	19	72	91

COMPORTAMIENTO TOSFERINA 2025

