



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
**Sur Occidente E.S.E.**

# **LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PERSONAS EN CURSO DE VIDA VEJEZ; ASOCIADA A FACTORES RELACIONADOS CON LA SINDEMIA POR COVID-19- LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA**



**BOGOTÁ**

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Tabla de contenido

CAPITULO I.....	1
Violencia intrafamiliar en personas en curso de vida vejez; asociada a factores relacionados con la sindemia por Covid-19 -Localidad de Puente Aranda .....	1
1. Introducción.....	1
2. Metodología .....	3
2.1 Dato espacial.....	4
2.2. Objetivos específicos y variables .....	5
2.3. Tamaño de la muestra.....	5
2.4. Consideraciones éticas.....	6
3. Resultados .....	6
3.1. Análisis epidemiológico.....	6
3.2. Análisis espacial .....	9
4. Conclusiones.....	12
5. Recomendaciones de respuesta.....	12
6. Referencias bibliográficas .....	14
CAPITULO II .....	15
RESUMEN .....	15
INTRODUCCIÓN .....	15
METODOLOGIA.....	16
RESULTADOS.....	17
CAPITULO 1 SIVIGILA.....	19
CAPITULO 2: VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LOS EVENTOS TRANSMISIBLES.....	22
1. Sistemas de información para el subsistema transmisibles .....	22
2. Articulación con otros procesos del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)	22
3. Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC).....	23
3.1. Mortalidad por infección respiratoria aguda – IRA .....	25
3.2. Tuberculosis / VIH.....	25
4. Contención de eventos mediante bloqueos .....	26
Unidades de análisis por eventos transmisibles .....	28

CAPITULO 3: COVID 19 .....	29
CAPITULO 4: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS .....	38
5.    Equipo de Respuesta Inmediata .....	38
6.    Proyecto de mantenimiento seguimiento y fortalecimiento a la estrategia de vigilancia epidemiológica en puntos de entrada, terminales portuarios .....	41
6.1.  Muestreo aleatorio.....	42
6.2.  Comunicación del riesgo .....	42
6.2.1.  Indicador del proceso.....	43
CAPITULO 5: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LOS EVENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES .....	43
7.    Vigilancia en Salud Pública de los eventos asociados a la ocupación SIVISTRA .....	43
8.    Eventos asociados a condiciones crónicas no transmisibles .....	55
8.1.  Cáncer en menores de 18 años Evento 115. ....	56
8.2.  Indicadores de vigilancia y análisis de riesgo en salud .....	59
8.2.1.  Indicadores de análisis del riesgo en salud y seguimiento alerta temprana ...	59
8.2.2.  Cáncer de Mama Evento 155 .....	60
8.2.3.  Cáncer de cuello uterino .....	64
9.    Vigilancia Epidemiológica en Salud Oral SISVESO .....	69
9.1.  Población con y sin respuesta .....	77
10.   Vigilancia en Salud Pública de la Discapacidad .....	77
10.1.  Seguimiento a Personas con Discapacidad (PCD) Positivas por COVID- 1977	
10.2.  Seguimiento a Cuidadores de Personas con Discapacidad Positivas por COVID-19 en Alta dependencia .....	81
10.3.  Seguimiento a Cohortes de Eventos Congénitos.....	84
10.4.  Cohorte Malformaciones Congénitas – Evento 215 Defectos Congénitos....	85
10.5.  Cohorte Hipotiroidismo Congénito – Evento 215 Defectos Congénitos.....	86
10.6.  Cohorte Síndrome de Down – Evento 215 Defectos Congénitos .....	87
CAPITULO 6: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LOS EVENTOS DE SALUD MATERNO INFANTIL -SMI- Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-SSR- .....	89
11.   Mortalidad Materna.....	89
CAPITULO 7: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE EVENTOS PRIORITARIOS EN SALUD MENTAL.....	93

16.	Subsistema SISVECOS .....	93
17.	Subsistema SIVIM.....	98
18.	Subsistema VESPA.....	104
19.	Subsistema SIVELCE .....	111
CAPITULO 8: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LOS EVENTOS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES SISVAN .....		124
20.	Malnutrición en niños menores de 5 años, escolares y adolescentes ....	124
20.1.	Malnutrición en menores de 5 años .....	124
20.2.	Análisis de la notificación del evento 113 desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años, de acuerdo a SIVIGILA Subred Sur Occidente. ....	125
20.3.	Análisis según índice de masa corporal y retraso en talla en menores de 5 a 17 años	127
20.4.	Malnutrición en Adultos .....	127
20.5.	Evento 110 bajo peso al nacer .....	128
20.6.	Evento 591 - vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por desnutrición.....	129
CAPITULO 9: VIGILANCIA COMUNITARIA PARA EL ABORDAJE DE LA SALUD PÚBLICA .....		129
21.	Notificación Problemáticas Colectivas PCO .....	129
22.	Investigaciones socio epidemiológicas de campo. ISEC.....	133
23.	Comités de Vigilancia epidemiológica comunitaria (COVECOM).....	149
24.	Identificación de riesgos colectivos .....	154
CAPITULO 10: ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y ESTADÍSTICAS VITALES – GESTIÓN DEL COMPONENTE.....		163
25.	Análisis de mortalidad infantil .....	166
LISTA DE TABLAS.....		173
LISTA DE FIGURAS.....		178
ANEXOS .....		1

# CAPITULO I

## **Violencia intrafamiliar en personas en curso de vida vejez; asociada a factores relacionados con la sindemia por Covid-19 -Localidad de Puente Aranda**

### **1. Introducción**

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que la presencia del COVID 19 correspondía a una pandemia en el mes de marzo de 2020. En todo el mundo se han creado estrategias para contener el virus intentando que las consecuencias por su contagio no sean tan severas, no obstante, han sido muchos los fallecimientos por esta causa. Todas las medidas que se han tomado a nivel global han generado situaciones de estrés en la población, que en algunas ocasiones se traduce en agresiones inclusive en el mismo hogar, la violencia intrafamiliar lamentablemente es una realidad que viven día a día mujeres, niñas, niños, adolescentes, hombres y adultos mayores. (1)

Los cambios surgidos por el aislamiento social, las medidas de bioseguridad han repercutido en el estilo de vida de las personas, la economía y el trabajo, provocando inestabilidad y aumento las necesidades en los hogares, la población escolar en todos los niveles se enfrentó a una educación virtual que se improvisó dando respuesta al contexto del momento histórico. El retorno a las aulas apenas está reiniciando después de un confinamiento prolongado durante aproximadamente 2 años. Todos estos factores han sido propiciantes de abusos de todo tipo, la convivencia en espacios que son reducidos en muchas ocasiones y en donde confluyen todos los miembros de la familia crea situaciones de estrés, roces personales, que sumados a las problemáticas financieras y laborales desencadenan en alteraciones de la salud mental, violencia física o psicológica que se torna repetitiva y cuya superación es bastante difícil.(1,2)

Con respecto al adulto mayor (persona de 60 años o más), corresponde a sujetos activos socialmente, con responsabilidades sobre si mismo, su familia y la sociedad, sin embargo, la vejez se caracteriza por ser *un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas.*(3) Estos cambios en este curso de vida, hace vulnerables a los mayores frente a determinadas situaciones, sin embargo, el proceso de envejecimiento no es igual para todos. Durante largo tiempo de la pandemia, por riesgo de contagio, complicaciones y fallecimientos, se mantuvo su confinamiento y restricciones sociales para los mayores de sesenta años, por lo que su tiempo de encierro en las viviendas fue mayor a lo habitual, provocando mayor ansiedad. Así mismo personas mayores, también son víctimas de diferentes formas de violencia: agresión física, sexual o de tipo psicológico o emocional; por dependencia económica o material, abandono, desatención o irrespeto; aspectos acentuados durante el confinamiento. (3,4)

Según datos publicados por la OMS, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años, fueron víctimas de algún tipo de agresión en ellos espacios comunitarios. La población adulta mayor pasará de 900 millones en 2015 a 2000 millones en 2050, por lo que el problema de violencia contra este grupo puede acrecentarse (320 millones de víctimas para entonces sino se establecen estrategias para detener la problemática, generando lesiones físicas delicadas y secuelas psicológicas por tiempo prolongado.(4)

La prevalencia mundial de maltrato a personas mayores corresponde a 15,7% según una revisión sistemática realizada en el año 2017; así mismo, en este estudio se determinaron las prevalencias para algunos países como en el caso del Reino Unido que oscila entre el 2 al 6%, España 3%, Canadá 6% y Estados Unidos llega al 10%. (5) Antes de la pandemia, en Estados Unidos cada año 1 de cada 10 ancianos era víctima de algún tipo de agresión, durante la pandemia esta razón se modificó a 1 de cada 5 adultos mayores, con un incremento del 83;6% con respecto a las estimaciones de prevalencia antes de la pandemia, como mayor factor de riesgo se asoció la tensión financiera vivida en estos momentos. (6) En América Latina la tasa se encuentra entre el 10 y el 12%, por año se han registrado 38.000 casos de violencia contra los mayores. Sin embargo, en este evento se encuentra un subregistro por las pocas denuncias de los adultos, por temor a represalias de sus propios familiares o por incapacidad para ejercer este proceso. (7)

En lo que concierne a Colombia los casos sospechosos de violencia física, psicológica, negligencia o abandono y sexual, disminuyó en el año 2020 en relación con los años 2019 y 2018. Esta disminución está muy asociado al mismo aislamiento; en el año 2020 la notificación disminuyó notablemente desde la semana 12, la cual corresponde temporalmente cuando se decretó el aislamiento obligatorio en el país. Antes de esta semana los casos de notificación estuvieron superiores a los del año 2018 y 2019, excepto en la semana uno. Se destacan los departamentos porcentajes superiores a la tasa nacional, entre ellos se encuentra Huila, Amazonas, Vaupés, Valle del Cauca y Cundinamarca.

En el contexto colombiano, existen tres factores que favorecen el maltrato en las personas mayores a saber: exposición a la violencia a gran escala, el género y la inversión en la pirámide poblacional. Según la encuesta Nacional de Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE), se determinó que en Colombia las personas mayores, en mayor proporción sufren de maltrato psicológico (12,3%), físico (3,4%), financiero (1,5%) sexual (0,3%). La encuesta reveló que existe una relación estrecha entre el maltrato físico, sexual y el estrato socioeconómico bajo, en especial en el estrato uno, mientras que en estratos más altos se tiene una mayor relación con maltrato financiera. En cuanto a la violencia psicológica sucede más en zona urbana mientras que los otros tipos de violencia suceden con mayor frecuencia en la zona rural. (7)

En la violencia psicológica existe una relación nociva entre el anciano y su cuidador en el que la persona adulta mayor padece de inseguridad, baja autoestima y angustia. Otros factores de riesgo asociados se relacionan con el género; las mujeres tienen mayor probabilidad de

ser víctimas, así mismo, las personas con algún tipo de dependencia tienen siete veces más de riesgo de padecer alguna forma de violencia que las personas independientes. (7)

De acuerdo con datos referidos por la defensoría del pueblo mencionan que:

*“Entre enero y julio de 2021 ocurrieron 1.852 muertes violentas de personas mayores en todo el país. En ese lapso fallecieron 739 en accidentes de tránsito, 518 en otro tipo de accidentes, 322 fueron asesinadas y otras 273 se suicidaron”.*(8)

Así mismo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó: *“1.673 casos de violencia interpersonal, 1.207 de violencia intrafamiliar y 36 reportes por presunto abuso sexual a personas mayores”.* (8)

Bogotá no es ajena a esta situación, según datos reportados por el observatorio SaluData, en el año 2020 se registraron 25.892 casos de violencia intrafamiliar, en donde se evidencia que en el ciclo vital de vejez se presentaron 1004 casos; de estos, el 68% de los casos corresponde al sexo femenino. Así mismo, en el primer semestre del año 2021 el reporte de casos en este evento a nivel distrital va en 12.947 casos de los cuales 610 casos ocurrieron en mayores de 60 años; el 67,7% de estos sucedieron en mujeres. (9)

Por lo tanto, desde Vigilancia en Salud Pública se propone como objetivo general: Describir el comportamiento de violencia intrafamiliar en el curso de vida vejez, durante la pandemia por COVID19, a través de las bases del sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual (SIVIM) y SISVECOS de los años 2020 y 2021, en la localidad de Puente Aranda planteando estrategias de prevención en esta población

## **2. Metodología**

Diseño observacional descriptivo retrospectivo de corte transversal.

La elección de la temática para el desarrollo de este boletín surgió de la priorización dada en las mesas de trabajo territoriales realizadas en conjunto con el proceso de Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad (ACCVSYE), los diferentes entornos y procesos, los subsistemas de Vigilancia en Salud Pública y el componente de Georreferenciación y análisis de información cartográfica de la Subred Sur Occidente con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud.

A través de la concertación con los actores involucrados (subsistemas entornos o procesos) se estableció para la localidad de Puente Aranda como núcleo problemático La violencia intrafamiliar en personas en curso de vida vejez; asociada a factores relacionados con la sindemia por Covid-19, priorizando la UPZ San Rafael. Se usaron como fuente de información las bases de datos cerradas del año 2020 y preliminares del año 2021 correspondientes al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual (SIVIM) y del subsistema de Vigilancia epidemiológica de la conducta suicida SISVECOS. Con respecto a la relación agresor víctima únicamente se caracterizó los datos de agresiones relacionados con el primer agresor.

## 2.1 Dato espacial

Con respecto a la representación espacial los datos de las bases de SIVIM de 2020 y 2021, donde se utiliza las direcciones para la localización espacial de datos, estos se procesaron y estandarizaron según el manual de direcciones de SDS, posteriormente se geocodifican por los geocodificadores de Secretaria Distrital de Salud (SDS) y de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA). Los datos que cumplieron con los criterios de la calidad del dato espacial con relación a los mensajes de estado del geocodificador de SDS que cumplen con los criterios de calidad son los siguientes con sus respectivas cantidades de casos por los años respectivos:

*Tabla 1. Calidad del dato espacial de las violencias intrafamiliares en ciclo de vida vejez en la localidad de Puente Aranda 2020 -2021*

Geo codificador	Mensaje de estado - Tipo de vía	# Casos año 2020	# Casos año 2021	Categoría
SDS	20 encontrado en predial exacto.	36	59	Con calidad
	31 encontrado en Malla Vial Exacta	3	3	Con calidad
	21 encontrado por aproximación predial en la misma manzana, interpolado entre dos predios	1	-	Con calidad
	31 encontrado en Malla Vial Aproximada en 1 iteraciones	5	4	Con calidad
	31 encontrado en Malla Vial Aproximada en 2 iteraciones	-	4	Con calidad
	31 encontrado en Malla Vial Aproximada en 3 iteraciones	2	4	Con calidad
	31 encontrado en Malla Vial Aproximada en 4,5,6,7,8, 9 10 iteraciones	5	6	Sin calidad
IDECA	Asignada por Catastro	2	-	Con calidad
<b>TOTAL</b>		<b>54</b>	<b>80</b>	

Fuente: Propia con base en la base SIVIM 2020 – 2021

De acuerdo con los anteriores resultados se tiene que 49 y 74 registros en el año 2020 y 2021 respectivamente cumplen con los criterios de calidad para ser representados, con relación a los casos efectividad de los casos se tomaran para el estudio tanto los casos fallidos y efectivos.

A partir de estos datos se procede a representar los diferentes tipos de violencia intrafamiliar presentando en este periodo de tiempo, entre las representaciones se tendrá como unidad de análisis los cuadrantes en la localidad de Puente Aranda, en donde se ponderan los casos de violencia familiar por año y los porcentajes con los tipos de violencias, los casos positivos de Covid 19 en mayores de 60 años, clasificación de los tipos de violencia intrafamiliar, índice de pobreza multidimensional y su relación con los casos e índice de accesibilidad geográfica a las Unidades generadoras del datos (UPGD) en la localidad de Puente Aranda.

## 2.2. Objetivos específicos y variables

Tabla 2. Objetivos específicos y variables

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	SUBSISTEMAS O PROCESOS	VARIABLES	FUENTES DE INFORMACIÓN
Analizar las características sociodemográficas y geográficas de las víctimas de violencia intrafamiliar en el curso de vida vejez entre los años 2020 – 2021, ubicando sitios de interés que requieran intervención.	SIVIM SISVECOS Entorno comunitario Entorno Trabajo Entorno Hogar Análisis y políticas. Georreferenciación y análisis SDS	Localización espacial de las UPGD  Casos activos Covid 19 por cuadrantes en ciclo de vida vejez  Localización y distribución espacial de los casos de violencia  Casos activos Covid 19 por cuadrantes	SIVIM (base de datos cerrada 2020, base preliminar 2021)  SISVECOS (base de datos cerrada 2020, base preliminar 2021).  Base consolidada casos positivos Covid 19 2020 y 2021
Identificar los factores de riesgos individuales y sociales que conllevan a la violencia en personas mayor de 60 años de la localidad de Puente Aranda durante los años 2020 - 2021.	SIVIM SISVECOS Entorno comunitario Entorno Trabajo Entorno Hogar Análisis y políticas. Georreferenciación y análisis SDS	Distribución y comportamiento de casos por UPZ.	SIVIM (base de datos cerrada 2020, base preliminar 2021)  SISVECOS (base de datos cerrada 2020, base preliminar 2021)
Plantear recomendaciones de respuestas que incidan en la prevención de violencia intrafamiliar en personas mayores de 60 años en la localidad de Puente Aranda.	SIVIM SISVECOS Entorno comunitario Entorno Trabajo Entorno Hogar Análisis y políticas. Georreferenciación y análisis SDS	Distribución y comportamiento de casos por sexo y UPZ.	SIVIM (base de datos cerrada 2020, base preliminar 2021)  SISVECOS (base de datos cerrada 2020, base preliminar 2021)

Fuente: Subred Sur Occidente, 2022

## 2.3. Tamaño de la muestra

La muestra corresponde a 54 casos del año 2020 y 73 casos del 2021, registrados en la base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual (SIVIM) y 25 casos de 2020 y 24 casos de 2021 correspondientes a registros en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS) de la localidad de Puente Aranda que fueron notificados a SDS en el Sistema de vigilancia de eventos de interés en salud pública SIVIGILA por parte de las UPGDs a través de las fichas de notificación implementadas desde el Instituto Nacional de Salud.

## 2.4. Consideraciones éticas

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 mediante la cual se disponen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; se clasifica el presente estudio dentro de la categoría sin riesgo, al tratarse de una revisión documental de carácter retrospectivo. Sin ejercer ningún tipo de intervención o modificación de las variables biológicas, psicológicas o sociales, no se utilizarán información sensible de carácter individual de los casos registrados, su uso será exclusivo como parte de una muestra que permitirá caracterizar el comportamiento de una población (8)

## 3. Resultados

### 3.1. Análisis epidemiológico

Tabla 3. Tipos de violencia intrafamiliar en ciclo de vida vejez. Localidad de Puente Aranda

QUINQUE NIOS CURSO DE VIDA VEJEZ	2020												2021											
	EMOCIONAL		FISICA		SEXUAL		ECONOMICA		NEGLIGENCE		ABANDONO		EMOCIONAL		FISICA		SEXUAL		ECONOMICA		NEGLIGENCE		ABANDONO	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
de 60 a 64 años	2	6	1	5	-	-		1	1	-	-	-	2	12	1	7	-	1	-	4	1	4	-	3
de 65 a 69 años	1	1	1	1	-	-	1	1	1				6	10	4	3	-	1	-	2	1	4	-	5
de 70 a 74 años	4	10	1	5		1		1	2	4	2	1	3	6	1	2	-	-	2	1	-	2	-	
de 75 a 79 años	7	3	4	1	-	-	1	1	4	2	1	2	1	7	-	-	-	-	1	1	3	1	3	
mayores de 80 años	3	17	1	4	-	-	-	1	3	6	1	6	12	14	1	-	-	1	1	9	7	8	11	
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>22</b>

Fuente: Subred Sur Occidente. Base de datos SIVIM cerrada 2020 y preliminar 2021

En cuanto a las personas en curso de vida vejez que se tuvieron en cuenta para el boletín, se advierte que para el año 2020 el 68,5% de los casos (n= 37) son mujeres y en el año 2021, el 67,1% (n= 49) pertenecen al género femenino, tal como también se observa en la espacialización con relación al sexo en Figura 2.

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que las personas en el curso de vida vejez de la localidad de Puente Aranda, fueron expuestas a las diferentes formas de violencia.

En cuanto a las formas de violencia más frecuentes durante el año 2020 se encuentra en primer lugar la violencia emocional en donde, las 54 personas que conforman este grupo fueron víctimas de violencia emocional; siendo el 68,5 % (37 casos) mujeres, en segundo lugar, se encuentra la violencia física, en tercer lugar, la negligencia y en cuarto lugar el abandono, la violencia económica y la sexual presentaron el menor número de casos, ocupando el quinto y sexto lugar respectivamente. Así mismo, en el año 2021, con un mayor número de casos (n=73; sexo femenino 49 casos, sexo masculino 24 casos), también la violencia emocional ocupó el primer lugar, seguido del abandono, la negligencia y la violencia física que durante este año ocupó el cuarto lugar. Es importante resaltar que, en

todas las clases de violencia, las mujeres presentaron el mayor número de casos y que una sola persona se pudo ver expuesta a dos o más formas de violencia, tal como se observa en la Figura 3.

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 3, las formas de violencia que más afectan a los mayores de 80 años son: la violencia emocional, la negligencia y el abandono. De los 42 casos registrados en 2020, 20 casos corresponden a violencia emocional, 9 a negligencia y 6 casos a abandono, así mismo en 2021, de los 64 casos reportados, 26 casos fueron víctimas de violencia emocional, 16 de negligencia y 19 de abandono, tal como se observa en la Figura 3, en donde se observa que las violencias que más casos presenta son la emocional, la negligencia, abandono y física. Cabe resaltar que una persona sufrió de más de una forma de violencia, razón por la que no se puede porcentualizar los casos.



Figura 1. Nivel de aseguramiento de las personas en curso de vida vejez localidad de Puente Aranda en los años 2020 y 2021

Con relación a las personas mayores de 60 años de la localidad de Puente Aranda incluidas en esta revisión, en el año 2020, el 62,9% (n= 34) pertenecen al régimen contributivo, el 31,4% (n= 17) se encuentran en el régimen subsidiado y un 5,7% (n= 3 casos) mientras que en 2021 el 58,9% (n=43 casos) son de nivel contributivo, 38,4% (n=28) pertenecen al régimen subsidiado y 2,7 (n=2) a otros.

El nivel educativo tiene gran influencia sobre los casos de violencia intrafamiliar, inclusive en los adultos mayores, la tabla 4 refleja el grado de escolaridad de la población objeto de estudio.

Tabla 4. Nivel educativo personas curso de vida vejez en la localidad de Puente Aranda en los años 2020 y 2021

NIVEL EDUCATIVO	2020				2021			
	H	M	TOTAL	%	H	M	TOTAL	%
No Fue A La Escuela	1	2	3	5,56	1	2	3	4,11
Primaria	10	16	26	48,15	6	17	23	31,51
Secundaria Incompleta	1	8	9	16,67	2	8	10	13,70
Secundaria	3	4	7	12,96	6	14	20	27,40
Profesional	1	2	3	5,56	3	1	4	5,48
Universidad Incompleta		1	1	1,85			0	0,00
Técnico/Tecnólogo Incompleta			0	0,00		1	1	1,37
Técnico/Tecnólogo completo	0	3	3	5,56	1	3	4	5,48
+Postgrado	0	0	0	0,00	1		1	1,37
Sin Dato	1	1	2	3,70	4	3	7	9,59
<b>Total, General</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>54</b>	<b>100,0</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Subred Sur Occidente. Base de datos SIVIM cerrada 2020 y preliminar 2021

Se observa que, en los años 2020 y 2021, los adultos mayores tenían como nivel escolar mayoritariamente primaria con un 48,15% y 31,51%, no obstante, el segundo lugar en nivel educativo de esta población para 2021 lo ocupó la secundaria con 27,4% mientras que en 2020 fue secundaria incompleta. El nivel profesional solo fue logrado por el 5,56% de los casos en 2020 y 5,48% en 2021.

Tabla 5. Relación de las víctimas en curso de vida vejez con el agresor en la de localidad de Puente Aranda 2020 y 2021

RELACIÓN CON EL AGRESOR	VIOLENCIA EMOCIONAL		VIOLENCIA FÍSICA		NEGLIGENCIA		ABANDONO	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Conocido		5		1				3
Desconocido	1	2	1			1		1
16. Expareja	1		1			8		
5. Hermano(a)	2	6	2	3		4		1
6. Pareja	8	12	5	8	3		1	2
7. Hijo(a)	31	34	10	5	14		8	17
9. Otro familiar	11	13	5	2	6		4	8
Administrativo		1						1

Fuente: Subred Sur Occidente. Base de datos SIVIM cerrada 2020 y preliminar 2021

Al analizar la relación de la víctima con el agresor, según los datos presentados, se puede deducir que, en las violencias emocional, física, negligencia y abandono, son en primer lugar los hijos, en segundo lugar, la pareja y en tercer lugar otro familiar los principales agresores. El número de estos casos tiene un incremento significativo al compáralos con otros agresores referidos en la información. Con respecto al sexo del agresor se presenta que predomina el sexo masculino en un 66,6 % y 73,9 % en los dos años respectivamente.

Por otro lado, se tuvo en cuenta el comportamiento de la conducta suicida en el adulto mayor, de acuerdo con la información suministrada por el subsistema SISVECOS, ver tabla 6.

Tabla 6. Relación de las víctimas en curso de vida vejez con el agresor en la localidad de Puente Aranda en los años 2020 y 2021

CLASIFICACIÓN DE LA CONDUCTA	AÑO 2020				AÑO 2021			
	HOMBRE	MUJER	TOTAL	%	HOMBRE	MUJER	TOTAL	%
Amenaza suicida	1	1	2	8,0	1	1	2	8,3
Ideación suicida	8	8	16	64,0	7	9	16	66,7
Intento de Suicidio	3	2	5	20,0	2	3	5	20,8
Sin dato	1	-	1	4,0	-	1	1	4,2
Suicidio consumado	1	-	1	4,0	0	0	0	0,0
<b>Total, general</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Subred Sur Occidente. Base de datos SIVIM cerrada 2020 y preliminar 2021

Se observa para este evento los mayores de 60 años durante el año 2020 y 2021 presentaron en gran medida ideación suicida con 16 en 2020 y 2021 presentando más del 60% de los casos notificado durante estos años, seguido del intento de suicidio con 5 casos en ambos años, con un 20 % aproximadamente en ambos años. En lo concerniente a la amenaza suicida en menor proporción con dos casos en ambos años con el 8%. Se destaca el suicidio consumado con un solo caso en el año 2020, este caso se localiza en la UPZ43 de San Rafael, el adulto mayor tenía edad de 83 años.

### 3.2. Análisis espacial

Con relación a las violencias intrafamiliares en el ciclo vital vejez se presentaron más casos en el año 2021 con relación al 2020 con una diferencia de 19 casos. Es de destacar que en el 2020 la disminución de caso se puede relacionar con el inicio de la pandemia por COVID19, en donde se puede asociar a las restricciones que se implementaron para contrarrestar el contagio del virus en la población. Se observa que los cuadrantes 1329 - 1330, 1426 - 1471 y el 1401 en las UPZ San Rafael, Ciudad Montes y Muzú, respectivamente son que mayores casos presentan en el año 2020, el resto de los cuadrantes presentan casos muy homogéneos. En relación con el año 2021 se puede apreciar en los cuadrantes que mayores casos presentan de este tipo de violencia difieren a los cuadrantes del 2020 a excepción del 1329. Sin embargo, estos cuadrantes con mayores casos en 2021 están muy asociados por proximidad a los de mayores casos del 2020.




Figura 2. Violencia intrafamiliar en ciclo vital vejez en los años 2020 y 2021 en la localidad de Puente Aranda. Subred Sur Occidente 2022, Base de datos SIVIM cerrada 2020 y preliminar 2021.

En la cartografía se puede evidenciar como las violencias con relación al sexo masculino que se presentan en el año 2020 no existe un patrón definido, mientras que al sexo femenino tienden a presentarse de manera concentradas, es de resaltar los cuadrantes 1329, 1330 y 1238 en la UPZ de San Rafael, en donde se evidencia una asociación espacial de estos casos, al igual como sucede en las UPZ Ciudad Montes y Muzú, ver *Figura 2*. En relación con el año 2021 con el aumento de casos se evidencia claramente como se tienen a concentrarse este evento tanto en el sexo femenino y masculino, generando zonas de concentración definidas en este año.

Con relación a la estratificación socioeconómica se evidencia que el estrato que predomina es el tres en el 2020 y 2021, se observa en la figura 3 que en el año 2020, se presentaron nueve y ocho casos de estratificación tres en las UPZs de Ciudad Montes y San Rafael respectivamente, mientras que en las misma UPZ para el año 2021, se presentan 28 y 13 casos notificados respectivamente, siendo estas las modificaciones más notables en lo que

respecta a los estratos, con relación a los estratos unos y dos, se presentó un comportamiento muy parecido en la cantidad e igualdad de casos en los dos años en mención, es de destacar que en el año 2021, se presentó un caso con estratificación cuatro. Es de destacar que en la localidad de Puente Aranda el estrato socioeconómico tres es el predominante.




Figura 3 Tipos de violencia intrafamiliar en ciclo vital vejez y casos de Covid 19, en Puente Aranda en los años 2020 y 2021. Subred Sur Occidente 2022, Base de datos SIVIM cerrada 2020 y preliminar 2021.

En relación con los casos de COVID19 se puede evidenciar que existen mayor cantidad de casos en el año 2021 en relación al 2020, en este ultimo año se destaca el 1186 cuadrante con más casos en la UPZ111 de Puente Aranda con el rango más alto, este asociado al conglomerado de la Cárcel Modelo. Seguido de los cuadrantes 1328 y 1330 en la UPZ43 de San Rafael, en la UPZ 40 de Ciudad Montes las mayores cantidades de casos de presentaron en los cuadrantes 1379 y 1471 y en la UPZ Muzú, en el cuadrante 1467. Es de destacar que en este año los cuadrantes con mayores casos de violencia estuvieron en algunos de estos cuadrantes o próximos a estos. En 2021 los cuadrantes con mayor cantidad de casos estuvieron más generalizados, también se presentan la asociación en donde se presenta que los cuadrantes que mayor cantidad de casos de violencia en personas en ciclo vital de vejez también presenta mayor cantidad de casos de Covid 19.

#### **4. Conclusiones**

- De acuerdo con el análisis de los datos, se observa que durante los años 2020 y 2021 las mujeres estuvieron más expuestas que los hombres a los diferentes tipos de violencia: 68,5% y 67,1% respectivamente. Por lo que se puede deducir que la violencia de género continúa siendo un problema de Salud Pública en todos los cursos de vida incluyendo la vejez.
- Las personas en curso de vida vejez mayores de 80 años, fueron sometidas principalmente a actos violentos emocionales, negligencia y abandono de acuerdo con los datos registrados; De los 42 casos registrados en 2020, 20 casos corresponden a violencia emocional, 9 a negligencia y 6 casos a abandono, así mismo en 2021, de los 64 casos reportados, 26 casos fueron víctimas de violencia emocional, 16 de negligencia y 19 casos de abandono. Por lo que ser mayor de 80 años se convierte en un factor de riesgo para ser víctima de estas formas de violencia.
- Los principales agresores en los individuos en curso de vida vejez son los hijos, en segundo lugar, la pareja y en tercer lugar otro familiar de acuerdo con el número de casos relacionados durante los años 2020 y 2021.
- De las personas mayores de 60 años de la localidad de Puente Aranda incluidas en esta revisión, en el año 2020, el 62,9% (n= 34 casos) y el 58,9% (n=43 casos) del año 2021 pertenecen al régimen contributivo.
- En la localidad de Puente Aranda la violencia intrafamiliar en ciclo vital vejez está asociada al estrato socio económico dos y tres, con relación a este último presenta variaciones significativas entre los años 2020 y 2021, se destaca en el resto de las estratificaciones se mantuvo estable con relación a la proporción de casos en los años en mención.

#### **5. Recomendaciones de respuesta**

- Implementar estrategias desde los diferentes entornos y procesos para canalizar los casos de violencia en curso de vida vejez, garantizando la restitución de derechos en su condición de población vulnerable.
- Mediante campañas como caminantes por la vida, realizar búsqueda comunitaria de las personas mayores de 80 años, enfatizando sobre las condiciones de vida del individuo y de su cuidador; activando rutas de acuerdo con las necesidades percibidas.
- Socializar las diferentes redes de apoyo para víctimas, cuidadores, familiares y para la comunidad en general que permitan expresar los problemas, denunciar o solicitar ayuda en los diferentes ámbitos que permitan mejorar la convivencia.

- Vincular a las EAPB en el seguimiento integral (Psicología, medicina, trabajo social, nutrición etc) a los adultos mayores, asegurando el bienestar de esta población articulando entidades sectoriales e intersectoriales de ser necesario.
- Difundir piezas educativas relacionadas al buen trato de las personas en ciclo vital vejez, específicamente en los cuadrantes que presentan más de tres casos notificados, para su respectiva intervención.

## 6. Referencias bibliográficas

1. Organización Panamericana de la Salud. Salud Mental y COVID-19 - OPS/OMS | [Internet]. [cited 2022 Mar 4]. Available from: <https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19>
2. Organización Panamericana de la Salud. Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19 - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2020 [cited 2022 Mar 4]. Available from: <https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-psicosociales-salud-mental-durante-brote-covid-19>
3. Ministerio de salud y protección social. Envejecimiento y Vejez [Internet]. [cited 2022 Mar 4]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx>
4. Organización Mundial de la Salud. Maltrato de las personas mayores [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 4]. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse>
5. Yon Y, Mikton CR, Gassoumis ZD, Wilber KH. Elder abuse prevalence in community settings: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Glob Heal* [Internet]. 2017 Feb 1 [cited 2022 Mar 6];5(2):e147–56. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28104184/>
6. Chang ES, Levy BR. High Prevalence of Elder Abuse During the COVID-19 Pandemic: Risk and Resilience Factors. *Am J Geriatr Psychiatry* [Internet]. 2021 Nov 1 [cited 2022 Mar 4];29(11):1152–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33518464/>
7. Forero L, Hoyos S, Buitrago V, Heredia R. Maltrato a las personas mayores: una revisión narrativa Elder Abuse: A Narrative Review. 2019 [cited 2022 Mar 6]; Available from: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.umed60-4.malt>
8. Defensoría del Pueblo. Defensoría urge mayor atención en seguridad y salud mental para las personas mayores | Defensoría del Pueblo [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 22]. Available from: <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10468/Defensoría-urge-mayor-atención-en-seguridad-y-salud-mental-para-las-personas-mayores-personas-mayores-salud-mental.htm>
9. SaluData. Tasa de violencia intrafamiliar en Bogotá D.C. | SALUDATA [Internet]. [cited 2022 Mar 23]. Available from: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud-salud-mental/tasaviolenciaintrafamiliar/>

## **CAPITULO II**

### **RESUMEN**

El presente boletín epidemiológico consolida información relacionada con las diferentes acciones ejecutadas desde los tres ejes propuestos para la Vigilancia en Salud Pública de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente en el primer trimestre del año 2022

Dichas acciones orientan la mitigación, manejo y control de los diferentes eventos de interés en salud pública mediante un análisis descriptivo, retrospectivo y transversal del comportamiento de dichos eventos, incluyendo además variables como momentos de vida, sexo, afiliación en salud, grupos poblacionales, tipo y tendencia de los eventos. Para el presente periodo como resultado del análisis, se evidencia que los eventos inmunoprevenibles continúan siendo de gran relevancia en las cuatro localidades de la Subred Sur Occidente.

Así mismo, los eventos vigilados muestran un mayor número de casos en las localidades de Bosa y Kennedy, frente al género de las personas identificadas se observa una proporción equitativa en ambos géneros; con respecto a los eventos vigilados por el componente de salud mental podemos concluir que éstos son altamente prevenibles si se intervienen a tiempo, lo cual permite enfatizar que las acciones de detección temprana y protección específica, son determinantes en el proceso de intervenciones epidemiológicas de campo.

### **INTRODUCCIÓN**

La Subred Sur Occidente está conformada con las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda en donde los eventos objeto de la Vigilancia en Salud Pública se relacionan principalmente con determinantes estructurales y proximales de la salud. Dado lo anterior, el presente es un documento de análisis del comportamiento que tuvieron los eventos de interés en Salud Pública de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente en el primer trimestre del año 2022, reglamentado bajo el Decreto 3518 de 2006 a través del cual se requiere la provisión sistemática y oportuna de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud. El presente boletín tiene como fin aportar el análisis de la situación de salud para la toma de decisiones a nivel

local y distrital que impacte en los principales determinantes sociales ligados a los eventos de salud priorizados, acorde con el Plan de Desarrollo vigente y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

La Subred Sur Occidente está conformada por las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda en donde la Vigilancia Comunitaria en Salud Pública esta **orientada a la identificación, análisis y divulgación** de conocimiento asociado a eventos, factores de riesgo y determinantes sociales que pueden afectar la salud humana y calidad de vida de las personas en sus comunidades y entornos. Se logra a través de la participación social ciudadana organizada y/o no organizada y tiene como punto de partida la **identificación de problemas y/o necesidades relevantes para las personas en una comunidad**

## **METODOLOGIA**

El presente boletín es resultado un análisis descriptivo, retrospectivo, transversal de los eventos de interés en salud pública objeto de vigilancia, en población residente de las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda. Para realizar el análisis de la información de los eventos vigilados, se consideran variables como los momentos de curso de vida definidos en el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las RIAS (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), sexo, aseguramiento en salud, UPZ, grupos poblacionales, entre otras, de acuerdo a su disponibilidad, frecuencia, tendencia y pertinencia en el análisis de los eventos; mediante la utilización de frecuencias absolutas, frecuencias relativas y tasas de incidencia de eventos.

Las fuentes principales para la realización del documento fueron las bases de datos de los subsistemas de vigilancia epidemiológica, alimentadas por parte de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) y unidades informadoras y bases suministradas por Secretaría Distrital de Salud, además de la información generada por el equipo de gestión de la información de VSP. Para el análisis de los eventos a nivel general, se utilizaron los archivos planos de los datos ingresados a los sistemas de información, tableros de control, bases de datos preliminares.

Respecto al análisis del comportamiento de los eventos priorizados en salud pública, se tuvo en cuenta la notificación y la geo referenciación de los casos, así como análisis cualitativo a partir de determinantes sociales obtenidos por fuentes de información como bases oficiales entregadas por el ACCVSyE, nacidos vivos y defunciones RUAF, e investigaciones epidemiológicas de campo efectivas de los eventos objeto de vigilancia. Para el análisis de los indicadores de los diferentes eventos atendidos por el Equipo de Vigilancia en Salud Pública, se presentan tablas con frecuencias absolutas y relativas.

Finalmente, respecto al análisis de la información, se generan análisis comparativos de los años 2021 y 2022 de la gestión de los indicadores de calidad, cobertura y oportunidad en la Subred Sur Occidente y discriminado por localidades durante el periodo del primer trimestre del año 2022, mediante gráficas de tendencia.

El presente boletín es resultado un análisis descriptivo, retrospectivo, transversal de los eventos de interés en salud pública objeto de vigilancia comunitaria, en población residente de las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda.

Las fuentes principales para la realización del documento fueron las bases de datos del subsistema de la vigilancia comunitaria, alimentadas por parte de las problemáticas comunitarias notificadas, los hallazgos a nivel cualitativo y cuantitativo de los COVEOCM y las ISEC, y la semaforización de riesgos colectivos barriales.

## **RESULTADOS**

La Vigilancia en Salud Pública es el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública (1). Por tanto, conocer el comportamiento de los eventos de interés en salud pública es fundamental para orientar las acciones en pro del mejoramiento de las condiciones de la salud de los habitantes de la Subred Sur Occidente. A continuación, se hace una breve descripción de los resultados identificados en el periodo desde los diferentes subsistemas que componen el proceso de Vigilancia en Salud Pública.

Durante el periodo de enero a marzo de 2022 se identificó un total de 340 eventos notificados por lugar de residencia, un 5,29% menos con respecto al cuarto trimestre inmediatamente anterior, donde se reportó un total de 359 eventos. Las localidades de influencia que siempre han registran un mayor número de eventos de alto impacto intervenidos por el subsistema transmisibles de acuerdo con histórico corresponden a Kennedy y Bosa, los eventos de alto impacto notificados e intervenidos con mayor frecuencia durante este trimestre han sido EAPV, Síndrome de Rubéola Congénita, Tosferina y EAPV, con respecto a las IEC de control el evento que siempre se ha intervenido con mayor frecuencia es Tuberculosis seguido de los puntos de vacunación de EAPV.

Con relación a la ejecución de los bloqueos por parte del equipo, durante el trimestre se realizaron 135 bloqueos efectivos, es decir, un 22.2% más que el trimestre inmediatamente anterior, encontrando que la mayor cantidad de intervenciones se dieron en la localidad de Bosa en las UPZ 85 Bosa Central y 84 Bosa Occidental y en la localidad de Kennedy en la UUPZ 82 Patio Bonito. Frente a las unidades de

análisis por eventos transmisibles de enero a marzo, el componente transmisible realizó 25 unidades de análisis distritales, es decir, un 21.8% menos que trimestre anterior.

A continuación, se hace una breve descripción de los resultados identificados en el periodo desde la Vigilancia Comunitaria en Salud Pública.

En comparación con el trimestre pasado de octubre a diciembre de 2021, se notificaron 96 PCO, para este trimestre de enero a marzo 2022, un aumento significativo, se notificaron entre para este periodo 118 PCO, veintidós notificaciones más en comparación al pasado trimestre, este comportamiento se puede explicar porque desde el mes de febrero se dio un giro a la manera como se venían captando las problemáticas comunitarias, generando una mayor apertura de notificaciones a las unidades comunitarias y a los ciudadanos residentes.

A diferencia del trimestre pasado, donde el comportamiento de las localidades frente al reporte de las PCO fue similar, aportando todas un 25% (n=24) en cada una de ellas, para este periodo enero a marzo, las Localidades de Kennedy y Puente Aranda presentan un mayor número de casos en la notificación de PCO, aportando un peso del 26% (n=31), estos resultados permiten evidenciar que en estas se han generado nuevas caracterizaciones de UC, y que por otro lado se han reactivado UC que dentro de la base de censo permanecían allí inactivas.

## CAPITULO 1 SIVIGILA

Para el primer trimestre del año 2022 se notificaron un total de 166.126 eventos, de acuerdo al reporte mensual en enero se captaron 93.139 eventos, febrero 47.342 eventos y en marzo 25.644 eventos, lo cual demuestra un aumento progresivo en la captación de la notificación. Con respecto a la localidad que aporta mayor notificación es Puente Aranda 41.12%, seguido de Kennedy 37.09% en tercer lugar Fontibón con 20.02% y Bosa con 1.77%.




Figura 4. Número de eventos transmisibles captados, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo del 2022. SIVIGILA local, Base SIVIGILA Preliminar del 12/04/2022

Respecto a la situación de migración de los eventos de interés en salud pública reportados al Sistema SIVIGILA en el periodo de enero a marzo se evidencia que el 3.41% de la población corresponde a condición migrante, en correlación al 96.5% quienes refieren ser residentes de las localidades por periodo superior a 6 meses.

Tabla 7. Condición de residencia en casos captados por SIVIGILA Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022

CONDICIÓN DE RESIDENCIA	CANTIDAD
Migrante	5671

Fuente: Creado a partir de la base SIVIGILA local, Base SIVIGILA Preliminar del 12/04/2022

Con respecto a los eventos captados por ocurrencia se evidencia que los eventos inmunoprevenibles son aquellos que presentan el mayor porcentaje en la notificación con 118.775 casos en el año 2021 con relación al año 2022 donde se presentaron 98.147, seguido de los eventos zoonóticos 1.426 casos para el año 2021 a diferencia del año 2022 con 1.561 casos, en tercer lugar, se encuentran los

eventos de maternidad segura con 568 casos para el año 2021 y 777 para el año 2021 notificados al sistema de información SIVIGILA.

Tabla 8. Distribución y Comparación de eventos Notificados al Aplicativo SIVIGILA. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2021 -2022

<b>EVENTO</b>	<b>ENER O A MARZ O 2021</b>	<b>ENER O A MARZ O 2022</b>
Evento adverso seguido a la vacunación	59	18
Enfermedad Similar a Influenza Infección Respiratoria Aguda Grave (Vigilancia centinela)	11	170
IRA Virus Nuevo (2020)	118392	97445
Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)	2	1
Meningitis	5	8
Parálisis Flácida Aguda (Menores de 15 años)	0	1
Parotiditis	76	68
Rubéola	5	1
Síndrome rubéola congénita	41	26
Sarampión	11	36
Síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a sars-cov2	0	1
Tos ferina	13	11
Varicela Individual	160	361
<b>TOTAL, EVENTOS INMUNOPREVENIBLES</b>	<b>118775</b>	<b>98147</b>
Lepra	1	1
Tuberculosis (todas las formas / farmacoresistente) (2018)	58	60
<b>TOTAL, MYCOBACTERIAS</b>	<b>59</b>	<b>61</b>
Hepatitis B, C y coinfección B-D	40	41
Sífilis congénita	9	12
Sífilis gestacional	75	72
VIH / SIDA / Mortalidad por SIDA	235	317
<b>TOTAL, INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL</b>	<b>359</b>	<b>442</b>
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	1417	1556
Leptospirosis	9	5
<b>TOTAL, EVENTOS ZOÓNOTICOS</b>	<b>1426</b>	<b>1561</b>
Hepatitis A	1	4
Intoxicaciones por sustancias químicas	157	187
<b>TOTAL, EVENTOS DE RIESGO AMBIENTAL</b>	<b>158</b>	<b>191</b>
Cáncer en menores de 18 años	5	5
Cáncer de la mama y cuello uterino	182	274
Defectos congénitos	72	65
Exposición a flúor	109	0
Enfermedades huérfanas-raras	152	48

Intento de Suicidio	6	1
Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal)	1	0
Lesiones de causa externa	1	5
Vigilancia en salud pública de las violencias de género	29	33
<b>TOTAL, EVENTOS ENF. CRÓNICAS NO TRASMISIBLES</b>	<b>557</b>	<b>431</b>
Bajo peso al nacer	100	89
Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años	230	484
Morbilidad materna extrema	198	163
Mortalidad Materna Datos Básicos (2018)	4	5
Mortalidad Perinatal y neonatal tardía	34	33
Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por IRA, EDA y/o Desnutrición	2	3
<b>TOTAL, EVENTOS DE MATERNIDAD SEGURA</b>	<b>568</b>	<b>777</b>
Chagas crónico	2	1
Dengue	27	25
Leishmaniasis Cutánea	46	12
Leishmaniasis Mucosa	1	1
Malaria	12	5
Zika	1	3
<b>TOTAL, EVENTOS ENF. TRASMITIDAS POR VECTORES</b>	<b>89</b>	<b>47</b>
Infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico (2018)	10	4
Infección asociada a dispositivos (IAD) en UCI	111	14
<b>TOTAL, VIGILANCIA DE EVENTOS ASOCIADOS AL CUIDADO DE LA SALUD</b>	<b>121</b>	<b>18</b>
<b>TOTAL, GENERAL DE EVENTOS</b>	<b>122112</b>	<b>101675</b>

Fuente: Creado a partir de la base SIVIGILA local, Base SIVIGILA Preliminar del 12/04/2022

Respecto al aseguramiento al cual pertenecen los casos notificados al SIVIGILA podemos evidenciar que el 88.33% de la población se encuentra afiliada a régimen contributivo, 4.24% al régimen subsidiado, 3.94% régimen no asegurado.

Tabla 9. Distribución de eventos captados según régimen de afiliación a salud. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022

<b>ASEGURAMIENTO</b>	<b>TOTAL</b>
CONTRIBUTIVO	146736
SUBSIDIADO	7049
NO ASEGURADO	6546
PARTICULAR	4866
INDETERMINADO	925
EXEPCIONAL	3
<b>TOTAL</b>	<b>166125</b>

Fuente: Creado a partir de la base VIGILA local, Base SIVIGILA Preliminar del 12/04/2022

## **CAPITULO 2: VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LOS EVENTOS TRANSMISIBLES**

### **1. Sistemas de información para el subsistema transmisibles**

La base de quimioprofilaxis, que da cuenta del número de contactos que requirieron la entrega de medicamento, ya fuera Azitromicina o Rifampicina, refleja el aumento progresivo en cuanto a la notificación de eventos de Tos Ferina y de Meningitis desde el inicio de la pandemia; en este sentido, durante los meses en mención, se han intervenido 47 casos con un total de 152 contactos, de los cuales se realizó entrega de 318 tabletas de Azitromicina, 29 frascos de suspensión y 40 tabletas de rifampicina.

Por otra parte, durante el trimestre se identificaron 58 contactos a través de la realización de 42 IEC en la localidad de Kennedy, 55 contactos al realizar 35 IEC en la localidad de Bosa, 20 contactos al realizar 13 IEC en la localidad de Fontibón y al realizar 9 IEC en la localidad de Puente Aranda 13 contactos para el evento de Tuberculosis que se registraron en el libro y de los cuales, el 85% requirió canalización a los servicios de salud por ser población de riesgo.

### **2. Articulación con otros procesos del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)**

Entre los diferentes procesos con los que se articula el componente transmisible, se encuentra el específico con el programa de Tuberculosis de GPAISP, con el cual, se identifica una concordancia entre las fuentes de información en cuanto a notificación e ingreso en el programa de tuberculosis del 100% para las cuatro localidades.

La articulación con SIVIGILA, para el trimestre en mención permitió gestionar el cierre de los eventos rutinarios, de la base de datos para el 2021 en un 96,2%, y para el 2022 en un 78%, quedando principalmente pendiente lo relacionado a los eventos 345, 720 y 730, siendo casos sin muestra, eventos pendientes de sueros pareados y eventos de 2022 pendientes por resultado en base que aún están dentro de las 4 semanas.

Como contribución al proceso de unidades de análisis de mortalidad, se ha realizado de forma permanente y mensual articulación con Estadísticas Vitales y Gobernanza; por otra parte, para la socialización entre otros aspectos de los bloqueos, Búsquedas Activas Comunitarias (BAC) realizadas, las sospechas de los eventos adversos posterior a la vacunación (EAPV) notificadas e indicadores, se ha realizado mensualmente proceso de articulación con la líder del PAI.

Como otras articulaciones se encuentran las relacionadas con el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de GPAISP, con el componente de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), en la cual, no solo se revisa la concordancia entre las fuentes de información, junto con revisión de casos ingreso de los eventos, sino en la búsqueda de usuarios de Capital Salud que no hayan asistido a consultas de valoración integral para su canalización oportuna.

### **3. Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC)**

El subsistema transmisible en comparación con el I trimestre del año anterior, refleja un aumento del 10.2%, en los eventos de interés en salud pública residentes en las localidades de influenza, pues de 305 casos residentes pasó a 340 casos reportados; viéndose principalmente alterada la notificación de los eventos de Tuberculosis con el 28,5% (n=97), Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) con el 12,9% (n=44), Tosferina con el 11,1% (n=38), y EAPV por vacuna COVID 19 con el 9,4% (n=32).

Las localidades de influenza que registran un mayor número de eventos de alto impacto intervenidos por el subsistema transmisibles, de acuerdo con el histórico corresponden a Kennedy con el 40,8% (n=139) y Bosa con el 53,1% (n=107) continuando con Fontibón con el 14,11% (n=48) y Puente Aranda con el 13,2% (n=45), dato directamente relacionado al total de la población habitante en dichas localidades.




Figura 5. Número de eventos transmisibles alto impacto notificados por localidad de residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022




Figura 6. Número de eventos transmisibles control notificados por localidad de residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022

### 3.1. Mortalidad por infección respiratoria aguda – IRA

Con relación a la mortalidad por IRA en menor de 5 años, las UPGD de la Subred Sur Occidente notificaron al SIVIGILA 3 casos de los cuales el 100% corresponden a mortalidades menores de 1 año; el 66,6% de la localidad de Kennedy y el 33,3% de la localidad de Bosa, evidenciando un aumento del 66,6% en la notificación en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Tabla 10. Distribución de casos de mortalidad por IRA en menor de 5 años por localidad de ocurrencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.

EDAD	KENNEDY		BOSA		FONTIBÓN		PUENTE ARANDA	
	F	M	F	M	F	M	F	M
Menor de un año	1	1	1	0	0	0	0	0
Mayor de un año	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Creado a partir de la base SIVIGILA Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022

### 3.2. Tuberculosis / VIH

Durante el trimestre de enero a marzo de 2022 se notificaron en total 62 casos de Tuberculosis, de los cuales 3 casos correspondieron a mortalidades, siendo residentes un 66,6% en Bosa y 33,3% en suba; del total de casos notificados al SIVIGILA, el mayor número corresponde a hombres con un 75,8% (n=47) y un 24,1% (n=15) fueron mujeres; por otra parte, el 24% (n=15) presentaron coinfección TB-VIH.




Figura 7. Distribución casos tuberculosis por residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022

En el anterior mapa se refleja la incidencia de los 97 casos de tuberculosis que se presentaron en las 4 localidades de la Subred Sur Occidente, evidenciando la mayor cantidad de casos en las UPZ Bosa central, Bosa Occidental, Timiza, Castilla y Fontibón centro.

#### 4. Contención de eventos mediante bloqueos

Teniendo en cuenta que, como actividad complementaria a las IEC, se deben realizar bloqueos y barridos que permitan contener los eventos transmisibles, a través de la búsqueda activa de contactos comunitarios y sociales, la verificación de carné de vacunación y la aplicación de vacunas hasta lograr coberturas útiles; durante el trimestre se realizaron 135 bloqueos efectivos, es decir, un 47% más que el trimestre del año inmediatamente anterior.

Durante el desarrollo de los bloqueos en los meses de enero a marzo, fue posible identificar 99.032 personas de los diferentes grupos etarios, 32.7% en la localidad

de Bosa (n=32.387), 44.7% en la de Kennedy (n=44.284), 9.9% en la localidad de Fontibón (n=9.871) y 12.6% en la localidad de Puente Aranda (n=12.490); Los bloqueos se concentraron durante el cuarto trimestre en tres eventos principalmente, Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) en un 32.5% (n=44), seguido de tos ferina con un 28.1% (n=38) y Sarampión con un 27.4% (n=37) grafico 2.

Si bien, entre las dificultades encontradas durante el desarrollo de las actividades, se encuentran comunidades donde se evidencia la necesidad de llamar a la policía, tener su acompañamiento y verificación con el equipo, dado que esto ha limitado que el equipo sea víctima de robos o lesiones personales.




Figura 8. Bloqueos realizados por el componente transmisibles por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022

Mediante los bloqueos realizados se logró identificar población menor de 5 años sin esquema de vacunación completo, la cual fue remitida a PAI para completar las dosis; por otra parte, se contribuyó en las estrategias para mantener la eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubeola Congénita (SRC) en Colombia dadas las dosis adicionales de SR que se emplearon en los bloqueos de estos eventos, encontrando que la mayor cantidad de intervenciones se dieron en la localidad de Bosa en las UPZ 85 Bosa Central y 84 Bosa Occidental y en la localidad de Kennedy en la UUPZ 82 Patio Bonito.




Figura 9. Distribución de bloqueos por residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022

### Unidades de análisis por eventos transmisibles

Tabla 11. Número de unidades de análisis por eventos transmisibles por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.

UNIDAD DE ANÁLISIS / LOCALIDAD	BOSA	KENNEDY	FONTIBÓN	PUENTE ARANDA	TOTAL
Mortalidad por IRA en < 5 años	2	0	0	1	3
Mortalidad IRAG inusitado	0	0	0	0	0
Mortalidad por COVID- 19	0	0	0	0	0
Mortalidad por EPV	0	0	0	0	0
Mortalidad por Micobacterias	0	0	0	0	0
ETV	0	1	0	2	3
EAPV	3	9	2	5	19
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>25</b>

Fuente: Creado a partir de la base, Informe de Gestión - Subred Sur Occidente – enero a marzo 2022

Durante el trimestre, el componente transmisible realizó 25 unidades de análisis, es decir, un 21.8% menos que ultimo trimestre del año anterior. Los usuarios objetos

de estas unidades de análisis se concentraron en la localidad de Kennedy con un 40%.

Entre las principales demoras identificadas, persisten las relacionadas con la calidad de la atención, dadas por la no valoración integral para la identificación del riesgo, no se desarrollan acciones específicas o intervenciones de acuerdo con la caracterización poblacional y no se cumplieron con las acciones definidas en el protocolo de vigilancia del evento.

### **CAPITULO 3: COVID 19**

En el mes de enero del año 2020, en China se identificó un nuevo virus de la familia del Coronavirus el cual se identificó como SARS-CoV-2. El cual inicio causando síntomas respiratorios, la cual se puede transmitir por gotas, contacto directo, aerosoles y fómites, dada la situación la Organización Mundial de la Salud emite las recomendaciones para evitar cadenas de transmisión.

Durante el transcurso del tiempo se ha identificado que la presentación clínica ha variado, se puede presentar desde personas asintomáticas, síntomas leves o moderados, hasta cuadros graves que pueden tener un desenlace fatal.

Para dichos eventos se realizan diferentes estrategias para mitigar el proceso de la enfermedad, teniendo en cuenta la alta transmisión de la misma. El país genera la estrategia PRASS -Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible de acuerdo con el decreto 1374 de octubre 2020.

A nivel mundial se presentaron 488.811.337 casos positivos acumulados, de los cuales se presenta una letalidad de 1,3% (n=6.168.174), corte a 31 de marzo 2022, se identificaron 12% (n=58.722.307) casos activos y 86,7% (n=423.920.856) casos recuperados.

Para nuestro país se han presentado 6.084.916 con una letalidad 2,29% (n=139.62), fallecieron por otras causas 0,38% (n=23.162), se presentan a corte del 31 marzo 2022 un 97,26% (n=5.917.909) casos recuperado y un 0,07% (n=4.224) casos activos.

En la ciudad de Bogotá se han presentado un total de 1.766.029 casos positivos de COVID 19 Con una letalidad de 1,71% (=29.452).

La Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur Occidente E.S.E de acuerdo a la base de positivos, realiza un ejercicio permanente de georreferenciación de casos confirmados por COVID-19 en cada una de las localidades que la conforman, como insumo para la intervención de salud pública con enfoque territorial.

De estos casos se identifican 509.019 casos positivos según residencia, al igual que los casos notificados, la mayoría se encuentra en la localidad de Kennedy, seguida

por la localidad de Bosa. Se evidencia que el cuarto pico epidemiológico se presenta durante el primer trimestre 2022.



Figura 10. Casos positivos COVID-19, casos diarios por localidad de residencia, SISSO marzo de 2020 a 29 de diciembre de 2021-por fecha de diagnóstico. Base COVID-19, diciembre 2021

La mayor concentración de los casos se encuentra en la localidad de Kennedy con el 43,2% (n= 648.328) ocupando el segundo lugar en el distrito con un aporte del 12,7% de casos a la ciudad, seguida de la localidad de Bosa con el 24,9% (n=373.534) con un aporte del 7,2% de los casos confirmados en el distrito.




Figura 11. Comportamiento COVID Subred Sur Occidente Enero a marzo del 2022. Base de Positivos Secretaria de Salud Corte marzo 31 2022.

Por otra parte, del total de los casos presentados el 54% son mujeres y el 46% en hombres, así mismo la mayor concentración de los casos de acuerdo al curso de

vida se encuentra en la adultez entre los 29 y 59 años con un peso porcentual del 53,8%.




Figura 12. Comportamiento COVID 19 Curso de Vida y Sexo Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022. Base de Positivos Secretaria de Salud Corte marzo 31 2022

De acuerdo al comportamiento de los indicadores de casos positivos por residencia, la Subred presenta los 2,7 casos activos por cada 100.000 habitantes, recuperados 497.501 personas (97,7%) y han fallecidos 8824 (1,7%), siendo la localidad de Kennedy la de mayor número de casos presentados durante el primer trimestre evaluado.

Tabla 12. Indicadores Casos Positivos COVID 19 por Residencia Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022

LOCALIDAD	POSITIVOS ACTIVOS	TASA ACTIVOS (X 100MIL HAB.)	RECUPERADOS COVID	% RECUPERACIÓN	MUERTES COVID	% LETALIDAD	TASA MORTALIDAD (X 100MIL HAB)
Bosa	14	1,8	123.337	97,8	2.111	1,7	264,0
Kennedy	17	1,3	214.538	97,6	3.924	1,8	308,2
Fontibón	10	2,2	90.565	98,0	1.406	1,5	316,0
Puente Aranda	4	1,9	69.061	97,4	1.383	2,0	653,0
<b>TOTAL, SUBRED</b>	<b>45</b>	<b>1,6</b>	<b>497.501</b>	<b>97,7</b>	<b>8.824</b>	<b>1,7</b>	<b>323,2</b>

Fuente: Creado a partir de la base de Positivos Secretaria de Salud Corte marzo 31 2022

Con relación al comportamiento de casos activos de acuerdo a la distribución por UPZ, la mayor parte de los casos se concentran en Bosa Occidental, seguido de la UPZ Patio Bonito y Timiza de la localidad de Kennedy, Fontibón UPZ Salitre Occidental y Puente Aranda UPZ Ciudad Montes y San Rafael.




Figura 13. Distribución de comportamiento de casos activos de COVID 19 según UPZ de la Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022. Base de Positivos Secretaria de Salud Corte marzo 31 2022

El comportamiento de casos fallecidos de acuerdo a la distribución por UPZ, la mayor parte de los casos se concentran en Bosa UPZ Bosa Central y Bosa occidental, Kennedy UPZ seguido de la UPZ Patio Bonito, Castilla, Kennedy Central y Carvajal, Fontibón UPZ Fontibón UPZ Ciudad Montes.




Figura 14. Distribución de comportamiento de casos fallecidos de COVID 19 según UPZ de la Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022. Base COVID-19, marzo 2022

Durante el primer trimestre del 2022 en promedio casos al mes se presentó un incremento del 77% en relación con el 2021 del 53% y el comportamiento presentado de casos diarios en el 2022 fue del 76% pasando al 52% durante el 2021.




Figura 15. Distribución COVID 19 Casos Presentados Diarios vs Positivos Sur Occidente Enero a marzo 2021 vs 2022. Base COVID-19, marzo 2022

En cuanto a los casos presentados por ubicación en la Subred de enero a marzo del 2022 el 0,9% se encuentran en casa (n=13.794), el 0,01% en hospitalización general y el 0,02% en Unidades de Cuidado Intensivo-UCI.

Tabla 13. Distribución Casos Positivos COVID 19 por Ubicación Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022.

<b> AISLAMIENTO DOMICILIARIO </b>	<b> 13.794 </b>	<b> 0,9 </b>
Hospitalización	123	0,01
UCI	35	0,00
Fallecidos	29.738	2,0
Fallecidos otras causas	6.931	0,5
Recuperados	1.450.794	96,6

Fuente: Creado a partir de la base COVID-19, marzo 2022

Durante el periodo a estudio se realizaron 15473 Intervenciones Epidemiológicas de campo según residencia en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente siendo la localidad de Kennedy la que presenta mayor promedio con relación con las otras localidades.




Figura 16. Intervenciones epidemiológicas de campo de COVID-19 por mes, Subred Sur Occidente, enero a marzo 2022. Base IEC COVID-19, marzo 2022

Por otro lado, se realizaron 40039 seguimientos según residencia en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente siendo la localidad de Kennedy y el mes de febrero donde más se realizaron.




Figura 17. Seguimientos de COVID-19 por mes, Subred Sur Occidente, enero a marzo 2022. Base de seguimientos COVID-19, marzo 2022

Por último, el comportamiento presentado de EAPV corte a Semana Epidemiológica 12, se evidencia un total de 6 notificaciones con relación al evento 298, atribuibles a vacunas COVID-19 ingresadas al aplicativo de SIVIGILA como casos sospechosos, de los casos en relación a la ubicación el 33% corresponde a interlocales y el 67% adicional corresponde a la localidad de Kennedy de la Subred.




Figura 18. Distribución EAPV presentados según notificación en SIVIGILA en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Enero a marzo 2022. Base EAPV COVID-19, marzo 2022

Así mismo se evidencia que, de los 6 eventos relacionados anteriormente, a corte semana 12 se encuentran clasificados 6 eventos por Unidad de análisis como eventos graves relacionándose por curso de vida, así:




Figura 19. Distribución EAPV Clasificación grave según notificación en SIVIGILA en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Enero a marzo 2022. Base EAPV COVID-19, marzo 2022

En el cual se logró identificar incidencia con implicación por biológicos así: Moderna 17%, Sinovac 17%, Johnson & Johnson 17%, AstraZeneca 17% y Pfizer 33%.

Cabe mencionar que, para la vigencia correspondiente al primer trimestre del 2022, se evidencia 01 evento leve reportado por base de información VIGIFLOW relacionado con el biológico AstraZeneca, el cual ingresa dentro de los efectos esperados por la vacunación.

## **CAPITULO 4: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS**

Las urgencias y emergencias en salud pública se refieren a todo evento extraordinario con aparición en forma súbita y/o con potencialidad de generar, un aumento de la morbi- mortalidad de la población o afectación inusitada de la salud pública. Por su naturaleza las Urgencias (incluidos brotes) y Emergencias en Salud Pública no son posible predecir ni los eventos presentados, ni la magnitud de los mismos, por lo que se hace necesario, la creación, mantenimiento y fortalecimiento de los equipos ERI (Equipos de Respuesta Inmediata), en sus dos componentes, prevención y atención oportuna de las urgencias (brotes) y Emergencias con impacto en la Salud Pública. El ERI realiza coordinación, articulación y administración de la respuesta inicial a los incidentes de esta naturaleza que ocurren en el Distrito Capital.

Su actuar se enmarca principalmente en poblaciones cautivas o vulnerables (cárceles, batallones, guarniciones militares, centros de protección y atención integral de niños y adolescentes, centros de atención de personas mayores, conventos, resguardos indígenas). Este Capítulo Incluye todos los eventos atendidos en Salud Pública durante el primer trimestre de 2022 en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Bosa y Fontibón relacionados a Brotes de COVID19, Enfermedades Respiratorias Agudas, Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Intoxicaciones por sustancias químicas, Varicela y emergencias en salud pública, donde se evidencia las frecuencias absolutas y relativas por cada uno de los eventos presentados discriminados por localidad y Subred Sur Occidente, los cuales arroja resultados que permiten conocer el impacto en Salud Pública de las acciones realizadas por el equipo ERI, en cuanto a la reducción y mitigación del riesgo, en cada uno de los cursos de vida afectados, haciendo énfasis en el análisis desde el punto de vista epidemiológico, de la situación presentada y los aspectos claves a evaluar para la respuesta.

### **5. Equipo de Respuesta Inmediata**

Durante el primer trimestre de 2022 el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de las Subred Sur Occidente atendió 206 eventos de los cuales 135 corresponden a brotes de COVID 19, 27 Enfermedad Respiratoria Aguda, 15 búsquedas activas, 8 intoxicaciones, 7 eventos de varicela, 5 búsquedas para Sarampión, 4 Enfermedades Diarreicas Agudas y una Enfermedad Transmitida por Alimentos.

Dentro de los eventos atendidos se observa mayor frecuencia en la localidad de Kennedy con un 31,1% (n=64), lo cual se explica por qué en esta localidad se encuentra población con escasos recursos, población flotante, actividad comercial y migrantes venezolanos. Seguido de la localidad de Bosa con un 26,7% (n=55), Puente Aranda con el 21.8% (n= 45), siendo Fontibón la localidad con menos eventos con un 20,4% (n=42)

De acuerdo a los eventos atendidos, el 65,5% corresponden a COVID19, los brotes de este evento por UPZ con mayor número de caso en la localidad de Bosa corresponde la UPZ Bosa Central con 15 brotes, las UPZ que presentaron de 6 a 8 brotes en las cuatro localidades son el porvenir, bosa occidental, en la localidad de Puente Aranda, San Rafael, Ciudad Montes, Muzu y Zona Industrial, para la localidad de Kennedy las UPZ Patio Bonito y Calandaima, en la localidad de Fontibón las UPZ Fontibón y Modelia.




Figura 20. Distribución de brotes de COVID19 por UPZ y ciclo de vida atendidos por ERI. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero- marzo 2022. Base UYE, Subred Sur Occidente, enero marzo 2022

En cuanto a los eventos atendidos por semana epidemiológica se evidencia que para la semana 2 se abordaron 28 brotes, debido que para esta semana se intervienen 25 brotes de COVID19, 1 Enfermedad respiratoria Aguda, 1 varicela y se realizó 1 búsquedas activas.

Tabla 14. Eventos atendidos por semana epidemiológica. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero- marzo 2022

EVENTOS	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL, GENERAL
Búsqueda activa		1	1			3	1	2		1	1	1		1	1	13
COVID-19	1	5	25	24	25	21	17	7	8	5						138
EDA   enf. Diarreica aguda							1	1	1	1						4
ERA   enf. Respiratoria aguda			1					3	4	2	4	4	5	5		28
ETA   enf. Transmit. Alimentos		1														1
Intoxicación						1				3	2	1	1			8
Síndrome de boca   manos   pies											1	2		1		4
Varicela			1	1		2					1	2				7
Sarampión - rubéola								1	2							3
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>206</b>

Fuente: Creado a partir de la base UYE, Subred Sur Occidente, enero marzo 2022

En cuanto a los eventos atendidos por tipo de establecimiento para COVID19 los brotes familiares representan el 44,7% (n=92), los centros educativos aportaron el 9,2% con 19 brotes intervenidos, seguido de los centros carcelarios con el 2,4%, siendo el mismo porcentaje en los hogares geriátricos. Para el evento de Enfermedad Respiratoria Aguda los centros educativos aportan el 11,7% con 24 brotes intervenidos siendo los jardines infantiles las instituciones que mayor número de casos aportan para este evento.

Tabla 15. Eventos atendidos por tipo de establecimiento. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero - marzo 2022

EVENTO	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE BROTES	%
COVID 19	Familiar	92	44,7
	Empresa	5	2,4
	centro educativo	19	9,2
	fabrica/industria	1	0,5
	hogar geriátrico	5	2,4
	Albergue	3	1,5
	Institucional	3	1,5
	Establecimiento De Comercio	4	1,9
	centro carcelario	5	2,4
Varicela	estación de policía	1	0,5
	Familiar	3	1,5
	centro educativo	2	1,0
	centro carcelario	1	0,5
ERA	centro protección infantil	1	0,5
	centro educativo	24	11,7
	Institucional	1	0,5
	Empresa	1	0,5
	centro de protección infantil	1	0,5

	centro carcelario	1	0,5
EDA	centro educativo	4	1,9
ETA	estación de policía	1	0,5
Intoxicación	Empresa	4	1,9
	centro educativo	3	1,5
	Familiar	1	0,5
Otros eventos		20	9,7
<b>TOTAL</b>		<b>206</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de la base UYE, Subred Sur Occidente, enero marzo 2022

## 6. Proyecto de mantenimiento seguimiento y fortalecimiento a la estrategia de vigilancia epidemiológica en puntos de entrada, terminales portuarios

El proyecto de mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia de Vigilancia Epidemiológica en puntos de entrada Terminales Portuarios, realizo acciones encaminadas a la búsqueda e identificación de viajeros que presentaron síntomas relacionados con algún evento de salud pública de importancia internacional y Nacional, dando comunicación del riesgo, sensibilizando a los viajeros fomentando el autocuidado y el adecuado uso de las medidas de protección y realizando tamización aleatoria a viajeros y comunidad portuaria de pruebas PCR para identificación del COVID 19 principalmente los que ingresan al país provenientes de zonas de riesgo.




Figura 21. Sintomáticos respiratorios identificados en Terminales Portuarios Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero – marzo 2022. Base Sintomáticos respiratorios. Vigilancia Puntos de Entrada. Subred Sur Occidente, VSP, enero-marzo 2022

Entre enero y marzo del 2022 en los puntos portuarios ( aeropuerto y terminales terrestres) identificaron 20 viajeros con síntomas respiratorios compatibles con COVID-19, se han confirmado 8 casos con una positividad de 40%, los casos corresponden principalmente a viajeros con antecedente de vuelos internacionales, los cuales se toman medidas de control inmediato como: toma de muestra para confirmación del evento, cerco epidemiológico a los contactos estrechos de vuelo, seguimiento a sintomatología según metodología PRASS.

6.1. Muestreo aleatorio

Se ha continuado realizando tamizajes aleatorios en los tres puntos: Aeropuerto el Dorado, terminal terrestre Salitre y Satélite Sur como estrategia de fortalecimiento a la vigilancia epidemiológica portuaria, debido a la alta movilización de viajeros y comunidad portuaria.




Figura 22. Positividad en muestreo aleatorio Terminales Portuarios Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero – marzo 2022. Bases muestreo aleatorio. Vigilancia Puntos de Entrada. Subred Sur Occidente, VSP, enero-marzo 2022.

Para el primer trimestre del 2022 se realiza un total de 385 muestras con mayor carga de positividad en el mes de enero, relacionado principalmente por la introducción de la variante OMICRON, en viajeros con ingresos internacionales y funcionarios de la comunidad portuaria que no han manifestado síntomas para COVID 19.

6.2. Comunicación del riesgo

La comunicación del riesgo en los tres puntos de entrada se sensibilizó sobre en signos y síntomas de alarma para COVID, aislamiento preventivo, lavado e higienización de manos, elementos de protección personal, distanciamiento social

y recomendaciones a viajeros con procedencia a zonas de alta circulación de vectores transmisores de fiebre amarilla y Dengue.

Tabla 16. Comunicación del Riesgo en Terminales Portuarias Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero – marzo 2022.

MESES	AEROPUERTO	TERMINAL SALITRE	TERMINAL SUR
Enero	436342	456.526	45.689
Febrero	366642	275.336	5.089
Marzo	423434	359.619	2.483
<b>TOTAL</b>	<b>1.226.418</b>	<b>1.091.481</b>	<b>53.261</b>

Fuente: Creado a partir de la base Comunicación del Riesgo. Vigilancia Puntos de Entrada. Subred Sur Occidente, VSP, enero-marzo 2022.

### 6.2.1. Indicador del proceso

Para el primer trimestre 2022 a través de la Subred Sur Occidente en los puntos de entrada de los terminales portuarios se realizó búsqueda activa de 20 viajeros sintomáticos, con un acumulado julio 2020 a marzo 2022 de 226 casos confirmados de ESPII (COVID 19).

## CAPITULO 5: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LOS EVENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

### 7. Vigilancia en Salud Pública de los eventos asociados a la ocupación SIVISTRA

Tabla 17. Distribución de eventos por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.

EVENTOS		FONTIBÓN	BOSA	PUENTE ARANDA	KENNEDY	TOTAL	%
Enfermedad	Muy Probable	46	48	18	35	147	100%
	<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>147</b>	<b>100%</b>
Accidente	Muy Probable	19	13	5	23	60	100%
	<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Fuente: Creado a partir de la base de Datos SIVISTRA I trimestre 2022 Secretaria Distrital de Salud.

En el primer trimestre del año 2022, el subsistema de vigilancia epidemiológico SIVISTRA, caracteriza a un total de 270 trabajadores del sector informal; de estos trabajadores el 54% (n=147) ingresan al subsistema por evento de probable enfermedad, el 22% (n=60) ingresan por evento sospecha de accidente y el 63% (=23) ingresan solo por caracterización de condición de Riesgo Químico sin presencia de evento asociado, esta última es una vigilancia que se viene realizando por parte del Subsistema desde la vigencia anterior y que permite considerar el nivel de Riesgo en las Unidades de Trabajo Informal (UTI) y que podría significar la generación de una alteración a futuro asociado a la exposición.

Tabla 18. Distribución de condiciones de riesgo por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022

NIVEL DE RIESGO		FONTIBÓN	BOSA	PUENTE ARANDA	KENNEDY	TOTAL	%
Químico	N. Riesgo Crítico	0	2	0	1	3	4,5
	N. Riesgo Alto	9	5	5	16	35	53,0
	N. Riesgo Medio	1	7	12	0	20	30,3
	N. Riesgo Bajo	2	0	6	0	8	12,1
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>
Biomecánico	N. Riesgo Muy alto (Crítico)	1	0	0	2	3	2,6
	N. Riesgo Alto	30	6	0	24	60	52,6
	N. Riesgo Medio	4	36	10	0	50	43,9
	N. Riesgo Bajo	0	1	0	0	1	0,9
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>114</b>	<b>100%</b>

Fuente: Creado a partir de la base SIVISTRA. I trimestre 2022 Secretaria Distrital de Salud.

Los profesionales del Subsistema de vigilancia epidemiológico SIVISTRA, quienes son los encargados de las Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC), durante el abordaje realizan caracterización de los riesgos ocupacionales y las condiciones de salud del trabajador, a partir de un análisis de las condiciones

anteriormente descritas, emiten un concepto de probabilidad de asociación. Cuando el concepto emitido por el profesional es “Muy Probable”, es porque evidencian elementos suficientes para determinar que el evento presentado por el trabajador, tiene o tuvo estrecha relación con la actividad laboral desarrollada o en desarrollo.

En el primer trimestre del año 2022, el 100% de las caracterizaciones realizadas por evento de sospecha de accidente relacionados a la actividad laboral, se consideraron muy Probables. En el caso de las enfermedades, también fue considerado como muy probable al 100% de las investigaciones realizadas por parte del equipo de profesionales del Subsistema.

Cuando se realiza una investigación epidemiológica de campo de evento enfermedad y esta es llevada a cabo de manera presencial, al identificarse que esta enfermedad pueda estar asociada a una condición de Riesgo químico o biomecánico, este riesgo se caracteriza para poderlo cuantificar y determinación la probabilidad de asociación entre el riesgo laboral y la enfermedad investigada, desde el mes de Noviembre del año 2021, el Subsistema SIVISTRA puede realizar caracterizaciones de Riesgo Químico, sin que necesariamente el trabajador o trabajadora presente un evento en salud como Enfermedad o Accidente.

Tabla 19. Ocupaciones con Riesgo más elevado por exposición a condiciones biomecánicas y químicas. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022

OCUPACIÓN	RIESGO BIOMECÁNICO		RIESGO QUÍMICO	
	TRABAJADOR	%	TRABAJADOR	%
Peluqueros y afines	36	31,6	0	0,0
Oficios Varios	26	22,8	0	0,0
Cocineros y afines	23	20,2	0	0,0
Vendedores y afines	15	13,2	1	1,7
Sastres, tapiceros y afines	6	5,3	4	6,9
Carniceros, pescaderos y afines	3	2,6	0	0,0
Recicladores	1	0,9	3	5,2
Pintores y afines	1	0,9	7	12,1
Mecánicos	1	0,9	28	48,3
Operadores de maquinaria y equipo	1	0,9	4	6,9
Carpinteros y artesanos de materiales	1	0,9	5	8,6
Soldadores, oxicortadores y afines	0	0,0	6	10,3
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>100,0</b>	<b>58</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Creado a partir de la base Datos SIVISTRA I trimestre 2022 secretaria Distrital de Salud.

En el primer trimestre del año 2022, el subsistema caracteriza a un total de 114 trabajadores por riesgo biomecánico y 66 trabajadores por riesgo químico, de los cuales 3 presentaban Enfermedad asociada a la exposición, frente al riesgo biomecánico el 55,3% de los trabajadores caracterizados presentaron niveles de Riesgo altos (R. Crítico y R. Alto), lo que supone que la sintomatología referida está directamente relacionada con las condiciones biomecánicas en las que la persona desarrolla sus actividades laborales, frente a las condiciones de Riesgo químico los niveles altos (R. Crítico y R. Alto), se presentaron en el 57,6% de los trabajadores, lo que sugiere que la exposición puede llegar a causar afectaciones en la salud de las personas a futuro.

Los Peluqueros y afines es la ocupación que evidencio mayor índice de Riesgos Ocupacionales Biomecánicos, la caracterizaciones de sus condiciones permitió identificar riesgos como los movimientos repetitivos de miembros Superiores por la realización de sus tareas, posturas fuera de ángulos de confort articular en miembros superiores asociado al uso de herramientas, así como la aplicación de fuerza segmentaria y la bipedestación prolongada principalmente, responsables de la generación de alteraciones osteomusculares en esta ocupación, hay otras situaciones que pueden considerarse condicionantes, como lo son los cambios de temperatura y no tomar medidas para reducir el riesgo como lo puede ser la realización de pausas activas y calentamiento previo a la actividad.

En el caso del Riesgo Químico, los mecánicos fueron los que mayores niveles de Riesgo presentaron, en esta ocupación se evidenciaron situaciones como almacenamiento inapropiado de agentes químicos, espacios físicos no óptimos para el desarrollo de la labor (espacios cerrados), mala disposición de residuos y el no uso o inadecuado uso de Elementos de Protección Personal (EPP), en el caso de la exposición a Riesgos Químicos, las afectaciones a la salud del Trabajador, pueden presentarse en diferentes sistemas, siendo el respiratorio el principal, pero también se evidencian alteraciones a nivel tegumentario y visual.

Tabla 20. Distribución de condiciones sociodemográficas y por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022

VARIABLES		FONTIBÓN	BOS A	PUENTE ARANDA	KENNEDY	TOTAL	%
Sexo	Femenino	34	31	17	29	111	41,1
	Masculino	41	44	28	46	159	58,9
Edad	< 18 años	0	0	0	1	1	0,4
	18 a 29 años	15	10	4	15	44	16,3
	30 a 59 años	51	53	37	55	196	72,6
	> 60 años	9	12	4	4	29	10,7

Escolaridad	Primaria completa	6	18	6	18	48	17,8
	Primaria incompleta	7	7	3	5	22	8,1
	Secundaria completa	30	28	19	25	102	37,8
	Secundaria incompleta	15	14	6	9	44	16,3
	Técnico los secundaria completo	5	3	6	10	24	8,9
	Técnico pos secundaria incompleto	7	1	0	2	10	3,7
	Universidad completa	4	0	4	2	10	3,7
	Universidad incompleta	1	0	1	3	5	1,9
	No fue a la escuela	0	4	0	1	5	1,9
	Afiliación salud	Contributivo	29	18	24	31	102
No asegurado		18	6	2	11	37	13,7
Subsidiado		28	51	19	33	131	48,5
Pensiones	No	70	73	43	58	244	90,4
	Si	5	2	2	17	26	9,6
Estrato	Estrato 0	0	1	1	0	2	0,7
	Estrato 1	0	21	0	0	21	7,8
	Estrato 2	33	51	1	51	136	50,4
	Estrato 3	37	2	43	24	106	39,3
	Estrato 4	5	0	0	0	5	1,9
Ocupaciones	Oficios varios	15	20	7	15	57	21,1
	Peluqueros y afines	19	5	2	14	40	14,8
	Mecánicos	8	4	13	12	37	13,7
	Cocineros y afines	10	8	4	7	29	10,7
	Vendedores y afines	9	8	4	3	24	8,9
	Sastres, tapiceros y afines	6	5	1	5	17	6,3
	Operadores de	3	4	2	2	11	4,1

	maquinaria y equipo						
	Pintores y afines	0	4	5	1	10	3,7
	Carpinteros y afines	1	5	1	3	10	3,7
	Trabajadores de la construcción y afines	3	3	1	2	9	3,3
	Recicladores	1	0	1	5	7	2,6
	Administrativos y afines	0	3	1	3	7	2,6
	Soldadores, oxicortadores y afines	0	3	3	1	7	2,6
	Carniceros, pescaderos y afines	0	3	0	2	5	1,9
<b>TOTAL, POR LOCALIDAD</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>270</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Creado a partir de la base de Datos SIVISTRA, I trimestre 2022 Secretaria Distrital de Salud.

El 58,9% de los trabajadores que ingresaron al subsistema pertenecen al sexo masculino y el 41,1% son del sexo femenino, situación que depende de factores como la notificación recibida al subsistema o la priorización que haya generado el profesional en cada Localidad, pues durante este periodo no se generaron priorización de Unidades de Trabajo, aunque se tenga mayor proporción de Hombres, no debe desconocerse que la diferencia no es sustancial, lo que permite evidenciar que las mujeres cada vez más integran y movilizan la fuerza laboral y económica en los contextos sociales y en la informalidad se encuentra un espacio que les permite desarrollarse laboralmente.

Durante el trimestre, ingresó 1 menor de 18 años al subsistema SIVISTRA, corresponde a un joven de 17 años de la localidad de Kennedy quien presento Accidente y fue notificado al Subsistema por UPGD, este trabajador fue notificado a Entorno Laboral para oportuna intervención dentro de la estrategia de desvinculación progresiva de niños, niñas y adolescentes.

Se evidencia que ingresaron 29 trabajadores informales (10.4%) mayores de 60 años, los adultos quienes son la mayor fuerza laboral, es donde más eventos se presentaron aportando el 72,6% del total de la población abordada por el Subsistema.

La mayor proporción de trabajadores que ingresaron al subsistema, hacen parte del régimen subsidiado con el 48,5%, en el régimen contributivo se encuentran el 37,8% de estos trabajadores el 45% (n=46) lo hacen en calidad de cotizantes y el restante 55% (n=56) como beneficiarios y 13,7% no se encuentran asegurados, lo que

supone que el costo de atención a sus necesidades en salud, son asumidos por el propio trabajador, sus familias o el fondo financiero distrital, dependiendo el tipo y la gravedad del evento, dentro de los No asegurados el 86,4% son trabajadores migrantes.

Al sistema general de pensiones se encuentran afiliados tan solo el 9,6% (n=26) de los trabajadores, lo que permite suponer que, en caso de una lesión grave como consecuencia de un evento ocupacional, estos serían los únicos que podrían tener una protección económica (pensión) para ellos en caso de discapacidad o para sus familias en caso de fallecimiento.

Tabla 21. Distribución de condiciones socioeconómicas y por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022

VARIABLES		FONTIBÓN	BOSA	PUENTE ARANDA	KENNEDY	TOTAL	%
Nivel de ingresos	1 smmlv	40	31	22	34	127	47,0
	Entre 1 y 2 smmlv	2	3	15	0	20	7,4
	Menos de 1 smmlv	33	40	8	41	122	45,2
	2 y más smmlv	0	1	0	0	1	0,4
Forma de pago	A destajo	70	75	45	69	259	95,9
	Monetaria fija	5	0	0	6	11	4,1
Periodicidad de pago	C/ 8-15 d	6	15	10	5	36	13,3
	Diaria	69	58	34	69	230	85,2
	Mensual	0	2	1	1	4	1,5
Jornada de trabajo	Menos de 8 horas/día	10	9	3	16	38	14,1
	8 horas/día	23	25	27	23	98	36,3
	9 a 11 horas/día	26	22	11	19	78	28,9
	12 o más horas /día	16	19	4	17	56	20,7
Días de trabajo	De 2 a 5 días	15	23	8	17	63	23,3
	6 días	40	24	35	41	140	51,9
	Todos los días	20	28	2	17	67	24,8
Total, por localidad		75	75	45	75	270	270

Fuente: Creado a partir de la base de Datos, SIVISTRA I trimestre 2022 Secretaria Distrital de Salud.

La modalidad de pago más común en la informalidad es al destajo, quiere decir que el pago percibido es de acuerdo a la cantidad de trabajo que realiza, esta forma de pago se presenta en el 95,9% de los casos, el 47% de los trabajadores manifestaron que su ingreso promedio mensual era de 1 SMMLV y el 45,2% refieren un ingreso inferior a 1 SMMLV, la mayor proporción de trabajadores (36,3%) se ocupan 8 horas al día, no obstante el 49,6% trabajan más de 9 horas al día, se evidencia que en la dinámica de la informalidad entre mayor oferta tenga del servicio mayores ingresos se perciben; el 51,9% descansan solo 1 día a la semana, el 24,8% refieren trabajar todos los días sin descanso, condiciones que parecen muy desfavorables para un

trabajador, pero que hacen parte de la realidad de muchas personas que deben vincularse a la informalidad para suplir sus necesidades económicas.

Tabla 22. Distribución por tipo de lesión y parte del cuerpo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022

OCUPACIÓN / TIPO DE LESIÓN	TRABAJADOR	%
Herida (36)		
Oficios Varios	9	15,0
Sastres, tapiceros y afines	4	6,7
Operadores de maquinaria y equipo	4	6,7
Cocineros y afines	4	6,7
Trabajadores de la construcción y afines	4	6,7
Recicladores	2	3,3
Mecánicos	2	3,3
Carpinteros y artesanos de materiales	2	3,3
Soldadores, oxicortadores y afines	1	1,7
Vendedores y afines	1	1,7
Peluqueros y afines	1	1,7
Carniceros, pescaderos y afines	1	1,7
Administrativos y afines	1	1,7
Quemadura (9)		
Oficios Varios	4	6,7
Pintores y afines	1	1,7
Trabajadores de la construcción y afines	1	1,7
Vendedores y afines	1	1,7
Recicladores	1	1,7
Peluqueros y afines	1	1,7
Fractura (3)		
Trabajadores de la construcción y afines	1	1,7
Carniceros, pescaderos y afines	1	1,7
Operadores de maquinaria y equipo	1	1,7
Amputación o enucleación (3)		
Oficios Varios	1	1,7
Operadores de maquinaria y equipo	1	1,7
Carpinteros y artesanos de materiales	1	1,7
Torcedura, esguince, desgarro muscular (2)		
Administrativos y afines	1	1,7
Oficios Varios	1	1,7

Conmoción o trauma interno (2)		
Oficios Varios	2	3,3
Envenenamiento o intoxica. aguda o alérgica (2)		
Vendedores y afines	1	1,7
Oficios Varios	1	1,7
Contusión aplastamiento (1)		
Oficios Varios	1	1,7
Otro trauma superficial (1)		
Carpinteros y artesanos de materiales	1	1,7
Asfixia (1)		
Oficios Varios	1	1,7
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>60</b>	<b>90%</b>

PARTE DEL CUERPO COMPROMETIDO	TRABAJADOR	%
Cabeza (1)		
Operadores de maquinaria y equipo	1	1,7
Cuello / Área cervical (2)		
Recicladores	1	1,7
Oficios Varios	1	1,7
Mano - Dedos (40)		
Oficios Varios	12	20,0
Trabajadores de la construcción y afines	5	8,3
Cocineros y afines	4	6,7
Sastres, tapiceros y afines	4	6,7
Operadores de maquinaria y equipo	4	6,7
Carpinteros y artesanos de materiales	3	5,0
Recicladores	2	3,3
Peluqueros y afines	2	3,3
Administrativos y afines	1	1,7
Carniceros, pescaderos y afines	1	1,7
Vendedores y afines	1	1,7
Mecánicos	1	1,7
Miembros superiores (6)		
Oficios Varios	3	5,0
Operadores de maquinaria y equipo	1	1,7
Carniceros, pescaderos y afines	1	1,7
Pintores y afines	1	1,7

Tórax, anterior (2)		
Mecánicos	1	1,7
Oficios Varios	1	1,7
Región Lumbar (2)		
Carpinteros y artesanos de materiales	1	1,7
Oficios Varios	1	1,7
Miembros Inferiores (2)		
Soldadores, oxicortadores y afines	1	1,7
Administrativos y afines	1	1,7
Pie(s) (1)		
Trabajadores de la construcción y afines	1	1,7
Otra(s) (4)		
Vendedores y afines	2	3,3
Oficios Varios	2	3,3
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>90%</b>

Fuente: SIVISTRA. Base de Datos I trimestre 2022 Secretaria Distrital de Salud.

Se realiza investigación epidemiológica de campo a 60 trabajadores por evento accidente, en el 60% de los casos la lesión generada fueron Heridas, las Quemaduras fueron la segunda lesión más presentada con el 15% de los casos investigados, la zona del cuerpo con mayor afectación son las manos y dedos de las manos donde se presentaron el 67% de los eventos, esto relacionado con el uso de maquinaria y herramienta por el riesgo que esto representa, las razones más comunes referidas por los trabajadores son las distracciones y el exceso de confianza.

Tabla 23. Distribución por Sistema comprometido y agente asociado a Enfermedad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022

TIPO DE ALTERACION O SISTEMA COMPROMETIDO	TRABAJADOR	%	AGENTE ASOCIADO							
			Movimientos repetitivos de MMSS	Bipedestación prolongada	Posturas forzadas (en cuclillas o flexionado)	Manipulación de cargas mayor a 12.5 (♀) /25K (♂)	Sedestación prolongada	Exposición a sustancias y/o agentes químicos	Proyección de partículas	Otro agente
Lesiones de hombro	42	28,6	38	0	0	4	0	0	0	0
Dorsolumbalgias	26	17,7	0	1 3	7	1	5	0	0	0
Cervicobraquialgia	25	17,0	2	1	21	1	0	0	0	0
Síndrome del túnel del carpo	16	10,9	16	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad varicosa	11	7,5	0	1 1	0	0	0	0	0	0
Otros trastornos de tejidos blandos	8	5,4	4	3	0	1	0	0	0	0
Epicondilitis y bursitis de codo	6	4,1	6	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos del ojo y/o anexos	5	3,4	0	0	0	0	0	2	1	2
Mono neuropatías de MIs y las no especificadas	2	1,4	1	1	0	0	0	0	0	0
Artrosis	1	0,7	1	0	0	0	0	0	0	0
Otras mono neuropatías del MsSs	1	0,7	1	0	0	0	0	0	0	0
Exposición ocupacional a agentes tóxicos	1	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras alteraciones óseas	1	0,7	0	0	1	0	0	0	0	0
Afecciones de vía respiratoria alta	1	0,7	0	0	0	0	0	1	0	0
Afecciones de vía respiratoria baja	1	0,7	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>147</b>	<b>100 %</b>	<b>69</b>	<b>2 9</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Fuente: Creado a partir de la base Datos SIVISTRA I trimestre 2022 Secretaria Distrital de Salud.

Las alteraciones relacionadas con el Sistema Osteomuscular corresponden a la principal tendencia frente a las Enfermedades caracterizadas por el Subsistema, el diagnóstico más identificado fue Lesiones de Hombro presentes en el 28,6% de los trabajadores caracterizados y el principal agente relacionado a esta sintomatología fueron los Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores; las Dorsolumbalgias se presentaron en el 17,7% de los casos, asociado principalmente a la Bipedestación Prolongada, este diagnóstico corresponde a síntomas de posibles

diferentes alteraciones que desencadenan dolores a nivel de Espalda, que pueden ubicarse en la zona Dorsal o Lumbar.

Durante el periodo se identifican enfermedades varicosas en el 7,5% de los trabajadores, asociado principalmente a Bipedestación prolongada, los trastorno del ojo se presentó en el 3,4%, la exposición ocupacional a agentes tóxicos así como afectaciones de vías respiratorias bajas y altas aportaron cada uno de estos diagnósticos 1 caso; para esta vigencia no identifico casos con diagnóstico de Estrés y otros trastornos mentales que habían tenido una importante prevalencia en vigencias anteriores.




Figura 23. Distribución de casos sospechosos de accidentes con probable origen ocupacional en el primer trimestre de 2022. SIVISTRA. Base de Datos Secretaria Distrital de Salud.

Se evidencia alta concentración de eventos caracterizados por sospechas de accidentes de trabajo relacionados con la ocupación en la UPZ Fontibón central y en la UPZ patio bonito en la localidad de Kennedy; estos accidentes se relacionan principal con actividades en relación de industria manufacturera, concentración alta de estas unidades de trabajo o actividades económicas en estas UPZ, La mayoría de accidentes se caracterizan por consecuencias que han provocado heridas en los trabajadores debido al uso de herramienta y maquinaria que genera lesión en los trabajadores.




Figura 24. Distribución con grado de lesión de casos sospechosos de accidentes con probable origen ocupacional en el primer trimestre de 2022. SIVISTRA. Base de Datos Secretaria Distrital de Salud.

En cuanto a la gravedad en cuanto a la sospecha de accidente se consideran accidentes moderados; los accidentes graves se presentaron especialmente en la UPZ bosa central y en bosa occidental, y de puente Aranda en la UPZ zona industrial. Defínase como accidente grave de acuerdo al lineamiento: aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos; trauma craneoencefálico, y quemaduras de segundo y tercer grado. De acuerdo al concepto relatado este tipo de lesiones puede generar un tipo de discapacidad o una capacidad funcional, limitando la capacidad laboral y afectación en las demás áreas de ajuste.

**8. Eventos asociados a condiciones crónicas no transmisibles**

La Vigilancia en Salud Pública de las condiciones crónicas aborda eventos "no transmisibles" que involucran patologías de larga duración con un desenlace variable según factores que se relacionan a la enfermedad misma, a su atención, a la persistencia de exposiciones ambientales o de comportamiento riesgosas y a la

presencia de comorbilidad, entre otros. En la actualidad, dentro de los eventos incluidos en los lineamientos del SIVIGILA Nacional se encuentran cáncer en menores de 18 años, cáncer de mama en ambos sexos y cáncer de cuello uterino. Es importante mencionar que el cáncer, en los últimos años se ha considerado un evento de interés en salud pública debido a las grandes repercusiones que tiene en la sociedad, desde económicas, físicas y mentales entre otras. Según las cifras estadísticas se considera que en los próximos años el número de casos aumentará en forma significativa en el mundo; así que los grandes retos de la sociedad es contar con sistemas de salud que ofrezcan una atención integral oncológica, con capacidad de hacer diagnósticos tempranos, tratamientos adecuados y profesionales suficientes para la atención de los pacientes; pero sin dejar a un lado que uno de los aspectos más importantes en la lucha contra el cáncer es la prevención, educar a la población en factores de riesgo y cambios de estilos de vida más saludables

### 8.1. Cáncer en menores de 18 años Evento 115.

Para este evento fueron notificados al SIVIGILA 5 casos durante el primer trimestre (enero a marzo de 2022), de los cuales 4 ingresaron como casos probables y solo 1 caso como confirmado, a la fecha se han descartado 3 casos, 1 caso se confirmó y 1 caso pendiente por ajuste a pesar que ya se había realizado no aparece reflejado en el aplicativo SIVIGILA y no se evidencia ninguna mortalidad por este evento, las UPGD que realizan notificación para el evento 115 (Cáncer en menores de 18 años), son:, Clínica Colsubsidio Ciudad Roma, Cruz Roja Colombiana SCB Sede Alquería, Virrey Solís IPS Américas y EPS Sanitas Centro médico Plazas de las Américas

Tabla 24. Eventos Notificados al SIVIGILA de cáncer en menores de 18 años por ocurrencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero a marzo 2022.

MES	NOTIFICADOS	PROBABLES	CONFIRMADOS	DESCARTADOS	PENDIENTE
ENERO	1	1	1	0	0
FEBRERO	2	1	1	1	0
MARZO	2	2	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Fuente: Creado a partir de Bases Distritales SIVIGILA, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero a marzo de 2022.

En la tabla anterior se puede observar que en los meses de febrero y marzo se notificó el 40% (n=2) de los casos de cáncer en menores de 18 años en cada uno de los meses, de los cuales el 50,0% (n=2) se descartaron de los 4 eventos que ingresaron como probables, ya que el de la paciente con ID 1020814038 se descartó pero no aparece el ajuste reflejado en las bases entregadas, durante este período no hubo notificación por segundas neoplasias o recaídas.




Figura 25. Eventos de Cáncer en menores de 18 años notificados por grupo quinquenal y sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

De acuerdo a la notificación realizada durante el primer trimestre del año 2022 para el evento de cáncer en menores de 18 años, se observa que el 60,0% (n=3) de los casos son mujeres y el restante son hombres con un 40,0% (n=2) y en el grupo de edad con un 40% (n=2) se encuentran en el grupo de 15 a 19 años. Con relación al grupo poblacional no se evidencia que pertenezcan a ningún grupo como víctima de conflicto armado, migrantes, con discapacidad, etc., todos están en el ítem de otros grupos poblacionales.

Tabla 25. Eventos notificados de cáncer en menores de 18 años por momento de curso de vida, sexo y localidad por ocurrencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022.

MOMENTO DEL CURSO DE VIDA	KENNEDY				PUENTE ARANDA				TOTAL	
	F		M		F		M			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Primera infancia	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0
Infancia	2	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	40,0
Adolescencia	0	0,0	1	20,0	1	20,0	0	0,0	2	40,0
<b>TOTAL</b>	2	40,0	2	40,0	1	20,0	0	0,0	5	100,0

Fuente: Bases Distritales SIVIGILA, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero a marzo de 2022.

Se evidencia en la tabla anterior que el momento de curso de vida con mayor número de casos notificados es el de infancia y adolescencia con un 80,0% (n=4) y en menor proporción primera infancia con un 20,0% (n=1), la localidad con mayor número de casos notificados es la de Kennedy con 4 casos con un 80,0% (n=4) y el 60,0% (n=3) son mujeres y no hubo casos notificados en las localidades de Bosa y Fontibón para este período.




Figura 26. Eventos de Cáncer en menores de 18 años notificados por residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

Se puede evidenciar que el 60,0% (n=3) de los casos notificados durante el primer trimestre del año 2022 residen en las localidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y el 40,0% (n=2) residen fuera de Bogotá, específicamente en el municipio de Soacha.




Figura 27. Cáncer en menores de 18 años según régimen de afiliación. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

Con relación al régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud – SGSSS, se puede evidenciar que en el primer trimestre del año 2022 el 100% (n=5) de los casos notificados por las UPGD de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente se encuentran asegurados al régimen de afiliación contributivo, con mayor proporción a la EAPB Compensar con un 40,0% (n=2), lo cual es muy importante ya que no deberían presentar barreras para el acceso a los servicios de salud.




Figura 28. Eventos notificados por tipo de cáncer en menores de 18 años. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

En el primer trimestre del año 2022 el tipo de cáncer que más se notificó en menores de 18 años fue Linfomas y neoplasias reticuloendoteliales y otras neoplasias malignas no especificadas con un 40,0% (n=2) para cada uno de los tumores, pendiente verificar el caso de la paciente con ID 1020814038 el cual se realizó un ajuste 6, pero no se ve reflejado en las bases.

## 8.2. Indicadores de vigilancia y análisis de riesgo en salud

- Tasa de incidencia de notificación de leucemias en menores de 15 años: La tasa de incidencia de leucemias en menores de 15 años para el primer trimestre del año 2022 es de 0,2 por cien mil habitantes teniendo en cuenta que la población menor de 15 años en las localidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente es de 446.800, dato obtenido de la Secretaría de Planeación 2005 - 2035.
- Tasa de incidencia de cáncer en menores de 18 años: La tasa de incidencia de cáncer en menores de 18 años para el primer trimestre del año 2022 es de 0,4 por cien mil habitantes teniendo en cuenta que la población menor de 18 años en las localidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente es de 545.177, dato obtenido de la Secretaría de Planeación 2005 - 2035.
- Tasa de mortalidad por cáncer en menores de 18 años: Durante el primer trimestre del año 2022 no se ha presentado ninguna mortalidad.

### 8.2.1. Indicadores de análisis del riesgo en salud y seguimiento alerta temprana

La oportunidad en la presunción diagnóstica (diagnóstico probable) fue alta en el 100% (n=5) de los eventos notificados en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

La oportunidad en la confirmación diagnóstica en cáncer de menores de 18 años notificados en el periodo evaluado es alta en el 100,0% (n=2) de los eventos notificados en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, ya que de los 5 casos solo 2 han sido confirmados.

Con respecto a la oportunidad en el inicio de tratamiento el 50,0% (n=1) tiene una oportunidad alta (menor a los 2 días) y el otro caso está pendiente por inicio de tratamiento, ya tiene la orden para la realización de la cirugía, pero no le han dado fecha para el procedimiento.

La proporción de casos que permanecen como probables es del 25,0% (n=1) ya que se realizó el ajuste dentro de las primeras 4 semanas, pero no se ve reflejado en la base de SIVIGILA ni en la base distrital, por tal motivo se debe verificar y de no evidenciarse volverlo a ajustar.

La proporción de participación en escenarios de interés en salud pública ha sido del 100% teniendo en cuenta que se han realizado actividades en las diferentes UPGD para el fortalecimiento de capacidades en temas enfocados en cáncer en menores de 18 años enfatizando la prevención y detección oportuna del cáncer infantil, también se participó en el COVE del mes de febrero en donde se recalcó la importancia de la notificación de dichos eventos desde su probabilidad y de manera oportuna, en el mes de febrero también se participó en el Facebook live Cáncer Infantil “Dale Play a la Vida” y se invitó a la trabajadora social de la Fundación Sanar quien brindó toda la información acerca de cáncer infantil y de los servicios que cuenta la fundación.

#### 8.2.2. Cáncer de Mama Evento 155

Con relación al evento de cáncer de mama, durante el primer trimestre del año 2022, se notificaron 114 casos, no se presentaron casos en hombres y no se presentaron mortalidades.




Figura 29. Eventos notificados de cáncer de mama por localidad de ocurrencia y mes. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

De los 114 casos podemos observar en el gráfico, que la localidad con mayor número de eventos es la de Kennedy con un 87,7% (n=100) teniendo en cuenta que contamos con la UPGD Clínica del Seno en esta localidad, seguido por las localidad de Puente Aranda con un 6,1% (n=7), con un 3,5% (n=4) la localidad de Fontibón y por último la localidad de Bosa con 2,6% (n=3) y el mes con mayor número de casos fue marzo con un 41,2% (n=47), seguido por el mes de febrero con un 36,0% (n=41) y por último el mes de enero con un 22,8% (n=26).




Figura 30. Cáncer de mama según grupo de edad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

Teniendo en cuenta el grupo de edad la mayoría de las usuarias con diagnóstico de cáncer de mama se encuentran en las siguientes edades de los 55 a los 59 años con un 14,9% (n=17), teniendo en cuenta que a partir de los 50 años se realiza la toma de la mamografía para la detección temprana y oportuna de dicho evento y en menor porcentaje están las de las edades de 85 a 89 años y 90 a 94 años con un 0,9% (n=1) para cada una de las edades mencionadas. En cuanto al grupo

poblacional se evidencia 4 casos de población migrante todos de Venezuela, las demás se encuentran en el ítem de otros grupos poblacionales.

Tabla 26. Eventos notificados de cáncer de mama por momento de curso de vida y localidad de Residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022.

MOMENTO DEL CURSO DE VIDA	BOSA		FONTIBÓN		KENNEDY		PUENTE ARANDA		OTRAS LOCALIDADES		FUERA DE BOGOTÁ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Adultez</b>	11	9,6	3	2,6	11	9,6	5	4,4	36	31,6	2	1,8	68	59,6
<b>Vejez</b>	8	7,1	7	6,1	8	7,1	3	2,6	16	14,0	4	3,5	46	40,4
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>16,7</b>	<b>10</b>	<b>8,7</b>	<b>19</b>	<b>16,7</b>	<b>8</b>	<b>7,0</b>	<b>52</b>	<b>45,6</b>	<b>6</b>	<b>5,3</b>	<b>114</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de Bases Distritales SIVIGILA, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022.

Se puede evidenciar en la tabla anterior que el 45,6% (n=52) de los casos notificados por cáncer de mama durante el primer trimestre del año 2022 residen en otras localidades que no son pertenecientes a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, con respecto a las localidades de la Subred Sur Occidente la mayoría residen en las localidades de Kennedy y Bosa con un 16,7% (n=19) para cada una de las localidades y en menor proporción las que residen fuera de Bogotá con un 5,3% (n=6), en los municipios de Soacha, Funza y la mesa. En cuanto al momento de curso de vida el 59,6% (n=68) pertenecen al curso de adultez y en menor proporción al curso de vida vejez con un 40,4% (n=46).




Figura 31. Cáncer de mama según régimen de afiliación. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

Según el régimen de afiliación de los casos notificados del evento cáncer de mama se puede observar que en el primer trimestre del año 2022 la gran mayoría

pertencen al régimen contributivo con un 90,3% (n=103), seguido por el régimen Subsidiado con un 8,8% (n=10) y al régimen de excepción el 0,9% (n=1), con relación al régimen contributivo la gran mayoría se encuentran afiliadas a la EAPB Compensar ya que de los 103 casos el 81,6% (n=84) son de Compensar y en cuanto al régimen subsidiado todos los casos se encuentran en Capital Salud y no se evidencian casos sin aseguramiento.




Figura 32. Distribución de tipo de cáncer de mama según histopatología. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

Los tumores malignos de cáncer de mama en la Subred Sur Occidente con mayor notificación en el primer trimestre del año 2022 se clasificaron en Carcinoma ductal en un 96,5% (n=110) y el carcinoma lobulillar fue del 3,5% (n=4), con respecto al grado histopatológico el 91,2% (n=104) los clasificaron como infiltrantes y en una menor proporción el grado histopatológico No indicado con un 3,5% (n=4).




Figura 33. Oportunidad de toma y resultado de biopsia para cáncer de mama. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

El promedio de días para el diagnóstico entre la toma y el resultado de la biopsia para cáncer de mama de los casos notificados en el primer trimestre del año 2022 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente fue de 12,6 días con un mínimo de 0 días y un máximo de 75 días, la entrega del resultado después de

la toma de la muestra de la biopsia se clasifica en oportunidad alta cuando es menor o igual a 7 días, media entre 8 a 15 días y baja mayor a 15 días; el 27,2% (n=31) de los casos notificados en el primer trimestre del año 2022 registraron una oportunidad alta, oportunidad media el 46,5% (n=53) y el 26,3% (n=30) una oportunidad baja.




Figura 34. Oportunidad para implantar el tratamiento de cáncer de mama. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA

El promedio en días para el inicio de tratamiento de los casos notificados de cáncer de mama al SIVIGILA en el primer trimestre del año 2022 fue de 62,2 días, con un mínimo de 14 días y un máximo de 426 días, el inicio de tratamiento antes de los 30 días se clasifica con una oportunidad alta, entre 31 y 45 días oportunidad media y mayor a 45 días oportunidad baja; el 6,1% (n=7) de los casos notificados por cáncer de mama en la Subred Sur Occidente en el período evaluado tuvo una oportunidad alta, con una oportunidad media el 9,6% (n=11) y oportunidad baja el 16,8% (n=19), se evidencia que el 67,5% (n=77) se encuentra sin inicio de tratamiento, pendiente el ajuste por parte de la UPGD o EAPB correspondiente.

### 8.2.3. Cáncer de cuello uterino

Los casos notificados al SIVIGILA del evento cáncer de cuello uterino fueron 149 durante el primer trimestre del año 2022, todos los eventos notificados son morbilidades y no se evidencian eventos notificados por mortalidad durante este período.




Figura 35. Eventos notificados de cáncer de Cuello Uterino por localidad de ocurrencia y mes. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

Como se puede evidenciar en el gráfico la localidad con mayor número de casos fue la localidad de Kennedy con un 75,2% (n=112), seguido por la localidad de Fontibón con un 12,1% (n=18), la localidad de Bosa con un 11,4% (n=17) y la localidad de Puente Aranda en menor proporción con un 1,3% (n=2), la localidad de Kennedy tiene el mayor número de casos ya que es la que cuenta con más números de UPGD que notifican dichos eventos, en cuanto al mes con mayor número de casos notificados fue enero con el 38,9% (n=58), seguido por marzo con un 33,6% (n=50) y febrero con el 27,5% (n=41).




Figura 36. Cáncer de cuello uterino según grupo de edad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA

Teniendo en cuenta el grupo de edad la mayoría de las usuarias con diagnóstico de cáncer de cuello uterino se encuentran en las siguientes edades de los 30 a los 34 años con un 27,5% (n=41), seguido por las edades de 25 a 29 con un 19,5% (n=29) y en menos proporción las de 70 a 74 años con un 0,7% (n=1). En cuanto al grupo

poblacional se evidencian 4 casos migrantes de Venezuela, 2 personas del grupo étnico Rom – Gitano y 1 persona afrocolombiana y las demás se encuentran en el ítem de otros grupos poblacionales.

Tabla 27. Eventos notificados de cáncer de Cuello Uterino por momento de curso de vida, sexo y localidad de Residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022.

MOMENTO DEL CURSO DE VIDA	BOSA		FONTIBÓN		KENNEDY		PUENTE ARANDA		OTRAS LOCALIDADES		FUERA DE BOGOTÁ		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Juventud	3	2,0	1	0,7	4	2,7	1	0,7	14	9,4	4	2,7	27	18,1
Adulthood	14	9,4	13	8,7	29	19,5	3	2,0	38	25,5	14	9,4	111	74,5
Vejez	4	2,7	1	0,7	3	2,0	0	0,0	2	1,3	1	0,7	11	7,4
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>12,1</b>	<b>15</b>	<b>10,1</b>	<b>36</b>	<b>24,2</b>	<b>4</b>	<b>2,7</b>	<b>54</b>	<b>36,2</b>	<b>19</b>	<b>12,8</b>	<b>149</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de la base Distritales SIVIGILA, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022.

De los 149 casos de cáncer de cuello uterino notificados al SIVIGILA en el primer trimestre del año 2022 el 74,5% (n=111) pertenecen al momento de curso de vida adultez, seguido por juventud con un 18,1% (n=27) y por último vejez con un 7,4% (n=11), es importante resaltar que en este curso de vida las mujeres tomamos conciencia de la importancia de la toma de la citología, además se está implementando actualmente la prueba de tipificación de VPH para mujeres entre 30 a 65 años, también se observa que la mayoría con este tipo de diagnósticos residen en otras localidades con un 36,2% (n=54), seguido por la localidad de Kennedy con un 24,2% (n=36) y por último los que residen en la localidad de Puente Aranda con un 2,7 % (n=4), teniendo en cuenta que en esta localidad la mayoría de población pertenece al momento de curso de vida vejez.




Figura 37. Cáncer de cuello uterino según régimen de afiliación. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.

En el gráfico se puede observar que la mayoría de las usuarias notificadas por el evento cáncer de cuello uterino pertenecen al régimen Contributivo con un 80,5 (n=120) con mayor número de usuarias afiliadas a la EAPB Famisanar, con un 18,8% (n=28) al régimen subsidiado, con mayor número de usuarias afiliadas a Capital Salud en este régimen y en menor proporción al régimen de excepción con un 0,7% (n=1) y no se evidencia ninguna usuaria sin aseguramiento.




Figura 38. Distribución de tipo de cáncer de cuello uterino según histopatología. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA

Respecto a los eventos al SIVIGILA en el I trimestre del año 2022 de cáncer de cuello uterino en la Subred Sur Occidente con mayor notificación son las Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Alto Grado – LEI AG con un 86,6% (n=129), seguido por el Carcinoma escamocelular con un 11,4% (n=17) y por último adenocarcinoma con un 2,0% (n=3), en cuanto al grado histopatológico con mayor proporción es el No indicado con un 87,2% (n=130).




Figura 39. Oportunidad de toma y resultado de biopsia para cáncer de cuello uterino. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA

El promedio de días para el diagnóstico entre la toma y el resultado de la biopsia para cáncer de cuello uterino fue de 16,9 días, con un mínimo de 0 días y un máximo de 380 días, la oportunidad entre la toma de la biopsia y la entrega del resultado de

los casos notificados en la Subred Sur Occidente fue alta en el 30,9% (n=46), con un 34,9% (n=52) oportunidad media y baja el 34,2% (n=51) de los 149 eventos.




Figura 40. Oportunidad para implantar el tratamiento de cáncer de cuello uterino. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA

El promedio en días para el inicio de tratamiento de cáncer de cuello uterino en el primer trimestre del año 2022 fue de 51,5 días, con un mínimo de 0 días y un máximo de 191 días. Con relación a la oportunidad para implantar el tratamiento fue alta en el 14,1% (n=21), con un 6,0% (n=4) oportunidad media, oportunidad baja el 18,8% (n=28) y sin inicio de tratamiento el 63,1% (n=94) pendiente por ajuste por parte de la UPGD o EAPB encargada.

Tasa de incidencia de cáncer de mama y cuello uterino en mujeres mayores de 18 años: La tasa de incidencia de cáncer de mama y cuello uterino en mujeres mayores de 18 años para el primer trimestre del año 2022 es de 15,1 por cien mil habitantes teniendo en cuenta que la población de mujeres mayor de 18 años en las localidades de la Subred Integrada de Servicio de Salud Sur Occidente es de 985.734, dato obtenido de la Secretaría de Planeación 2005 - 2035.




Figura 41. Distribución de casos de cáncer de cuello uterino y oportunidad en el diagnóstico en el primer trimestre de 2022. Bases Distritales SIVIGILA, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

Se observa en la distribución de los casos de cáncer de cuello uterino con mayor prevalencia en las UPZ De Fontibón Central; Kennedy central y Bosa central; si bien en las UPZ se presenta una oportunidad alta, dicha oportunidad también es prevalente en bosa occidental y en gran Britalia.

En cuanto a la oportunidad media es de mayor prevalencia en las UPZ Calandaima. Los casos notificados al SIVIGILA del evento cáncer de cuello uterino fueron 149 durante el primer trimestre del año 2022, todos los eventos notificados son morbilidades y no se evidencian eventos notificados por mortalidad durante este período.

## 9. Vigilancia Epidemiológica en Salud Oral SISVESO

La Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral (SISVESO), es una estrategia de vigilancia centinela mediante el análisis epidemiológico de la información captada, evidenciando la situación de salud oral del Distrito identificando los factores de riesgo de la población, mediante la generación de alertas epidemiológicas en salud oral. Permitiendo así la intervención oportuna y seguimiento efectivo por parte de los actores que participan en la atención y mantenimiento de las condiciones de salud de la población. De la misma manera, así como generar insumos para el desarrollo de acciones preventivas y de control de los factores de riesgo identificados; no solo desde el componente oral, sino que trascienda la salud como un proceso de vida de los individuos. (1).




Figura 42. Distribución del porcentaje de Notificación por Sexo. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema SISVESO Primer Trimestre – 2022.

Para lo anterior se identifican que el 45% (n = 670) son hombres y el 55% (n = 830) son mujeres (figura 1). El Subsistema de Vigilancia epidemiológica en salud oral en la Subred Sur Occidente está conformado por 40 UPGDS, en el primer trimestre 2022, se capta un total de 1340 notificaciones de usuarios pertenecientes a las 4 localidades por lugar de residencia, sin embargo, se llega a obtener un total de 1.500 personas de la notificación general del Distrito.

Tabla 28. Distribución de eventos de notificación del SISVESO por localidad, Primer trimestre de 2022.

LOCALIDAD	GINGIVITIS		PERIODONTITIS		CARIES CAVITACIONAL		LMB		LMC		FLUOROSIS		TOTAL		TOTAL, DE POBLACIÓN NOTIFICADA	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Bosa	360	64,1	13	2,3	352	62,6	57	10,1	74	13,2	376	6,8	593	562	37,5	
Kennedy	387	66,2	13	2,2	372	63,6	34	5,8	57	9,7	183	3,1	881	58,7	39,0	
Fontibón	172	77,8	3	1,4	137	62,0	18	8,1	43	19,5	200	9,3	263	221	14,7	
Puente Aranda	87	65,9	5	3,8	87	65,9	6	4,5	17	12,9	33	2,3	205	132	8,8	
<b>TOTAL</b>	<b>1006</b>	<b>67,1</b>	<b>34</b>	<b>2,3</b>	<b>948</b>	<b>63,2</b>	<b>115</b>	<b>7,7</b>	<b>191</b>	<b>12,7</b>	<b>785</b>	<b>5,2</b>	<b>2372</b>	<b>1500</b>	<b>100,0</b>	

Fuente: Creado a partir de la base de datos distritales VC subsistema SISVESO enero – marzo 2022.

Al tener en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de interés en salud oral, se evidencia que el evento con mayor representatividad es la gingivitis con el 67% (n=1.006), seguido de la caries cavitacional el cual tiene el 63.2% (n=948) y en tercer lugar se encuentra el evento de Lesión Mancha Café con el 12.7% (n=191). Se detecta también que la localidad que más reporta eventos es Kennedy con el 39% (n=585), seguido de la localidad de Bosa con el 37.5% (n=562), en Fontibón se notifican el 14.7% (n=221) y finalmente Puente Aranda notifica 8.8% (n=132).

Tabla 29. Distribución de eventos de notificación del SISVESO por localidad y sexo, Primer trimestre de 2022.

LOCALIDAD	GINGIVITIS				PERIODONTITIS				CARIES CAVITACIONAL				LMB				LMC				FLUOROSIS					
	HOMBRE		MUJER		HOMBRE		MUJER		HOMBRE		MUJER		HOMBRE		MUJER		HOMBRE		MUJER		HOMBRE		MUJER			
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%		
Bosa	142	25,3	218	38,8	47	8,3	96	16,9	147	26,0	225	40,5	24	4,4	32	5,7	21	3,7	35	6,3	10	1,8	17	3,1	24	4,3
Kennedy	168	29,6	299	52,9	41	7,4	94	16,7	173	30,9	290	51,5	21	3,8	33	5,9	23	4,1	34	6,1	8	1,4	15	2,7	24	4,3
Fontibón	74	12,8	96	16,9	20	3,6	10	1,8	61	10,9	76	13,6	6	1,1	11	2,0	20	3,6	23	4,1	8	1,4	14	2,5	2	0,4
Puente Aranda	41	7,2	36	6,4	43	7,7	10	1,8	45	8,1	42	7,5	4	0,7	2	0,4	9	1,6	8	1,4	1	0,2	0	0,0	2	0,4

Fuente: Creado a partir de la base de datos distritales VC subsistema SISVESO enero – marzo 2022.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo y localidad se tiene que las mujeres presentan mayor prevalencia de presentar el evento de los eventos con un 57% (n=1.351) y los hombres un 43% (n=1.021), de esta población se identifica el evento más relevante sigue siendo la gingivitis, en la localidad de Kennedy con un 24.9% (n=219) y el 19% (n=168) en el sexo masculino, seguido de Fontibón el cual se identifica un porcentaje de 24.9% (n=98) en el sexo femenino y un 18.8% (n=74). Para el evento de periodontitis se tiene mayor prevalencia en las mujeres.

Tabla 30. Distribución de eventos de notificación del SISVESO por curso de vida y sexo, Primer trimestre de 2022.

CURSO DE VIDA	GINGIVITIS				PERIODONTIS				CARIES CAVITACIONAL				LMB				LMC				FLUOROSIS				TOTAL DE PERSONAS NOTIFICADAS.	
	MASCULINO		FEMENINO		MASCULINO		FEMENINO		MASCULINO		FEMENINO		MASCULINO		FEMENINO		MASCULINO		FEMENINO							
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%				
primera infancia	1000	18,6	591	10,0	0	0,0	0	0,0	1356	2,3	1081	1,8	244	4,5	917	1,3	233	4,3	221	4,1	102	1,2	102	0,2	537	31,7
infancia	1264	34,4	1252	31,2	0	0,0	0	0,0	1353	3,2	1334	3,3	144	3,5	185	4,5	237	5,7	292	7,2	120	3,0	345	4,0	401	23,6
adolescencia	378	10,8	550	14,0	0	0,0	0	0,0	182	4,8	388	10,3	52	1,3	83	2,1	34	0,8	91	2,3	72	1,8	64	1,6	220	13,0
juventud	633	17,8	1340	34,4	0	0,0	10	0,2	421	1,1	286	0,7	95	2,5	111	2,8	90	2,3	274	7,1	63	1,6	126	1,5	181	10,7
adulthood	532	14,2	1582	41,2	6	0,1	93	2,4	395	1,0	123	0,3	31	0,8	128	3,3	40	1,0	264	6,9	10	0,2	40	0,5	250	14,7
vejez	464	12,4	580	15,0	8	0,2	70	1,8	407	1,1	430	1,1	10	0,2	0	0,0	54	1,4	57	1,5	0	0,0	0	0,0	107	6,3
total	4251	11,3	5814	15,3	14	0,3	208	5,4	4261	11,3	5222	13,8	563	14,8	935	24,3	733	19,0	1780	46,6	510	13,3	300	7,8	1696	40,0

Fuente: Creado a partir de las bases de datos distritales VC subsistema SISVESO enero – marzo 2022.

Realizando un análisis de los eventos vigilados por el SISVESO, de 1696 personas notificadas se observa que: la mayor población en que se presenta uno o más eventos está en la primera infancia con el 31.7% (n=537), seguido de la infancia con el 23.6% (n=401) y en tercer lugar la adultez con el 14.7% (n=250). Teniendo así mayor prevalencia dentro del evento más representativo el sexo femenino con el 34.3% (n=581), y el sexo masculino con el 25% (n=425). Para el caso de la caries cavitacional con el segundo evento más prevalente se tiene que el sexo femenino tiene 30.8% (n=522) y el sexo masculino el 25% (n=426) se la infancia con el 71.6% (n=287).




Figura 43. Distribución de población captada con alerta en salud oral según curso de vida. Primer trimestre 2022. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema SISVESO

El SISVESO identifica también tres alertas definidas como alertas epidemiológicas de salud oral, en esta medida se evidencia que prevalece la alerta por sangrado gingival, presencia de cálculo o bolsa periodontal, teniendo mayor prevalencia en la infancia con 251 menores, seguido de adultez con 211 personas y en tercer lugar se encuentra Primera infancia con 159 menores de 5 años. En cuanto a la alerta de componente cariado se identifica de igual manera en la población de infancia con 193 menores de 13 años de edad, en segundo lugar, la primera infancia con 165 menores de 5 años, en tercer lugar, se encuentra el ciclo de vida adultez con 85 personas. En la alerta por componente perdido por caries, se evidencia un cambio a primer lugar a las personas que pertenecen al ciclo de la vejez con 74 personas mayores de 60 años de edad, seguido de la adultez con 63 personas entre las edades de 27 a 59 años de edad y en tercer lugar se encuentra la primera infancia con 32 menores de 5 años.

Lo anterior requiere la visibilizarían de manera urgente ante las alarmas a nivel distrital ya que se presentan en todas las etapas de curso de vida, con una tendencia a aumentar en los primeros años de vida a 2022, ello es preocupante debido a que la mayor población se encuentra en los menores de 0 a 13 años de edad abarcando la primera infancia y la infancia, generando posibles falencias en las acciones de promoción, prevención e intervención oportuna de la población infantil.




Figura 44. Distribución del porcentaje, población con estado de higiene oral primer trimestre 2022. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema SISVESO enero – marzo 2022.

En cuanto porcentaje por componente perdido por caries se evidencia con una mayor presencia en la población adulta y persona mayor, pero de igual manera que las otras alertas también se comienzan a evidenciar en la infancia y juventud, situación que confirma la generación de las alertas epidemiológicas en salud oral, con una población posiblemente en riesgo de deterioro de la salud oral y salud en general.

Así mismo se explica que la alerta por sangrado gingival es el estado de salud oral, inducido por la presencia de placa bacteriana; que resulta de la medición del índice de Silnes & Loe modificado, que establece el estado de higiene oral de la población, encontrando que de las (N=1.006) personas que presentaron la alerta, el 68.3% (n=687) presentó un estado de higiene oral deficiente, rango en el cual se detectó en más del 30% de superficies dentarias con presencia de placa bacteriana, ya sea blanda o dura (cálculos dentarios); el 24.9% (n=250) contaron con una higiene oral regular, donde se encontró placa bacteriana de un 15 a 30% de las superficies dentarias; y, tan solo un 6.9% (n=69) obtuvieron un resultado de bueno, con presencia de placa bacteriana en un rango menor al 15% en sus superficies dentarias. Esta situación es una alerta epidemiológica generada para los servicios de salud oral del distrito capital, ya que se presenta en todas las edades, siendo estas alertas prevenibles.

Tabla 31. Distribución de eventos de notificación del SISVESO por localidad y régimen de afiliación, primer trimestre de 2022.

RÉGI MEN DE AFILI ACIÓ N EN SALU D	KENNEDY				PUENTE ARANDA				BOSA				FONTIBÓN				TOTAL	
	MASCU LINO		FEME NINO		MASCU LINO		FEME NINO		MASCU LINO		FEMENIN O		MASUCULIN O		FEMENINO			
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Contributivo	203	13,5	229	15,3	42	2,8	51	3,4	168	11,2	189	12,6	69	4,6	93	6,2	1044	69,6
Subsidiado	62	4,1	87	5,8	19	1,3	18	1,2	75	5,0	126	8,4	24	1,6	31	2,1	442	29,5
Excepción	2	0,1	2	0,1	2	0,1	0	0,0	1	0,1	3	0,2	2	0,13	1	0,1	13	0,9
Particular	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,07	0	0,0	1	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>267</b>	<b>17,8</b>	<b>318</b>	<b>21,2</b>	<b>63</b>	<b>4,2</b>	<b>69</b>	<b>4,6</b>	<b>244</b>	<b>16,3</b>	<b>318</b>	<b>21,1</b>	<b>96</b>	<b>6,40</b>	<b>125</b>	<b>8,3</b>	<b>1500</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de las bases de datos distritales VC subsistema SISVESO enero – marzo 2022.

En cuanto al régimen de aseguramiento en salud, se devela que de (N=1500) personas notificadas; el 69.6% (n=1.044) pertenecen al régimen contributivo, seguido del régimen subsidiado con el 29.5% (n=442), en el tercer lugar se encuentra el régimen de excepción con el 0.9% (n=13) y por último con el 0.1% (n=1) persona que tuvo que pagar como particular en una UPGD.

Teniendo en cuenta el régimen de afiliación en este trimestre se identifica que la localidad de mayor presencia es Kennedy en el régimen contributivo con el 28.8% (n=432), seguido de Bosa con el 23.8% (n=357), en cuanto al régimen subsidiado se tiene la mayor población en la localidad de Bosa con el 13.4% (n=201) y en segundo lugar la localidad de Kennedy con el 9.9% (n=149).




Figura 45. Distribución del porcentaje de la población que presentan alerta en salud Oral. Primer trimestre 2022. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema SISVESO

Dentro del análisis de algunos determinantes sociales de salud, en este caso encontramos que, para el control de las condiciones adecuadas de la salud oral, la visita al odontólogo cada año resulta imprescindible, se considera una estrategia de control para la población y, sin embargo, también se realiza seguimiento de la norma establecida desde el Ministerio de Protección Social identificando las acciones por parte de las diferentes EAPB.

Por lo anterior se encuentra que, de (N=1500) Personas notificadas para este periodo, el 64.7% (n=971) asistieron una sola vez al odontólogo el año pasado; el 30.9% (n=463) informan que no acudieron al odontólogo el año pasado, y en el tercer lugar se encuentra el 4.4% (n=66) que acudieron tan solo dos veces en el año anterior, ajustándose con ello a lo recomendado y normado.




Figura 46. Distribución del Uso diario de elementos de higiene oral, primer trimestre 2022. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema –SISVESO

Se considera como determinante individual, el uso y frecuencia diaria, de los elementos de higiene oral, que nos habla acerca del auto cuidado y la apropiación de responsabilidades en cuanto a la salud oral por parte de la población; en este trimestre se encuentra que el enjuague bucal sigue siendo el elemento menos utilizado con el 86% (n=1.292), seguido de la seda dental con el 77% (n=1.157) y en tercer lugar se encuentra la no utilización de la crema dental con el 2.4% (n=36). Lo que sugiere un riesgo por la falta de utilizar, específicamente, un elemento creado para limpiar superficies dentarias consideradas de alto riesgo, como es el caso de la seda dental, donde el cepillo dental definitivamente no estaría actuando.

El índice ceo-d y COP-D se refieren a la experiencia de caries dental de los individuos presente y pasado lo cual se clasifica en un nivel de riesgo. El ceo-d en este caso se analizó en la dentición temporal y dentición mixta con mayoría de temporales de 0 a 8 años y el COP-D en población de 9 a mayores de 60 años. El nivel de riesgo se puede clasificar como se muestra a continuación:

Tabla 32. Clasificación del riesgo

<b>NIVEL DE RIESGO</b>
0,0-1,1 MUY BAJO
1,2-2,6 BAJO
2,7-4,4 MODERADO
4,5-6,5 ALTO
MAYOR A 6,6 MUY ALTO

El nivel de riesgo del ceo-d se evidencia en moderado por localidad, por sexo, curso de vida y aseguramiento, a excepción de la localidad de Puente Aranda que se encuentra en nivel de riesgo bajo concordante con el más bajo porcentaje de alerta por componente cariado, siendo la localidad de Kennedy, los hombres y régimen subsidiado los que tienen un poco más de riesgo. Para el COP-D se observa riesgo muy alto en la localidad de Puente Aranda, en las mujeres, en los cursos de vida adultez y vejez y en el régimen subsidiado, y se evidencia riesgo alto en las otras 3 localidades, en los hombres, en el curso de vida juventud y en el régimen contributivo. Esto sugiere la presencia de alta prevalencia y experiencia de caries en la población.

Por otro lado, se realiza el análisis de la Población control, en el cual hace referencia a los usuarios que asisten a los servicios 6 meses o más tiempo después de su primera visita al odontólogo. Por consiguiente, para este trimestre se captan 159 personas con mayor presencia en la Localidad de Bosa con el 32% (n=51), seguido de la localidad de Fontibón 30.2% (n=48), en Kennedy se capta el 24.5% (n=39), y finalmente en Puente Aranda se obtiene el 13.2% (n=21).

#### 9.1. Población con y sin respuesta

Dentro de la población seleccionada para análisis de respuesta o no respuesta desde los servicios de salud se puede evidenciar que en el 93% de los usuarios no han tenido respuesta resaltando que es igualmente responsabilidad de los usuarios mantener y mejorar también su salud oral. Sin embargo, no se evidencia demanda inducida por parte de las EAPB, por lo que en el análisis se considera desde la perspectiva verificada la no respuesta de la salud hacia la población.

### **10. Vigilancia en Salud Pública de la Discapacidad**

#### 10.1. Seguimiento a Personas con Discapacidad (PCD) Positivas por COVID- 19

Durante el trimestre enero – marzo 2022 se identificaron 993 personas con discapacidad con resultado positivo para COVID-19, de acuerdo al cruce de base de datos del Consolidado Distrital del RLCPD (Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad), base de resultados COVID-19 y

SIVIGILA. De las cuales el 96,3% (n=956) corresponde a casos leves los cuales se encuentran y domicilio y el 3,7% (n=37) estado fallecido.




Figura 47. Número de Casos de PCD Positivas por COVID-19 según localidad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19

La localidad donde se ha presentado el mayor número de casos es Kennedy con 40,7% (n=404), seguida de la localidad de Bosa con un 21,6% (n=214), Fontibón con un 20,7% (n=206) y Puente Aranda con un 17% (n=169).




Figura 48. Tasa de Prevalencia por COVID-19 en PCD según localidad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022 Base de seguimiento PCD COVID-19.

Las localidades con mayor tasa de prevalencia por COVID-19 en Personas con discapacidad son Puente Aranda con un porcentaje de 0,07%, seguida de la localidad de Fontibón con un 0,05%.




Figura 49. Variación en la identificación de Personas con Discapacidad Positivas por COVID-19, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022 Base de seguimiento PCD COVID-19.

Durante los meses de enero y febrero se identificó un mayor número de casos con un porcentaje del 49% (n=487) y 46,9% (n=466) respectivamente, para el mes de marzo se presentó una disminución en la caracterización de casos con un 4% (n=40), relacionado con la adherencia a los protocolos de autocuidado y el esquema de vacunación.




Figura 50. Número de Personas con Discapacidad Positivas COVID-19, según sexo y curso de vida, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19

De los casos registrados el 61,3% (n=609) son mujeres y el 38,7% (n=384) hombres, comparado con el trimestre anterior se continúa presentando un mayor número de mujeres con discapacidad positivas por COVID-19. El mayor número de personas con discapacidad positivas pertenecen al curso de vida vejez con un 56,4% (n=560), seguido del curso de vida adultez con un 34,5% (n=343), juventud

4,6% (n=46), adolescencia 2,7% (n=27), infancia 1,4% (n=14) y primera infancia con un 0,3% (n=3).

De acuerdo al tipo o fuente de contagio el 74,2% (n=737) es desconocida seguida del 25,8% (n=256) que corresponde a conglomerados sin dato del lugar de ubicación.

Tabla 33. Porcentaje de Personas con Discapacidad Positivas por COVID-19 según Régimen de Afiliación en Salud, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022

<b>REGIMEN EN SALUD</b>	<b>No. CASOS</b>	<b>%</b>
Contributivo	792	79,8
Subsidiado	118	11,9
Especial	72	7,3
Vinculado	3	0,3
Sin Aseguramiento	4	0,4
Sin Dato	4	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>993</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de la base de seguimiento PCD COVID-19, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero – marzo 2022

Teniendo en cuenta el régimen de aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 79,8% (n=792) corresponde al régimen contributivo, seguido del régimen subsidiado con un 11,9% (n=118).

Tabla 34. Porcentaje de Personas con Discapacidad positivas por COVID-19 según alteración, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022

ALTERACIÓN	No. CASOS	%
El movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas	352	35,4
Sistema cardio respiratorio	227	22,9
Sistema nervioso	160	16,1
La digestión, metabolismo y hormonas	96	9,7
Los ojos	69	6,9
Sistema genital, urinario y reproductivo	41	4,1
Los oídos	38	3,8
La voz y el habla	7	0,7
La piel, las uñas, el cabello	2	0,2
Olfato, tacto, gusto	1	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>993</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de la base de seguimiento PCD COVID-19, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero – marzo 2022

De acuerdo a la alteración presentada con mayor frecuencia el 35,4% (n=352) corresponde al movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; seguida del 22,9% (n=227) sistema cardio respiratorio alteración presentada con mayor frecuencia en el curso de vida vejez y el 16,1% (n=160) sistema nervioso.

#### 10.2. Seguimiento a Cuidadores de Personas con Discapacidad Positivas por COVID-19 en Alta dependencia

El 23,7% (n=235) de las personas con discapacidad positivas identificadas durante el trimestre enero -marzo 2022, requieren ayuda permanente. El 52,8% (n=124) son mujeres y el 47,2 (n=111) hombres.

Tabla 35. Caracterización de Personas con Discapacidad Positivas por COVID-19 en alta dependencia, según localidad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022

LOCALIDAD	No. CUIDADORES	%
KENNEDY	15	39,5
FONTIBON	8	21,1
PUENTE ARANDA	8	21,1
BOSA	7	18,4
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de la base de seguimiento PCD COVID-19, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero – marzo 2022

Se caracterizaron 38 cuidadores, de los cuales 18 se canalizaron a la Red de Cuidado Colectivo de la RBC para intervención, ya que se encuentran en alerta por sobrecarga en áreas como: salud física, salud mental, salud psicosocial y síntomas en la PCD que cuida.

El 39,5% (n=15) de los cuidadores caracterizados reside en la localidad de Kennedy, seguido del 21,1% (n=8) que residen en las localidades de Fontibón y Puente Aranda respectivamente.




Figura 51. Número de Cuidadores de PCD Positivas por COVID-19 en Alta Dependencia, según sexo y curso de vida, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19

De los cuidadores caracterizados el 86,8% (n=33) son mujeres y el 13,2% (n=5) hombres. Con parentesco de madre (n=19), esposa (n=7), hija (n=6), padre (n=3), abuela, hijo y esposo (n=1) respectivamente.

El 68,4% (n=26) pertenece al curso de vida adultez, seguido del 28,9% (n=11) curso de vida vejez.

El 84,2% (n=32) de los cuidadores pertenecen al régimen contributivo en salud, seguido del 13,2% (n=5) régimen especial y el 2,6% (n=1) régimen subsidiado. El 10,5% (n=4) de los cuidadores caracterizados presentan comorbilidades como hipertensión arterial (n=3) y diabetes mellitus (n=1).




Figura 52. Porcentaje de Cuidadores de PCD Positivas por COVID-19 en Alta Dependencia, según tiempo de dedicación, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19.

De acuerdo al tiempo que dedica el cuidador hacia la persona con discapacidad el 63,2% (n=24) dedica entre 13 y 24 horas, seguido del 15,8% (n=6) hasta 12 horas, el 13,2% (n=5) hasta 8 horas y el 7,9% (n=3) hasta 4 horas.

De acuerdo al cruce de bases de datos de Cuidadores de personas con discapacidad positivos COVID-19 en alta dependencia y base de resultados COVID-19, el 13,2% (n= 5) presentaron resultado positivo.

### 10.3. Seguimiento a Cohortes de Eventos Congénitos




Figura 53. Porcentaje de Seguimiento a Cohortes, según tipo de defecto congénito, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD

Durante el trimestre enero – marzo 2022 se realizó seguimiento del desarrollo psicomotor a 48 usuarios con edades de 1 a 5 años, notificados por el evento 215 – Defectos Congénitos. El 45,8% (n=22) presentan malformaciones congénitas, seguido del 41,7% (n=20) con hipotiroidismo congénito y el 12,5% (n=6) síndrome de Down.




Figura 54. Porcentaje de Seguimiento a Cohortes Eventos Congénitos, según localidad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD.

De acuerdo a la localidad de residencia el mayor número de casos se concentra en la localidad de Kennedy con un 39,6% (n=19), seguido de la localidad de Bosa con un 35,4% (n=17), Puente Aranda con un 14,6% (n=7) y Fontibón con un 10,4% (n=5).

De los seguimientos realizados el 50% (n=24) son niñas y niños respetivamente, los cuales pertenecen al curso de vida infancia.




Figura 55. Porcentaje de Seguimiento a Cohortes Eventos Congénitos, según régimen de afiliación en salud, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD, enero - marzo 2022

El 75% (n=36) de los menores se encuentran afiliados al régimen contributivo en salud, seguido del 16,7% (n=8) régimen subsidiado y 8,3% (n=4) régimen especial. Durante el seguimiento realizado los cuidadores refirieron presentar barreras con el servicio de salud relacionadas con la asignación y autorización de citas médicas con especialistas.

#### 10.4. Cohorte Malformaciones Congénitas – Evento 215 Defectos Congénitos




Figura 56. Número de casos de Seguimiento a Cohorte Malformaciones Congénitas, según sexo y edad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD

Durante el trimestre en mención se realizaron 22 seguimientos, de los cuales el 54,5% (n=12) son niñas y el 45,5% (n=10) niños.

El 36,4 % (n=8) en edad de 2 años, 31,8% (n=7) edad de 5 años, 18,2% (n=4) 3 años, 9,1% (n=2) 4 años y 4,5% (n=1) edad de 1 año.

De acuerdo a lo referido por los cuidadores, el 18,2% (n=4) de los menores presentan discapacidad, con alteraciones para caminar, correr, saltar, masticar, tragar, hablar, comunicarse, pensar y memorizar. Solamente 1 menor se encuentra recibiendo terapias de fonoaudiología, ocupacional y fisioterapia, los demás menores presentan barreras relacionadas con la entrega de orden y/o autorización para rehabilitación.

#### 10.5. Cohorte Hipotiroidismo Congénito – Evento 215 Defectos Congénitos




Figura 57. Número de casos de Seguimiento a Cohorte Hipotiroidismo Congénito, según sexo y edad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD.

Durante el trimestre en mención se realizaron 20 seguimientos, de los cuales el 50% (n=10) son niñas y niños respectivamente.

El 50 % (n=10) en edad de 1 año, 20% (n=4) edades de 2 y 5 años respectivamente y 5% (n=1) edades de 3 y 4 años respectivamente.

De acuerdo a lo referido por los cuidadores, el 5% (n=1) presenta discapacidad, con alteraciones para hablar, comunicarse, pensar y memorizar. El menor se encuentra recibiendo terapias de fonoaudiología, ocupacional y psicología.

Los cuidadores refirieron barreras en salud relacionadas con demora en la asignación de cita por endocrinología y orden de laboratorio para control de tiroides.

## 10.6. Cohorte Síndrome de Down – Evento 215 Defectos Congénitos




Figura 58. Número de casos de Seguimiento a Cohorte Síndrome de Down, según sexo y edad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD

Durante el trimestre en mención se realizaron 6 seguimientos, de los cuales el 66,7% (n=4) son niños y el 33,3% (n=2) niñas.

El 50 % (n=3) en edad de 3 años y el 16,7% (n=1) edades de 2, 4 y 5 años respectivamente.

De acuerdo a lo referido por los cuidadores, el 83,3% (n=5) de los menores presentan discapacidad, con alteraciones para caminar, correr, saltar, hablar, comunicarse, pensar, memorizar, alimentarse por sí mismo y retener la orina. Los cuales se encuentran recibiendo terapias de fonoaudiología, ocupacional, fisioterapia y psicología.




Figura 59. Distribución de cuidadores de personas con discapacidad por sexo y por tipo de riesgo por sobrecarga en primer trimestre de 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero – marzo 2022

El 86,8% de los cuidadores son mujeres con un 86,8% y el 13,2% son hombres. De acuerdo a la caracterización realizada el mayor número de cuidadores con alerta por sobrecarga en dos o más áreas (salud física, salud mental, salud psicosocial y/o síntomas de la PCC que cuida) residen en la localidad de Fontibón en las UPZ Fontibón San Pablo, Capellanía y Modelia. Localidad de Puente Aranda UPZ Ciudad Montes y Bosa UPZ Bosa Central. En la localidad de Kennedy los cuidadores caracterizados presentaron en su mayoría riesgo bajo y medio en las áreas evaluadas.

## CAPITULO 6: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LOS EVENTOS DE SALUD MATERNO INFANTIL -SMI- Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-SSR-

### 11. Mortalidad Materna

La mortalidad materna es una situación alarmante en los territorios en los que se presenta, ya que está directamente relacionada con la atención en salud, situación que involucra los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, nos da un indicador sobre la calidad de los servicios de salud y la accesibilidad a la misma. La Organización Mundial de la Salud la define como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”.

Tabla 36. Casos y razón de Mortalidad Materna, primer trimestre (enero – marzo) de 2022.

INDICADOR	META	ENERO DE 2022		INCIDENCIA	FEBRERO DE 2022		INCIDENCIA	MARZO DE 2022		INCIDENCIA
		NUMERADOR	DENOMINADOR		NUMERADOR	DENOMINADOR		NUMERADOR	DENOMINADOR	
Razón de Mortalidad Materna	Disminuir la Razón de MM a 45 por cada 100.000 NV	1	1689	59,2	2	1424	140,4	0	1704	0

Fuente: Creado a partir de Bases SIVIGILA Local evento 551 SE 13, y base Nacidos Vivos y defunciónresidencia RUAF 2022. Datos Preliminares

### 12. Morbilidad Materna Extrema

La morbilidad materna extrema (MME) es un evento de interés en salud pública, que requiere especial atención, debido a que, si no se brinda una atención en salud adecuada, puede traer consecuencias fatales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la morbilidad materna extrema (MME) como “un estado en el cual una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo”. La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) la definió como “una complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer o requiere una atención inmediata con el fin de evitar la muerte” (1-2).

Tabla 37. Casos de Morbilidad Materna Extrema según las 8 causas principales agrupadas

CAUSAS AGRUPADAS DE MME	ENERO DEL 2022		FEBRERO DEL 2022		MARZO DEL 2022	
	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%
Trastorno hipertensivo	26	53	33	68.75	42	70
Complicaciones Hemorrágicas	11	22.44	8	16.66	12	20
Complicaciones de Aborto	3	6.12	1	2	4	6.66
Sepsis de Origen Obstétrico	7	14.28	4	8.33	2	3.33
Sepsis de Origen No Obstétrico	1	2	0	0	0	0
Sepsis de Origen Pulmonar	0	0	1	2	0	0
Enfermedad preexistente que se complica	0	0	0	0	0	0
Otras causas	1	2	1	2	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de Bases SIVIGILA local evento 549, I Trimestre 2022. Datos Preliminares.

Con relación a lo registrado en la tabla 30, entre las causas agrupadas en la Morbilidad Materna Extrema, la mayor frecuencia la componen los trastornos hipertensivos y en segunda instancia se encuentran las complicaciones hemorrágicas.

### 13. Mortalidad Perinatal y Neonatal

La Mortalidad Neonatal y Perinatal, son eventos de interés en salud pública, que nos dan a conocer la importancia que tienen la implementación y ejecución de la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal. Según la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima versión (CIE 10) la mortalidad perinatal se refiere a “las mortalidades que ocurren desde las 22 semanas completas (154 días después de la gestación) y termina siete días después del nacimiento. La mortalidad neonatal hace referencia a los nacidos vivos que fallecen durante los primeros 28 días de vida (1)”. “Estas muertes son consideradas indicadores universales tanto de condiciones de vida y desarrollo humano, como de la calidad y acceso a los servicios de salud” (2).

Tabla 38. Casos y tasas de Mortalidad Perinatal. I trimestre de 2022

INDICADOR	ENERO DE 2022		INCIDENCIA	FEBRERO DE 2022		INCIDENCIA	MARZO DE 2022		INCIDENCIA
	Numer.	Denom.		Numer.	Denom.		Numer.	Denom.	
Razón de muertes perinatal y neonatal tardía	18	1689	10.6	22	1424	15.4	17	1704	10

Fuente: Creado a partir de base Nacimientos y defunciones RUAF, I trimestre de 2022. Datos Preliminares.

Para el primer trimestre del 2022, en el mes de febrero se observa un aumento significativo de casos notificados. Con respecto al régimen de afiliación el 53% pertenecen al régimen contributivo, el 32% al régimen subsidiado y 12% no se encontraba asegurado. El 60% corresponde a muertes fetales y el 40 % a muertes no fetales.

### 16. Transmisión Materno Perinatal VIH y HB

Para el primer trimestre del año 2022, no se notificaron casos asociados a trasmisión materna infantil de hepatitis B. Se registran 7 gestantes notificadas, 1 en el mes de enero, 2 en el mes de febrero y 4 en el mes de marzo.

Para el primer trimestre de este año a través del SIVIGILA se ha notificado una gestante con VIH residentes en el mes de marzo.

### 13. Sífilis Gestacional y Congénita

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) y constituye un importante problema de salud pública en todo el mundo, que afecta la calidad de vida y se acompaña de importantes niveles de morbilidad y mortalidad (1)

Tabla 39. Casos y Razón de Sífilis gestacional, I trimestre de 2022

NOMBRE DEL INDICADOR	ENERO DE 2022		PREVALENCIA	FEBRERO DE 2022		PREVALENCIA	MARZO DE 2022		PREVALENCIA
	Numrador	Denominador		Numrador	Denominador		Numrador	Denominador	
Razón de Prevalencia de Sífilis Gestacional	23	1707	13	26	1446	18	23	1720	13,3

Fuente: Creado a partir de base SIVIGILA residentes evento 750 y Base Nacimientos RUAF, I trimestre de 2022. Datos Preliminares.

De acuerdo a la tabla (32) se puede observar que en el trimestre la prevalencia más alta se presentó en el mes de febrero, donde por cada 1000 nacidos se presentaron 18 casos de sífilis en gestantes.

Respecto a la localidad de residencia, el 41.6 % vive en la localidad de Kennedy, el 36% en la localidad de Bosa, el 12.5% en la localidad de Fontibón y el 7% en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo al aseguramiento se encuentra que 51 de las usuarias notificadas estaban afiliada a algún tipo de afiliación en salud y 21 usuarias no contaban con afiliación en salud. El 41.6% de las usuarias reportadas son migrantes.

Tabla 40. Casos y Prevalencia de Sífilis Congénita. I trimestre de 2022

NOMBRE DEL INDICADOR	ENERO DE 2022		PREVALENCIA	FEBRERO DE 2022		PREVALENCIA	MA
	Numerador	Denominador		Numerador	Denominador		
Proporción de casos de sífilis congénita cuyas madres fueron notificadas como sífilis gestacional	4	4	100	0	0	0	3

Fuente: Creado a partir de base SIVIGILA residentes evento 740. Datos Preliminares.

De acuerdo a la tabla anterior, el 100% de las madres de los casos notificados como sífilis congénita fueron notificadas como sífilis gestacional.

#### **14. Mortalidad Perinatal Relacionada con Sífilis Congénita.**

Para el primer trimestre del presente año, se han notificado 2 mortalidades perinatales asociadas a sífilis congénita, residentes en la localidad de Kennedy. Los dos casos pertenecen a mujeres migrantes, una no contaba con afiliación en salud y un segundo caso afiliada a Capital Salud EPS.

## 15. Defectos congénitos.

En el periodo analizado, se encontró que realizó notificación del evento 215, para el periodo con un total de 84 casos, de los cuales 10 corresponden al diagnóstico de Microcefalia, en etapa posnatal, 5 eventos residen en la Subred Sur Occidente, 3 en la localidad de Kennedy, y uno en la localidad de Bosa y Fontibón.

## CAPITULO 7: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE EVENTOS PRIORITARIOS EN SALUD MENTAL

### 16. Subsistema SISVECOS

En el presente boletín se realiza un análisis del comportamiento de la conducta suicida del primer trimestre del año 2022, en donde se notificaron un total de 2422 casos de conducta suicida residentes en las localidades de la Subred Sur Occidente, de los cuales el 66,1% (n=1612) está representado por mujeres y el 33,9% (n=820) por hombres.

Se presenta una mayor concentración de eventos de conducta suicida en la localidad Kennedy con el 41,9% (n=1016), seguido de Bosa con el 32,0% (n=776), en orden descendente localidad Fontibón con el 15,6% (n=379) y Puente Aranda 10,4% (n=251). Se concentran en mayor proporción los eventos notificados en las UPZ 84 - Bosa Central con el 10,5% (n=254) y UPZ 85 - Bosa Occidental con el 9,2% (n=222), UPZ 86 - El porvenir con 7.7% (n= 186), seguido de la localidad Kennedy en la UPZ 46 - Castilla con el 5,7% (n=137) y UPZ 48 - Timiza con el 5,4% (n=131).

Tabla 41. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por localidad, upz, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente.

Por el tamaño de la tabla, se integra a los anexos, Ver anexo 1

Respecto a la distribución de los eventos de conducta suicida, prevalece la ideación suicida con el 73,0% (n=1767) de eventos notificados, seguido de los intentos de suicidio con el 21,3% (n=515), amenaza suicida con el 4,4% (n=106) y Suicidio consumado con el 1,4%(n=34). La localidad con mayor número de eventos de ideación suicida es Kennedy con el 41,1% (727) y Bosa con el 32,1% (n=567), seguido de la localidad Fontibón con 16,1 (n= 285) y Puente Aranda con el 10,6% (n=188).

Frente a los eventos de intento de suicidio, prevalece de igual manera la localidad de Kennedy con el 45,0% (n=232) eventos notificados, seguido de Bosa con él con

el 31,1% (n=161), seguido de la localidad Fontibón con 14,0 (n= 72) y Puente Aranda con el 9,7% (n=50).

La localidad con mayor número de suicidios es la localidad de Kennedy con el 41,2% (n=14) de eventos, seguido de Bosa con el 32,4% (n=11) y Fontibón con el 26,5% (n=9). No se presentaron suicidios en la localidad Puente Aranda.

Por otra parte, dentro del análisis de variables tipo étnico se pudo establecer que el 99% (n=2403) no pertenecen a ninguna etnia, sin embargo, se mantiene un registro inferior al 1% para tipo de minorías étnicas (afrocolombiano, mulato, palenquero, indígena, Rom).

Tabla 42. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por localidad, pertenecía étnica, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente.

PERTENENCIA ÉTNICA	IDEACIÓN SUICIDA			AMENAZA SUICIDA			INTENTO SUICIDIO			SUICIDIO CONSUMADO			TOTAL	FR	%
	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL			
Otros	578	1173	1751	45	60	105	171	343	514	23	10	33	2403	1,0	99,2
Afrocolombianos	2	6	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	0,0	0,4
Mulato	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	0,0	0,2
Palenquero	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,0	0,1
ROM	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0
Indígena	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0,0	0,0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>580</b>	<b>1187</b>	<b>1767</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>106</b>	<b>171</b>	<b>344</b>	<b>515</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>2422</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SISVECOS, Enero – marzo 2022

Con respecto al grupo poblacional se identifica que el 95,7% (n=2317) corresponde a otros grupos poblacionales, seguido de población migrante con el 1,5% (37), discapacidad con el 1,0% (n=24), en orden descendente desplazados 0,6% (n=14), gestantes 0,4% (n=10), Psiquiátricos 0,2% (n=6), Icbf 0,2% (n=5), Victima Violencia 0,2% (n=04), Indigente 0,1% (n=3), y Madre comunitaria 0,1% (n=2).

Tabla 43. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por grupo poblacional, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente.

GRUPO POBLACIONAL	IDEACIÓN SUICIDA			AMENAZA SUICIDA			INTENTO SUICIDIO			SUICIDIO CONSUMADO			TOTAL	Fr	%
	H	M	To	H	M	To.	H	M	To	H	M	To.			
Otros	554	1132	1686	42	60	102	165	331	496	23	10	33	2317	10	95.7
Migrante	10	18	28	3	0	3	0	5	5	1	0	1	37	0	1.5
Discapacidad	8	9	17	0	0	0	3	4	7	0	0	0	24	0	1.0
Desplazado	2	9	11	0	1	1	1	1	2	0	0	0	14	0	0.6
Gestante	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	10	0	0.4
Psiquiátricos	1	3	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	6	0	0.2
Icbf	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.2
Victima Violencia	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0.2
Indigente	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0.1
Madre Comu.	0	2	2	0	0	0	0	0		0	0	0	2	0	0.1
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>580</b>	<b>1187</b>	<b>1767</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>106</b>	<b>171</b>	<b>344</b>	<b>515</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>2422</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SISVECOS, Enero – marzo 2022

Frente al comportamiento de la notificación de eventos de conducta suicida, respecto al aseguramiento se evidencio que los usuarios notificados al subsistema, se encuentra que el régimen contributivo representa el 75,4% (n=1825), seguido del régimen subsidiado con el 17,8% (n=431); población no asegurada (vinculada) ocupa el tercer lugar con el 3,1% (n=76), Excepción con el 2,4% (n=59), Particular 0,8% (n=20), Régimen Especial con el 0,3% (n=7) y Medicina Prepagada corresponde al 0,2% (n=4).

Tabla 44. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por régimen de aseguramiento, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente.

TIPO ASEGURAMIENTO	IDEACIÓN SUICIDA			AMENAZA SUICIDA			INTENTO SUICIDIO			SUICIDIO CONSUMADO			TOTAL	FR	%
	H	M	To.	H	M	To.	H	M	To.	H	M	To.			
Contributivo	430	889	1319	32	44	76	135	270	405	16	9	25	1825	0.8	75.4
Subsidiado	98	221	319	8	16	24	31	55	86	2	0	2	431	0.2	17.8
Vinculado	22	33	55	2	0	2	3	12	15	3	1	4	76	0.0	3.1
Excepción	22	27	49	0	1	1	1	6	7	2	0	2	59	0.0	2.4
Particular	4	11	15	2	0	2	1	1	2	1	0	1	20	0.0	0.8
Régimen Esp.	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	0.3
Medicina Pre.	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0.0	0.2
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>580</b>	<b>1187</b>	<b>1767</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>106</b>	<b>171</b>	<b>344</b>	<b>515</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>2422</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SISVECOS, Enero – marzo 2022

En cuanto a lo referente a los cursos de vida notificado en mayor proporción, corresponde a la adolescencia con 35,9% (n=870) predominando la ideación suicida con el 76,4% (n=665), intento de suicidio con el 19,0% (n=165), Amenaza suicida con el 4,4% (n=38) y eventos de suicidio 0,2% (n=2), siendo 70,5% (n=613) del sexo mujer, en relación a hombres 29,5% (n=257) en un segundo lugar se ubica curso de vida Juventud con el 32,0% (n=774), predominando eventos de ideación suicida con el 66,9% (n=518), intento de suicidio con el 26,4% (n=204), amenaza suicida con el 4,3% (n=33) y suicidio con el 2,5% (n=19), siendo 66,8% (n=517) del sexo mujer, en relación a hombres 33,2% (n=257). En tercer lugar se ubica el curso de vida adultez con el 22,8% (n=553), predominando eventos de ideación suicida con el 73,7% (n=393), intento de suicidio con el 23,3% (n=124), amenaza suicida con el 4,5% (n=24) y suicidio con el 2,3% (n=12), siendo 62,9% (n=348) del sexo mujer, en relación a hombres 37,1% (n=205), en orden descendente de ubica infancia con el 6,5% (n=157), siendo 57,3% (n=90) del sexo mujer, en relación a hombres con el 42,7% (n=67), Vejez con el 2,6% (n=63), siendo 50,8% (n=32) del sexo mujer, en relación a hombres 49,2% (n=31), y Primera infancia con el 0,2% (n=5), en donde el 40,0% (n=3) del sexo hombre, en relación a mujeres 40,0% (n=2).

Tabla 45. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por curso de vida, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente.

CURSO DE VIDA	IDEACIÓN SUICIDA			AMENAZA SUICIDA			INTENTO SUICIDIO			SUICIDIO CONSUMADO			TOTAL	FR	%
	H	M	TO.	H	M	TO.	H	M	TO.	H	M	TO.			
Adolescencia	199	466	665	16	22	38	41	124	165	1	1	2	870	0.4	35.9
Juventud	164	354	518	10	23	33	70	134	204	13	6	19	774	0.3	32.0
Adultez	132	261	393	12	12	24	52	72	124	9	3	12	553	0.2	22.8
Infancia	60	73	133	4	4	8	3	13	16	0	0	0	157	0.1	6.5
Vejez	22	31	53	3	0	3	5	1	6	1	0	1	63	0.0	2.6
Primera Inf.	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	0.2
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>580</b>	<b>1187</b>	<b>1767</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>106</b>	<b>171</b>	<b>344</b>	<b>515</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>2422</b>	<b>1.0</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SISVECOS, Enero – marzo 2022

Los mecanismos más utilizados en los intentos de suicidio son las intoxicaciones con representación del 57,1% (n=294) seguido de elemento cortopunzante con un 23,1% (n=119), Ahorcamiento o asfixia con el 9,1% (n=47), Lanzamiento al vacío con el 6,4% (n=33), Lanzamiento a vehículo con el 3,1% (n=16), Arma de fuego 1,0% (n=5) e inmolación con el 0,2% (n=01). El 2,9% (n=15) de eventos notificados presentan más de un mecanismo para el evento de intento de suicidio.

Tabla 46. Eventos de intento de suicidio, distribuidos por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente.

MECANISMO	INTENTO DE SUICIDIO		TOTAL	FR	%
	HOMBRE	MUJER			
Intoxicación	92	202	294	0.6	57.1
Elemento Corto punzante	41	78	119	0.2	23.1
Ahorcamiento o Asfixia	15	32	47	0.1	9.1
Lanzamiento al Vacío	13	20	33	0.1	6.4
Lanzamiento a Vehículo	8	8	16	0.0	3.1
Arma de Fuego	2	3	5	0.0	1.0
Inmolación	0	1	1	0.0	0.2
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>171</b>	<b>344</b>	<b>515</b>	<b>1.0</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SISVECOS, Enero – marzo 2022

Frente al principal escenario para los eventos de amenaza suicida e intento de suicidio se identifica que no se cuenta con información de escenario del 49,9% (n=310), seguidos del hogar en un 48,6% (n=302), el lugar de trabajo corresponde, la vía pública, los establecimientos del trabajo, los establecimientos militares y otros corresponden al 1,4% (n=9).

En los intentos de suicidio se asocian que los eventos se presentan en el hogar principalmente, porque la persona tiene elementos de uso cotidiano como lo son los medicamentos y sustancias químicas (Varsol, baygon entro otros), elementos cortopunzantes lo que facilita a la persona realiza esa acción dentro de ese espacio.

Tabla 47. Eventos de intento de suicidio y amenaza, distribuidos por escenario, frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente.

ESCENARIO	AMENAZA SUICIDA	INTENTO SUICIDIO	TOTAL	FR	%
Sin Dato	97	213	310	0.5	49.9
Hogar	8	294	302	0.5	48.6
Lugar de trabajo	0	3	3	0.0	0.5
Vía pública / parque	0	2	2	0.0	0.3
Establecimiento de comercio	0	2	2	0.0	0.3
Establecimiento militar	0	1	1	0.0	0.2
Otro	1	0	1	0.0	0.2
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>106</b>	<b>515</b>	<b>621</b>	<b>1.0</b>	<b>99.0</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SISVECOS, Enero – marzo 2022

## 17. Subsistema SIVIM

Durante el primer trimestre del año 2022, se notificaron un total de 2724 eventos al subsistema SIVIM por residencia, se registraron 1169 intervenciones de campo efectivas para el subsistema SIVIM, para las cuales se logra realizar proceso de valoración de la situación de violencia, evaluación de factores de riesgo y definición de plan de intervención familiar y activación de ruta correspondiente, encontrando como principal factor de prevalencia la violencia generada hacia las mujeres en mayor proporción que en los hombres con un porcentaje del 76% del total de casos registrados (n=2064).

En la siguiente tabla se evidencia los eventos trazadores para le SIVIM, donde se evidencia que la localidad de mayor impacto es la de Kennedy con el 44% (n=1216), seguido de Bosa con el 35,7% (n=987); de las violencias trazadoras se evidencia que la violencia sexual es la que mayormente cuenta con notificación con 1081 eventos notificados que representan al 39%.

Tabla 48. Violencias trazadoras para el SIVIM en casos efectivos distribuidos por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero - marzo 2022.

LOCALIDAD	VIOLENCIA FISICA	VIOLENCIA EMOCIONAL	VIOLENCIA NEGLIGENCIA	TOTAL	FR	%
Bosa	315	365	307	987	0,4	35,7
Fontibón	120	133	69	322	0,1	11,6
Kennedy	397	495	324	1216	0,4	44,0
Puente Aranda	83	88	68	239	0,1	8,6
<b>TOTAL</b>	<b>915</b>	<b>1081</b>	<b>768</b>	<b>2764</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVIM, Enero – marzo 2022

Frente a la localidad adscritas a la Subred Sur Occidente se evidencia que la mayormente afectada es la localidad de Kennedy con el 44% (n=1208), seguida de Bosa con el 35% (n=948). De estas, como se puede ver en la tabla 45 sobresalen las UPZ de Bosa central con el 11,6% en Bosa, además de Fontibón centro con el 5,9%, Patio Bonito con el 7,5% y Ciudad Montes con el 3,3%, entre estas 4 UPZ que presentan mayor notificación se evidencia una frecuencia de 772 eventos; evidentemente en estas se ven reflejadas problemáticas socioeconómicas importantes, donde los estratos socioeconómicos predominantes son el 1 y 2.

Tabla 49. Distribución de casos según localidad y UPZ para violencia intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.

LOCALIDAD	UPZ	BOSA	FONTIBÓN	KENNEDY	PUENTE ARANDA	TOTAL	FR	%
Bosa	Apogeo	26	-	-	-	26	0,01	1,0
	Bosa central	317	-	-	-	317	0,12	11,6
	Bosa occidental	303	-	-	-	303	0,11	11,1
	El porvenir	193	-	-	-	193	0,07	7,1
	Tintal sur	109	-	-	-	109	0,04	4,0
Fontibón	Aeropuerto el dorado	-	2	-	-	2	0,00	0,1
	Capellanía	-	14	-	-	14	0,01	0,5
	Ciudad salitre occidental	-	16	-	-	16	0,01	0,6
	Fontibón	-	162	-	-	162	0,06	5,9
	Fontibón San Pablo	-	48	-	-	48	0,02	1,8
	Granjas de techo	-	23	-	-	23	0,01	0,8
	Modelia	-	13	-	-	13	0,00	0,5
	Zona franca	-	58	-	-	58	0,02	2,1
Kennedy	Américas	-	-	51	-	51	0,02	1,9
	Bavaria	-	-	20	-	20	0,01	0,7
	Calandaima	-	-	115	-	115	0,04	4,2
	Carvajal	-	-	129	-	129	0,05	4,7
	Castilla	-	-	100	-	100	0,04	3,7
	Corabastos	-	-	134	-	134	0,05	4,9
	Gran Britalia	-	-	111	-	111	0,04	4,1
	Jerusalén	-	-	1	-	1	0,00	0,0
	Kennedy central	-	-	96	-	96	0,04	3,5
	Las margaritas	-	-	40	-	40	0,01	1,5
	Patio bonito	-	-	203	-	203	0,07	7,5
	Timiza	-	-	178	-	178	0,07	6,5
	Tintal norte	-	-	30	-	30	0,01	1,1
Puente Aranda	Ciudad montes	-	-	-	90	90	0,03	3,3
	Muzú	-	-	-	55	55	0,02	2,0
	Puente Aranda	-	-	-	11	11	0,00	0,4
	San Rafael	-	-	-	59	59	0,02	2,2
	Zona industrial	-	-	-	17	17	0,01	0,6

<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>948</b>	<b>336</b>	<b>1208</b>	<b>232</b>	<b>2724</b>	<b>1.0</b>	<b>100.0</b>
-----------------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	--------------

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVIM, Enero – marzo 2022

En la tabla se puede evidenciar la distribución de casos notificados por pertenencia étnica Vs Localidad y sexo, en esta se logra establecer que la variable “otros” presenta la mayor frecuencia en eventos, donde el 99,4% (n=2709) no se siente identificado con alguna etnia; el resto se siente caracterizado con alguna de estas siendo el afrocolombiano el de mayor identificación con el 0,3% (n=7)

Tabla 50. Violencia intrafamiliar según tipo Pertenencia Étnica y localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.

PERTENENCIA ÉTNICA	BOSA			FONTIBÓN			KENNEDY			PUENTE ARANDA			TOTAL	FR	%
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total			
Otros	218	726	944	80	250	330	299	904	1203	63	169	232	2709	0,994	99,4
Afrocolombianos	0	2	2	0	2	2	0	3	3	0	0	0	7	0,003	0,3
Indígena	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0,000	0,0
Mulato	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0,001	0,1
Raizal	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0,000	0,0
ROM	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0,001	0,1
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>218</b>	<b>730</b>	<b>948</b>	<b>80</b>	<b>256</b>	<b>336</b>	<b>299</b>	<b>909</b>	<b>1208</b>	<b>63</b>	<b>169</b>	<b>232</b>	<b>2724</b>	<b>1.0</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVIM, Enero – marzo 2022

Por otra parte se continua con el análisis de acuerdo a la distribución de eventos notificados con respecto al grupo poblacional, donde se evidencia nuevamente que la variante “otros” es predominante con el 86,4% (n=2409), está teniendo que ver con la población que no se identifica o presenta algún tipo de condición de vulnerabilidad que dada sus características pueden potencializar el riesgo frente a situaciones que vigila el SIVIM, le sigue el de migrantes con el 5,71% (n=160), seguido de gestantes con el 4,54% (n=127), un poco más lejos está la persona en condición de discapacidad con el 2,07% (n=58), el resto 8% tiene que ver con problemáticas que no son frecuentes, pero por su riesgo son importantes como lo es la persona en condición de desplazamiento, NNA bajo protección del ICBF, Habitantes de calle, entre otros.

Tabla 51. Violencia intrafamiliar según Grupo Poblacional y localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2021.

GRUPO POBLACIONAL	BOSA			FONTIBÓN			KENNEDY			PUENTE ARANDA			TOTAL	FR	%
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL			
Otros	198	623	821	74	225	299	278	807	1085	59	145	204	2409	0,860	86,04
Gestante	0	62	62	0	12	12	0	47	47	0	6	6	127	0,045	4,54
Migrante	15	55	70	2	18	20	11	50	61	1	8	9	160	0,057	5,71
Discapacidad	4	13	17	2	4	6	8	19	27	2	6	8	58	0,021	2,07
Desplazado	0	7	7	0	0	0	1	4	5	0	1	1	13	0,005	0,46
ICBF	1	6	7	2	0	2	2	1	3	0	1	1	13	0,005	0,46
Vic Conf. Arma	0	4	4	0	1	1	0	3	3	0	1	1	9	0,003	0,32
Salud Mental	1	1	2	0	0	0	0	2	2	0	1	1	5	0,002	0,18
Desmovilizado	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0,001	0,07
Hab. de calle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0,001	0,07
Comunitaria	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0,000	0,04
Cárcel	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0,000	0,04
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>219</b>	<b>771</b>	<b>990</b>	<b>80</b>	<b>260</b>	<b>340</b>	<b>301</b>	<b>936</b>	<b>1237</b>	<b>63</b>	<b>170</b>	<b>233</b>	<b>2800</b>	<b>1.0</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVIM, Enero – marzo 2022

Ahora bien y en línea con lo manifestado anteriormente nos debemos referir al curso de vida, en este se evidencia que la población mayormente afectada se encuentra en la adolescencia con el 30,6% (n=928), seguido de la juventud con el 16,8% (n=511), de cerca acompañado por la primera infancia con el 16,5% (n=501), seguido si bien con uno que por cantidad no se destaca, si es importante porque hace parte del proceso evolutivo del ser humano y es el de la infancia con el 13,8% (n=418), le siguen la adultez y vejez con el 15,8% y 6,5% respectivamente, como se puede ver la adolescencia representa dos veces a los otros curso de vida; de igual manera se evidencia en todos los ciclos y tipos de violencia que la mujer es la que mayor número de eventos han sido notificados, esto puede ser debido a los patrones culturales donde en sociedades como la colombiana normaliza la violencia y menoscaba incluso desde la violencia verbal se somete a la mujer.

Tabla 52. IEC de violencia intrafamiliar según tipo de violencia, curso de vida y sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.

CURSO DE VIDA	FÍSICA		SEXUAL		ECONÓMICA		NEGLIGENCIA		ABANDONO		TOTAL	FR	%
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
Primera Infancia	33	18	24	54	6	3	176	166	10	11	501	0,2	16,5
Infancia	47	58	60	115	3	6	53	54	10	12	418	0,1	13,8
Adolescencia	56	128	54	493	2	5	45	112	7	26	928	0,3	30,6
Juventud	28	223	21	160	3	18	2	53	0	3	511	0,2	16,8
Adultez	26	257	5	90	1	39	2	42	3	16	481	0,2	15,8
Vejez	11	30	0	5	2	29	24	39	25	32	197	0,1	6,5
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>201</b>	<b>714</b>	<b>164</b>	<b>917</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>302</b>	<b>466</b>	<b>55</b>	<b>100</b>	<b>3036</b>	<b>1.0</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVIM, Enero – marzo 2022

Por último, se presenta los datos relacionados con el tipo de régimen en salud. En esta se evidencia que los casos mayormente notificados son usuarios que se encuentran afiliados al sistema contributivo con el 61,3% (n=1669); seguido del subsidiado con el 28,3% (n=771), se evidencia que la diferencia entre estos es significativa. En mayor medida el personal migrante se encuentra en el vinculado que representa el 7,4% (n=202)

Tabla 53. Violencia intrafamiliar según tipo de Aseguramiento y localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero - marzo 2022.

TIPO DE ASEGURAMIENTO	BOSA			FONTIBÓN			KENNEDY			PUENTE ARANDA			TOTAL	FR	%
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL			
Contributivo	115	405	520	45	176	221	192	575	767	44	117	161	1669	0,61	61,3
Subsidiado	75	235	310	29	49	78	84	247	331	12	40	52	771	0,28	28,3
Vinculado	22	77	99	1	19	20	13	60	73	3	7	10	202	0,07	7,4
Excepción	4	8	12	5	9	14	6	21	27	3	3	6	59	0,02	2,2
Particular	2	5	7	0	2	2	4	6	10	1	2	3	22	0,01	0,8
Régimen esp	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,0
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>218</b>	<b>730</b>	<b>948</b>	<b>80</b>	<b>256</b>	<b>336</b>	<b>299</b>	<b>909</b>	<b>1208</b>	<b>63</b>	<b>169</b>	<b>232</b>	<b>2724</b>	<b>1.0</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVIM, Enero – marzo 2022

En la tabla, se evidencia el número de notificaciones por mes y su respectiva variación. Frente a este se evidencia que marzo se contó con un aumento de

notificación del 44,3%, sin embargo, no se realizaron intervenciones epidemiológicas de campo al 100% de los casos, pero si se activan las rutas requeridas a través del sistema integral de referencia y contra referencia, dado que el nivel de notificación desborda la capacidad del talento humano asignado para esta labor.

Tabla 54. Notificación de eventos SIVIM, distribuidos por mes, localidad y variación porcentual. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2021.

MES	BOSA	FONTIBÓN	KENNEDY	PUENTE ARANDA	TOTAL	VARIACION
Enero	213	96	300	51	660	-36,6
Febrero	326	92	387	74	879	-3,6
Marzo	409	148	521	107	1185	44,3
<b>TOTAL</b>	<b>948</b>	<b>336</b>	<b>1208</b>	<b>232</b>	<b>2724</b>	<b>-1,8</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVIM, Enero – marzo 2022

## 18. Subsistema VESPA

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud mental a través del subsistema VESPA en la Subred Sur Occidente se captaron un total de 748 usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por lugar de residencia teniendo usuarios desde los 12 hasta los 88 años. Del total de estas notificaciones, 235 (31,4%) pertenecen a la localidad de Kennedy, 191 (25,5%) a la localidad de Puente Aranda, 189 (25,3%) a la localidad de Bosa y 133 (17,8%) a la localidad e Fontibón. Encontrando mayor porcentaje en sexo masculino con 556 (74,3%) y femenino 192 (25,7%).

Tabla 55. Distribución de casos notificados al VESPA, según localidad de residencia, sexo y curso de vida Subred Sur Occidente, enero a marzo 2022.

CURSO DE VIDA	BOSA					FONTIBÓN					KENNEDY					PUENTE ARANDA					TOTAL GENERAL		
	H	%	M	%	TOT	H	%	M	%	TOT	H	%	M	%	TOT	H	%	M	%	TOT	TOT	%	
Primera Infancia (0 a 5 años)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infancia (6 a 11 años)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	9	6,1	8	19,0	17	4	4,2	4	5,4	6	12	7,6	7	9,1	19	3	1,9	2	5,6	5	47	6,3	

Juventud (18 a 28 años)	8 3	5 6	2 3	5 4	1 0	5 0	5 2	1 6	4 3	6 6	5 4	3 4	4 0	5 1	9 4	4 5	2 9	1 8	5 0	6 3	3 2	44,0
Adulthood (29 a 59 años)	5 4	3 6	1 1	2 6	6 5	3 7	3 8	1 5	4 0	5 2	8 1	5 1	2 7	3 5	1 0	9 8	5 1	1 8	4 6	1 4	3 0	44,4
Persona Mayor (60 y más)	1 7	0 0	0 0	1 0	5 8	5 6	4 7	1 0	9 8	1 3	1 1	7 0	3 7	3 0	1 4	1 6	1 0	0 0	0 0	1 6	4 0	5,3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 4 7</b>	<b>1 0 0</b>	<b>4 2 0</b>	<b>1 0 9</b>	<b>1 8 9</b>	<b>9 6 0</b>	<b>1 7 0</b>	<b>3 0 0</b>	<b>1 3 0</b>	<b>1 5 3</b>	<b>1 1 8</b>	<b>1 0 0</b>	<b>7 7 0</b>	<b>1 0 0</b>	<b>2 3 5</b>	<b>1 5 5</b>	<b>1 0 0</b>	<b>3 6 0</b>	<b>1 0 0</b>	<b>1 9 1</b>	<b>7 4 8</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C VESPA, Enero – Marzo 2022

Así mismo, se evidencia la localidad de Kennedy con un total de 31,4% (n=235) notificaciones, para el trimestre de enero a marzo de 2022 correspondiente al sexo masculino el 12,8% (n=96) y al sexo femenino el 4,9% (n=37) en cuanto a la Localidad de Fontibón un total de 17,78% (n=133) notificaciones se observa una mayor población en el sexo masculino con el 12,8% (n=96) y el 4,9% (n=37) en el sexo femenino. Para la localidad de Bosa un total de 25.26% (n=189) notificaciones cuenta con el 19,7% (n=147) sexo masculino y el 5,6% (n=42) sexo femenino, se ingresan en la Localidad de Puente Aranda un 20% (n=154) del total de notificaciones, en cuanto al del sexo masculino el 16,1% (n=122) y del sexo femenino 4,2% (n=32). Según la distribución por momento de curso de vida se encuentra su gran mayoría en Adulthood, es decir, de 29 a 59 años en el con el 44,4% (n=332), seguido de personas con edades comprendidas 18 a 28 años juventud con el 44,4% (n=329).

Tabla 56. Características sociodemográficas de la población con consumo de sustancias psicoactivas Subred Sur Occidente, Enero a Marzo 2022.

GRUPO POBLACIONAL	BOSA	FONTIBÓN	KENNEDY	PUENTE ARANDA	TOTAL	%
Desmovilizado	0	0	0	0	0	0
Discapacidad	0	1	2	1	4	3,7
Habitante de calle	7	0	10	57	74	68,5
Migrante	1	0	4	1	6	5,6
Poblacion de icbf	5	1	5	1	12	11,1
Carcelarios	0	0	0	0	0	0
Gestantes	0	0	0	0	0	0
Poblacion psiquiatrica	0	3	6	0	9	8,3
Victima de Conflicto Armado	1	0	0	2	3	2,8
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>108</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C VESPA, Enero – Marzo 2022  
Logrando clasificar los usuarios atendidos en los diferentes grupos poblacionales

definidos, y particularmente entre la clasificación por habitante de calle, se evidencia que un porcentaje significativo del total de casos aten

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C VESPA, Enero – Marzo 2022  
 didos corresponde a este segmento poblacional con un 68,5% (n=74) los cuales se ubican en mayor porcentaje en la localidad de Puente Aranda con un n=57, de acuerdo a la Tabla. En segundo lugar, se encuentra la población del ICBF la cual se evidencian con el 18% (n=7) en su mayoría de las localidades de Kennedy y Bosa con 5 casos cada uno equivalente a 11,1%. Y en tercer lugar la población psiquiátrica con el 8,3% (n=9) que en su gran mayoría se encuentran en la localidad de Kennedy.

Tabla 57. Distribución de casos notificados según UPZ y Sexo en la Subred Sur Occidente, I Trimestre 2022

LOCALIDAD	UPZ	HOMBRE	MUJER	TOTAL GENERAL	%	FR
Bosa	Apogeo	4	1	5	2,6	0,01
	Bosa Central	85	25	110	58,2	0,15
	Bosa Occidental	22	7	29	15,3	0,04
	El Porvenir	25	4	29	15,3	0,04
	Null	6	2	8	4,2	0,01
	Tintal Sur	5	3	8	4,2	0,01
	Total	147	42	189	100,0	0,25
Fontibón	Capellania	10	2	12	9,0	0,02
	Ciudad Salitre Occidental	4		4	3,0	0,01
	Fontibon	51	27	78	58,6	0,10
	Fontibon San Pablo	3		3	2,3	0,00
	Granjas De Techo	3	4	7	5,3	0,01
	Modelia	14	2	16	12,0	0,02
	Null	2		2	1,5	0,00
	Zona Franca	9	2	11	8,3	0,01
	Total	96	37	133	100,0	0,18
Kennedy	Americas	11	10	21	8,9	0,03
	Bavaria	4	4	8	3,4	0,01
	Calandaima	14	4	18	7,7	0,02
	Carvajal	8		8	3,4	0,01
	Castilla	12	4	16	6,8	0,02
	Corabastos	46	18	64	27,2	0,09
	Gran Britalia	8	8	16	6,8	0,02
	Kennedy Central	10	6	16	6,8	0,02
	Las Margaritas	2	1	3	1,3	0,00
	Null	2	1	3	1,3	0,00

	Patio Bonito	28	14	42	17,9	0,06
	Timiza	11	6	17	7,2	0,02
	Tintal Norte	2	1	3	1,3	0,00
	Total	158	77	235	100,0	0,31
Puente Aranda	Ciudad Montes	9	4	13	6,8	0,02
	Muzu	4	2	6	3,1	0,01
	Null		1	1	0,5	0,00
	Puente Aranda	12	8	20	10,5	0,03
	San Rafael	8	4	12	6,3	0,02
	Zona Industrial	122	17	139	72,8	0,19
	TOTAL	155	36	191	100,0	0,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>556</b>	<b>192</b>	<b>748</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C VESPA, Enero – Marzo 2022

Con relación con la distribución de casos según UPZ, las Unidades de Planeación Zonal que registraron mayor número de casos en la localidad Puente Aranda fue la UPZ Zona Industrial con un 72,8% con una frecuencia relativa de 0,19 sobre el total de los casos, en la localidad de Bosa en la UPZ Bosa Central con un 58,2% con una frecuencia relativa de 0,15 del total de los casos, en la localidad Kennedy UPZ Corabastos con un 27,2% con una frecuencia relativa de 0,09 de la totalidad de los casos y en la localidad Fontibón UPZ Fontibón con un 58,6% con una frecuencia relativa de 0,10 del total de los casos. Dichas UPZ presentan personas en curso de tratamiento por dependencia o adicción.

Tabla 58. Tipo droga de inicio por localidad en la Subred Sur Occidente, Enero a Marzo 2022

DROGA DE INICIO	BOSA			FONTIBÓN			KENNEDY			PUENTE ARANDA			TOTAL GENERAL		
	CA SO S	%	F R	CA SO S	%	F R									
0. No hay droga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	1	0,1	0
1.2CB, Tusi	0	0,0	0	0	0	0	2	0,9	0	0	0,0	0	2	0,3	0
14. Clonazepam	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	1	0,1	0
16. Cocaína	2	1,1	0	1	0,8	0	3	1,3	0	2	1,0	0	8	1,1	0
2. Tabaco (Cigarrillo)	68	36,0	4	55	41,4	4	152	64,7	6	89	46,6	5	364	8,7	5
22. Disolventes, combustibles o pegantes inhalables	3	1,6	0	0	0	0	0	0	0	2	1,0	0	5	0,7	0

23. Éxtasis (MDMA)	0	0,0	0	1	0,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	0,1	0
31. Hongos(Psilocybe y otros)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	0,5	0	1	0,1	0
35. Marihuana	49	25,9	0	6	4,5	0	22	9,4	1	22	11,5	1	99	32,2	1
36. Marihuana Cripa o Cripa	0	0,0	0	1	0,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	0,1	0
39. Metanfetaminas	1	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	0,1	0
4. Alcohol	62	32,8	0	69	51,9	0	53	22,6	2	71	37,2	0	255	41,3	0
48. Peyote(Mescalina)	0	0,0	0	0	0,0	0	1	0,4	0	0	0,0	0	1	0,1	0
8. Basuco	3	1,6	0	0	0,0	0	2	0,9	0	3	1,6	0	8	1,1	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>189</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>191</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>748</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C VESPA, Enero – Marzo 2022

En relación con la droga de inicio los hallazgos más relevantes señalan que las sustancias con que se comienza el consumo de drogas” son en orden de frecuencia: el tabaco con un 48,7% (n=364) con una frecuencia relativa de 0,5 sobre el total de los casos, seguido por el alcohol con un 34,1% (n=255) con una frecuencia relativa de 0,3 sobre el total de los casos y en tercer lugar se ubican la marihuana con un 13,2% (n=9) con una frecuencia relativa de 0,1 del total de los casos.

Desde el subsistema VESPA durante la vigencia analizada se realizaron 66 IEC casos efectivos, los cuales fueron notificados por el sistema de alertas, las distintas UPGD y UI de la Subred; Se Contó con un total de 329 Notificaciones recibidas durante este trimestre de las cuales 66 fueron efectivas y 263 fueron fallidos por calidad del dato o se activaron ruta y por no contar con el suficiente talento humano para realizar investigación epidemiológica de campo. Se evidencia un aumento en la notificación de eventos con relación al trimestre anterior de un 60% al contar con 158 en el último trimestre del año 2021. Así mismo, para este primer trimestre el 100% de las intervenciones epidemiológicas de campo se realizaron de manera presencial dando respuesta a las necesidades de los usuarios y sus familias; la localidad a la que mayor Intervenciones Epidemiológicas de Campo se le realizaron fue Bosa con un 54,5% (n=36), seguido por la localidad de Kennedy con un 34,8% (n=23). Encontrando un 59,1% (n=39) del género masculino y un 40,9% (n=27) género femenino.

Tabla 59. Distribución de casos de abuso de SPA según curso de vida edad de inicio y sexo por percentil 25, 50 y 75 para las 5 sustancias de mayor frecuencia de consumo durante el Enero - Marzo 2022

TABACO (CIGARRILLO)				ALCOHOL				MARIHUANA				COCAINA				BASUCO			
E D A D	H	E D A D	M	E D A D	H	E D A D	M	E D A D	H	E D A D	M	E D A D	H	E D A D	M	ED AD	H	E D A D	M
12	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	27	1	49	1	27	1	19	1
13	2	14	1	14	1	15	3	14	3	14	2	32	1	Tot	1	31	2	Tot	1
14	1	18	4	17	1	16	1	15	3	15	5	36	1			34	1		
15	1	19	5	18	4	18	2	16	1	16	1	42	1			39	1		
16	2	20	2	19	9	19	5	17	5	17	2	43	1			41	1		
17	2	21	4	20	7	20	7	18	4	18	1	51	1			49	1		
18	4	22	2	21	6	21	5	19	3	20	1	54	1			Tot	7		
19	5	23	5	22	10	22	3	20	5	21	1	Tot	7						
20	9	24	3	23	8	23	5	21	2	25	1								
21	12	25	5	24	6	24	5	22	4	27	1								
22	16	26	3	25	8	25	4	23	2	30	1								
23	14	27	3	26	6	26	6	24	3	41	1								
24	17	28	4	27	9	27	4	25	5	Tot	18								
25	11	30	4	28	6	28	4	26	3										
26	13	31	3	29	4	29	2	27	3										
27	5	32	3	30	5	30	2	28	1										
28	6	33	1	31	1	31	4	29	4										
29	10	34	1	32	4	32	1	30	5										
30	10	35	1	33	3	33	1	31	3										
31	6	36	5	34	3	38	1	32	1										
32	6	39	1	35	2	40	2	34	1										
33	6	40	4	36	4	41	1	35	1										
34	5	41	2	37	1	42	2	38	1										
35	4	42	2	38	3	45	1	41	3										
36	7	45	1	39	2	50	3	43	1										
37	1	46	2	40	3	55	1	49	1										
38	5	47	3	41	2	57	1	50	2										
39	7	48	2	42	4	61	1	51	1										
40	4	50	1	43	1	62	1	52	2										
41	5	53	1	44	5	64	1	53	2										
42	2	54	2	45	4	71	1	55	1										
43	4	55	2	46	3	Tot	81	56	2										

44	3	56	1	47	3			61	1										
45	6	57	1	50	3			66	1										
46	2	59	1	51	3			To	8										
47	4	61	1	53	5			t	1										
48	3	62	1	54	4														
49	3	68	1	55	1														
50	2	T ot	89	56	2														
51	2			57	2														
52	1			58	3														
53	3			59	3														
54	5			60	4														
55	1			61	2														
56	6			62	1														
57	6			64	1														
58	3			76	1														
60	3			T ot	174														
61	1																		
62	4																		
63	2																		
64	2																		
65	4																		
66	1																		
67	1																		
71	1																		
72	2																		
88	1																		
T O T	27 5																		

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar SIVIGILA D.C VESPA, Enero – Marzo 2022

En cuanto a las 5 drogas de mayor consumo reportadas en el aplicativo VESPA por las distintas UPGD de la Subred Sur Occidente tenemos que las personas del sexo masculino son quienes mayor consumo de presentan con un 74,1% (n=544) y la representación del sexo femenino con un 25.9% (n=190) encontrando para la droga de mayor consumo Tabaco (Cigarrillo) sexo masculino n=275 Con un percentil 25 la edad de consumo fue a los 22 años, con el percentil 50 edad de consumo a los 26 años y un percentil 75 a los 25 años.

En cuanto a la segunda droga de mayor consumo el alcohol con 174 casos para sexo masculino y para el sexo femenino 81 casos. Encontramos que en hombres para el percentil 25 edad de consumo a los 19 años, percentil 50 edad de consumo

a los 27 años y percentil 75 edad de consumo a los 25 años. En las mujeres para el percentil 25 edad de consumo a los 20 años, el percentil 50 edad de consumo a los 21 años y el percentil 75 de consumo a los 21 años.

En cuanto a la droga que se ubica en el tercer lugar de mayor consumo es la marihuana un n=99, para sexo masculino con un n=81 y sexo femenino con un n=18 con un percentil 25 de la población del sexo masculino iniciaron el consumo de a los 17 años, con un percentil 50 consumo a los 20 años y con un percentil 75 el consumo fue a los 25 años.

## **19. Subsistema SIVELCE**

Debido a su importancia este subsistema se encuentra ubicado como línea transversal de los eventos de salud mental, donde se dan a conocer datos de lesiones no intencionales reconociendo que los accidentes o lesiones no intencionales constituyen un problema de salud pública por su prevalencia, morbimortalidad y elevados costos hospitalarios, el conocimiento de los factores de riesgo de los accidentes ha permitido la elaboración de programas eficaces para su prevención y control.

Por otra parte, se dan a conocer los datos representativos del comportamiento de las lesiones intencionales, las lesiones intencionales son una de las causas de demanda de atención en los servicios de urgencia las cuales se definen como aquellas donde se busca hacer daño o ganar algo, mediante la fuerza lo que puede ocasionar afectaciones físicas, fisiológicas que pueden ocasionar la muerte.

Dentro de esta categoría se identifican acciones que conllevan a lesión luego de hurto, riñas o lesiones auto infligidas que no tengan relación con ideación suicida, además de las agresiones por Corrosivos (ácidos, álcalis y/o agentes químicos) las cuales dadas sus implicaciones frente a la violencia de género son notificados al SIVIM, según la resolución 4568 del 2014 (protocolo de atención a víctimas de ataques con Agentes químicos) y la 1257 de 2008 (Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres).

Tabla 60. Distribución de casos quemaduras y accidentes domésticos Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022

MES	ACCIDENTES DOMESTICOS		QUEMADURAS	
	N	FR	N	FR
Enero	239	35,30%	115	26,10%
Febrero	228	33,70%	175	39,70%
Marzo	210	31,00%	151	34,20%
<b>TOTAL</b>	<b>677</b>	<b>1</b>	<b>441</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Dentro del subsistemas encontramos los accidentes domésticos donde observamos para el mes de enero el mayor número de eventos con el 35,3%(n=239), y de en un menor nivel el mes de marzo con 31% (n=210), es de mencionar que la diferencia relacionada para cada mes es de solo el 2% entre los meses de enero, febrero y marzo lo cual no evidencia un incremento o decremento significativo en la notificación.

Sin embargo, la notificación de los casos con mayor frecuencia por quemadura se da el mes de febrero con el 39.7%(n=441), siendo este significativamente menor para el mes de enero con el 31% (n=210). Por otra parte, se observa que dentro de los meses se encuentra una diferencia más marcada con un 3.5% entre los meses evaluado con respecto a los accidentes domésticos que solo tiene un 2% de diferencia entre los meses valorados

Tabla 61. Distribución de accidentes domésticos y quemaduras según curso de vida y sexo Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022

CICLO DE VIDA	ACCIDENTES DOMÉSTICOS				QUEMADURAS			
	HOMBRES	%	MUJERES	%	HOMBRES	%	MUJERES	%
Primera infancia	77	24,3	72	20	27	12,3	22	9,9
Infancia	50	15,8	29	8,1	14	6,4	25	11,3
Adolescencia	11	3,5	6	1,7	4	1,8	6	2,7
Juventud	30	9,5	25	6,9	52	23,7	47	21,2
Adultez	87	27,4	90	25	102	46,6	112	50,5
Vejez	62	19,6	138	38,3	20	9,1	10	4,5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>317</b>	<b>100</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>219</b>	<b>100</b>	<b>222</b>	<b>100</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Respecto al ciclo de vida en los accidentes domestico se establece que el que presenta más afectación es el de adultez con un 27,4% (n=87) para los hombres,

seguido del ciclo de primera infancia con 77 casos tan sólo un 3%(n=10) de diferencia entre los ciclos, parte de los eventos notificados con menor incidencia son del ciclo de adolescencia con solo un 3,5% (n=11), por otra parte, encontramos en las mujeres que el ciclo con mayor incidencia es el ciclo de vejez con un 38,3 %(n=138), seguido del ciclo adultez con 25%(n=90)con una diferencia marcada entre los ciclos de 13,3%(n=48),en menor proporción en las mujeres encontramos el ciclo de la adolescencia con el 1.7% (n=6).

Frente a los eventos de quemaduras relacionados con los hombres se encuentra en mayor proporción el ciclo de adultez con 46.6% (n=102) superando con el doble del porcentaje el ciclo más cercano en posición juventud con un 23% (n=52) en menor medida y muy alejado del ciclo principal encontramos el ciclo de adolescencia con 1,8%(n=4), mientras que en las mujeres encontramos que al igual que en los hombres el ciclo de adultez presenta mayor incidencia con un 50,5%(n=112), seguido del ciclo de juventud con una diferencia de 65 eventos en último lugar aunque no menos importante se encuentra el ciclo de adolescencia solo 6 casos y un 2%de los eventos.

Tabla 62. Distribución de accidentes domésticos según tipo de mecanismo implicado, grupo de edad y sexo de la Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022

MECANISMO	EDADES	MUJER	HOMBRE	TOTAL	%
Arma de fuego	6 A 13	0	1	1	0,1
	14 A 17	0	0	0	0
	18 A 26	0	0	0	0
	27 A 59	0	0	0	0
	60 MAS	0	0	0	0
Arma corto punzante	0 A 5	1	0	1	0,1
	6 A 13	0	4	4	0,6
	14 A 17	0	1	1	0,1
	18 A 26	0	2	2	0,3
	27 A 59	7	14	21	3,1
	60 MAS	1	0	1	0,1
Objeto contundente	0 A 5	1	1	2	0,3
	6 A 13	0	5	5	0,7
	14 A 17	1	0	1	0,1
	18 A 26	0	1	1	0,1
	27 A 59	3	5	8	1,2
	60 MAS	2	0	2	0,3
Caída propia altura	0 A 5	10	16	26	3,8
	6 A 13	5	9	14	2,1

	14 A 17	0	3	3	0,4
	18 A 26	8	4	12	1,8
	27 A 59	36	5	41	6,1
	60 MAS	86	16	102	15,1
Caída de altura	0 A 5	17	14	31	4,6
	6 A 13	5	9	14	2,1
	14 A 17	0	1	1	0,1
	18 A 26	3	3	6	0,9
	27 A 59	5	7	12	1,8
	60 MAS	9	3	12	1,8
Otro tipo de accidente	0 A 5	32	34	66	9,7
	6 A 13	19	22	41	6,1
	14 A 17	4	6	10	1,5
	18 A 26	16	19	35	5,2
	27 A 59	46	44	90	13,3
	60 MAS	66	38	104	15,4
Consumo	0 A 5	1	2	3	0,4
	6 A 13	0	0	0	0
	14 A 17	1	0	1	0,1
	18 A 26	0	1	0	0
	27 A 59	1	2	3	0,4
	60 MAS	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>386</b>	<b>292</b>	<b>677</b>	<b>100</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Frente al tipo de accidente se evidencia que otro tipo de accidentes es la más frecuente con el 15,4% (n=104) seguida de la caída de su propia altura con el 15,1% (n=102) no se evidencia una diferencia sustancial frente a estos dos mecanismos en cuanto a la totalidad de eventos, de igual forma se evidencia similitud en el ciclo vital en el que ocurre con mayor incidencia es en el ciclo mayores de 60 en las mujeres para los dos mecanismos, lo cual pueden terminar afectando la calidad de vida de los usuarios, tanto físicamente como fisiológicamente ya que su edad avanzada puede generar mayores afectaciones mientras que en el mecanismo de arma de fuego es el mecanismo con menor impacto ya que solo cuenta con 1 caso para todos los ciclos de vida, generando solo aporte al ciclo de 6-13 años en los hombres.

Es de anotar que, en el mecanismo de lesión de causa externa de manera accidental, para un mismo evento puede ser múltiple, dado que este no es excluyente.

Tabla 63. Distribución de quemaduras según tipo de mecanismo implicado, grupo de edad y sexo de la Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022

MECANISMO		MUJER	HOMBRE	TOTAL	%
Electricidad	0 A 5	0	0	0	0
	6 A 13	1	1	2	0,5
	14 A 17	0	1	1	0,2
	18 A 26	1	0	1	0,2
	27 A 59	2	7	9	2
	60 MAS	0	0	0	0
Líquido Hirviente	0 A 5	13	18	31	7
	6 A 13	11	7	18	4,1
	14 A 17	3	2	5	1,1
	18 A 26	17	8	25	5,7
	27 A 59	60	23	83	18,8
	60 MAS	5	6	11	2,5
Llama	0 A 5	2	0	2	0,5
	6 A 13	2	2	4	0,9
	14 A 17	6	0	6	1,4
	18 A 26	2	6	8	1,8
	27 A 59	6	14	20	4,5
	60 MAS	2	0	2	0,5
Químico	0 A 5	1	1	2	0,5
	6 A 13	0	0	0	0
	14 A 17	0	0	0	0
	18 A 26	7	10	17	3,9
	27 A 59	12	21	33	7,5
	60 MAS	1	6	7	1,6
Rayo	0 A 5	0	0	0	0
	6 A 13	0	0	0	0
	14 A 17	0	0	0	0
	18 A 26	0	0	0	0
	27 A 59	0	0	0	0
	60 MAS	0	0	0	0
Solar	0 A 5	0	0	0	0
	6 A 13	0	0	0	0
	14 A 17	0	0	0	0
	18 A 26	0	1	1	0,2
	27 A 59	2	1	3	0,7
	60 MAS	0	0	0	0
Sólido Caliente	0 A 5	4	5	9	2

	6 A 13	2	3	5	1,1
	14 A 17	1	0	1	0,2
	18 A 26	18	20	38	8,6
	27 A 59	24	20	44	10
	60 MAS	1	5	6	1,4
Vapor	0 A 5	0	0	0	0
	6 A 13	0	0	0	0
	14 A 17	1	1	2	0,5
	18 A 26	0	4	4	0,9
	27 A 59	6	11	17	3,9
	60 MAS	1	2	3	0,7
Pólvora	0 A 5	0	0	0	0
	6 A 13	0	1	1	0,2
	14 A 17	0	0	0	0
	18 A 26	1	0	1	0,2
	27 A 59	0	1	1	0,2
	60 MAS	0	0	0	0
Sin Dato	0 A 5	1	2	3	0,7
	6 A 13	2	0	2	0,5
	14 A 17	0	0	0	0
	18 A 26	2	2	4	0,9
	27 A 59	3	5	8	1,8
	60 MAS	0	1	1	0,2
<b>TOTAL</b>		<b>223</b>	<b>218</b>	<b>441</b>	<b>100</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Frente al tipo de quemaduras se identifica que el líquido hirviendo es el mecanismo donde más se evidencian eventos, esto debido posiblemente a que los líquidos son ampliamente utilizados en sectores del comercio, productividad y actividades domésticas donde pasa desapercibida la manipulación adecuada de dicho elemento, se cuenta por lo tanto 60 eventos notificados por líquido hirviendo en el ciclo de 29 a 59 con mayor impacto en las mujeres, mientras que en los hombres se presenta con gran disminución del evento para este ciclo, seguido por los sólidos calientes con el 22.7% (n=103) se evidencia que el ciclo con más afectación es de 27 a 59 en las mujeres con 24 casos.

En última posición se encuentra los rayos ya que no se presenta ningún evento, frente a sin dato, es evidente que se debe reforzar las notificaciones con las UPGD durante las asistencias técnicas para la verificación del protocolo y la respuesta inmediata en cuanto a la notificación y evidenciar la importancia de la calidad del dato y el impacto que tiene este frente a los indicadores de los eventos; es relevante

tener en cuenta que durante el trimestre se presentan 3 eventos asociados a lesión por al uso de pólvora pirotécnica.

También se puede determinar que en el periodo anterior las quemaduras accidentales por químicos aumentar a consecuencia de la reactivación económica, ya que estos elementos están asociados con las actividades laborales.

Con relación al lugar donde sucede el accidente se encuentra que las quemaduras por líquido hirviendo se dan en el ámbito doméstico como consecuencia de accidentes asociados al autocuidado y preparación de alimentos.

Tabla 64. Distribución de accidentes domésticos según localidad y UPZ.

LOCALIDAD	UPZ	EVENTOS	%	FR
Bosa	Apogeo	6	3,2	0,03
	Bosa Central	83	44,6	0,45
	Bosa Occidental	51	27,4	0,27
	El Porvenir	27	14,5	0,15
	Tintal Sur	11	5,9	0,06
	Sin Dato	8	4,3	0,04
	<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
Fontibón	Capellania	8	10	0,1
	Ciudad Salitre Occidental	12	15	0,15
	Fontibon	25	31,3	0,31
	Fontibon San Pablo	11	13,8	0,14
	Granjas De Techo	8	10	0,1
	Zona Franca	9	11,3	0,11
	Modelia	6	7,5	0,08
	Sin Dato	1	1,3	0,01
	<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
Kennedy	Americas	21	6,6	0,07
	Bavaria	16	5	0,05
	Calandaima	27	8,5	0,08
	Carvajal	42	13,2	0,13
	Castilla	40	12,6	0,13
	Corabastos	27	8,5	0,08
	Gran Britalia	16	5	0,05
Puente Aranda	Kennedy Central	28	8,8	0,09
	Las Margaritas	3	0,9	0,01
	Patio Bonito	44	13,8	0,14
	Timiza	45	14,2	0,14
	Tintal Norte	6	1,9	0,02
	Sin Dato	3	0,9	0,01
	<b>Total</b>	<b>318</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
	Ciudad Montes	35	37,6	0,38
	Muzu	24	25,8	0,26
	Puente Aranda	4	4,3	0,04
	San Rafael	25	26,9	0,27
	Zona Industrial	3	3,2	0,03
	Sin Dato	2	2,2	0,02
	<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Teniendo en cuenta la UPZ por localidades se identifica que en donde se presenta más incidencia frente a los eventos de accidentes domésticos es en la localidad de

Kennedy con 318 eventos, los cuales se encuentran con un número mayor Timiza con un 14,2 % (n=45), seguido de patio bonito con tan solo 1 caso de diferencia en último lugar encontramos la UPZ de las margaritas con el 0,9 % (n=3), es importante mencionar que para esta localidad se cuenta con 3 casos sin dato, por lo que es importante recordar a las UPGD la importancia de la calidad del dato.

Encontramos que la localidad con menos eventos es Fontibón con 80 eventos, la UPZ con mayor incidencia es Fontibón con 31,3% (n=25) y la UPZ con menor incidencia es Modelia con 6 casos y un porcentaje de 1,9, se de aclarar que en esta localidad encontramos también datos faltantes, aunque para esta localidad solo sea un dato.

Tabla 65. Distribución de quemaduras según localidad y UPZ Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022

LOCALIDAD	UPZ	EVENTOS	%	FR
Bosa	Apogeo	7	5,1	0,05
	Bosa Central	47	34,6	0,35
	Bosa Occidental	46	33,8	0,34
	Porvenir	20	14,7	0,15
	Tintal Sur	14	10,3	0,1
	Sin Dato	2	1,5	0,01
	Total	136	100	1
Fontibon	Capellanía	3	4,5	0,04
	Ciudad Salitre Occidental	6	9	0,09
	Fontibon	23	34,3	0,34
	Fontibon San Pablo	13	19,4	0,19
	Granjas De Techo	5	7,5	0,07
	Zona Franca	9	13,4	0,13
	Aeropuerto El Dorado	2	3	0,03
	Modelia	6	9	0,09
	Total	67	100	1
Kennedy	Americas	16	8,6	0,09
	Bavaria	12	6,4	0,06
	Calandaima	11	5,9	0,06
	Carvajal	20	10,7	0,11
	Castilla	19	10,2	0,1
	Corabastos	16	8,6	0,09
	Gran Britalia	13	7	0,07
	Kennedy Central	19	10,2	0,1
	Las Margaritas	5	2,7	0,03
	Patio Bonito	32	17,1	0,17
	Timiza	22	11,8	0,12
	Tintal Norte	1	0,5	0,01

	Sin Dato	1	0,5	0,01
	Total	187	100	1
Puente Aranda	Ciudad Montes	18	35,3	0,35
	Muzu	7	13,7	0,14
	Puente Aranda	4	7,8	0,08
	San Rafael	16	31,4	0,31
	Zona Industrial	6	11,8	0,12
	<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Frente a la frecuencia de eventos por UPZ y calidades se evidencia según la notificación que UPZ en la localidad de Bosa como Bosa Occidental y central presentan 46 y 47 notificaciones respectivamente lo que constituye en 67% de los eventos de la localidad, por otra parte, en la localidad de Fontibón encontramos la UPZ Fontibón con un 34,1%(n=23), para la localidad de Kennedy se evidencia que la UPZ con más incidencia es patio bonito con 32 casos para 17,1% y para Puente Aranda se encuentra Ciudad Montes como UPZ con mayor incidencia para la localidad de Puente Aranda con un 35.3%(n=18).

Tabla 66. Lesiones intencionales según localidad y sexo, Subred Sur Occidente Enero- Marzo 2022.

LOCALIDAD	HOMBRE	%	FR	MUJER	%	FR	TOTAL GENERAL	%	FR
Bosa	87	22,3	0,22	44	29,7	0,3	131	24,3	0,24
Fontibón	59	15,1	0,15	19	12,8	0,13	78	14,5	0,14
Kennedy	180	46	0,46	64	43,2	0,43	244	45,3	0,45
Puente Aranda	65	16,6	0,17	21	14,2	0,14	86	16	0,16
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>391</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>148</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>539</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Teniendo en cuenta el volumen de eventos notificados como accidentales, las lesiones intencionales representa el 9,10 % (n=539) de la notificación; los casos notificados se dan en mayor frecuencia por residencia en la localidad de Kennedy con el 45,3% (n=244), siendo este significativamente mayor a Bosa teniendo en cuenta que en cuanto a extensión son muy similares, dicha localidad que cuenta con el 24,3% (n=131). Por otra parte, se encuentra que el actor según sexo se da en mayor proporción en hombres con el 46% (n= 180) para la localidad de Kennedy versus el 43,2% (n=64) identificado en mujeres de dicha localidad, en cuanto a la localidad de Bosa los hombres cuentan con el 22%(n=87) y las mujeres con 29,7%(n=44) se evidencia en este cuadro comparativo que el porcentaje de hombres supera por el doble la incidencia del evento dato que llama la atención frente a las acciones realizadas por los hombres frente al auto cuidado.

Tabla 67. Lesiones NO Intencionales, según localidad y sexo, distribuido por frecuencias absolutas y relativas Subred Sur Occidente Enero – Marzo 2022

LOCALIDAD	HOMBRE	%	FR	MUJER	%	FR	TOTAL GENERAL	%	FR
Bosa	1243	37,3	0,37	642	31,3	0,31	1885	35	0,35
Fontibón	319	9,6	0,1	218	10,6	0,11	537	10	0,1
Kennedy	1481	44,5	0,44	972	47,4	0,47	2453	45,6	0,46
Puente Aranda	288	8,6	0,09	219	10,7	0,11	507	9,4	0,09
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3331</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2051</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>5382</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Se identifica que las lesiones de no intencionales son el porcentaje más alto entre las lesiones con 5382 casos para un 90,9 % de las notificaciones, los casos notificados se dan en mayor frecuencia por residencia en la localidad de Kennedy con el 45,6% (n=2453), en su distribución se evidencia que la mayor incidencia es en hombres con 44,5%(n=1481), mientras que en las mujeres el 47,4%(n=972), aunque por porcentaje las mujeres presentan mayor impacto, es de aclarar que los hombres se presentan en mayor número, la localidad de puente Aranda es la que cuenta con el menor número de casos con un 9,4%(n=507) y fontibon con el 10%(n=537)

Tabla 68. Tipo de lesión intencional, según mecanismo y sexo Subred Sur Occidente 1° trimestre 2022

MECANISMO	HOMBRE	%	FR	MUJER	%	FR	TOTAL GENERAL	%	FR
Autoinfligida	4	1	0,01	9	6,1	0,06	13	2,4	0,02
Causada por terceros	387	99	0,99	139	93,9	0,94	526	97,6	0,98
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>391</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>148</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>539</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Dentro de las lesiones intencionales encontramos que las causas por tercetos son las de mayor incidencia con un 97,6%(n=526) con un mayor impacto en los hombres con 387 casos, mientras que en las mujeres solo se cuenta con 139 casos, se evidencia que en los hombres se presenta 2.5 veces más que en las mujeres.

Tabla 69. Tipo de lesión NO intencional, según mecanismo y sexo Subred Sur Occidente 1° trimestre 2022

MECANISMO	HOMBRE	%	FR	MUJER	%	FR	TOTAL GENERAL	%	FR
Accidente de tránsito	1559	46,8	0,47	786	38,3	0,38	2345	43,6	0,44
Consumo	10	0,3	0	13	0,6	0,01	23	0,4	0
Otro tipo de Lesión o Trauma	1762	52,9	0,53	1247	60,8	0,61	3009	55,9	0,56
Procedimientos Estéticos	0	0	0	4	0,2	0	4	0,1	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3331</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2050</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>5381</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Dentro de los mecanismos relacionados con las lesiones no intencionales encontramos que la de mayor incidencia es otro tipo de lesión o trauma con 3009 eventos con un 55,9% es de aclarar que su incidencia es tan alta ya que entran todos los eventos que no se logran clasificar en los otros ítems de las lesiones no intencionales, seguido a este se evidencia los accidentes de tránsito con 2345 eventos con un 43% en este mecanismo se evidencia un incremento más fuerte en los hombres con 46,8%(1559) mientras que la mujer 786 eventos, es de tener en cuenta que el parque automotor en Bogotá genero un incremento sustancial, lo que puede repercutir en el incremento de accidentes de tránsito.

Tabla 70. Tipo de lesión intencional, según escenario y sexo, Subred Sur Occidente Enero – Marzo 2022

ESCENARIO	HOMBRE	%	FR	MUJER	%	FR	TOTAL GENERAL	%	FR
Vivienda	39	9,97	0,1	42	28,38	0,28	81	15,03	0,15
Lugar de Trabajo	23	5,88	0,06	3	2,03	0,02	26	4,82	0,05
Lugar de estudio	8	2,05	0,02	5	3,38	0,03	13	2,41	0,02
Bares y discotecas	14	3,58	0,04	6	4,05	0,04	20	3,71	0,04
otro establecimiento publico	22	5,63	0,06	3	2,03	0,02	25	4,64	0,05
Vías publicas	263	67,26	0,67	84	56,76	0,57	347	64,38	0,64
Transporte publico	9	2,3	0,02	2	1,35	0,01	11	2,04	0,02
Instituciones	6	1,53	0,02	0	0	0	6	1,11	0,01
Otros	7	1,79	0,02	3	2,03	0,02	10	1,86	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>391</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>148</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>539</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

El escenario más relevante frente a las lesiones intencionales se encuentra las vías públicas con un 64%(347) eventos, en los hombres se evidencias 263 eventos y en un menor número las mujeres con 84 eventos, seguido a este se evidencia la vivienda, pero es de anotar que el número de eventos de diferencia entre estos es más del 50% por lo que es notable que el escenario principal es vía pública, dentro del escenario de vivienda se observa que las mujeres presentan más eventos con 42, mientras que los hombres presentan 39 eventos.

Tabla 71. Tipo de lesión No intencional, según escenario y sexo, Subred Sur Occidente 1° trimestre 2022

ESCENARIO	HOMBRE	%	FR	MUJER	%	FR	TOTAL GENERAL	%	FR
Vivienda	411	12,61	0,13	504	25,09	0,25	915	17,37	0,17
Lugar de Trabajo	969	29,72	0,3	469	23,34	0,23	1438	27,29	0,27
Lugar de estudio	79	2,42	0,02	53	2,64	0,03	132	2,51	0,03
Bares y discotecas	5	0,15	0	2	0,1	0	7	0,13	0
otro establecimiento publico	23	0,71	0,01	17	0,85	0,01	40	0,76	0,01
Vías publicas	1735	53,22	0,53	926	46,09	0,46	2661	50,5	0,51
Transporte publico	12	0,37	0	12	0,6	0,01	24	0,46	0
Instituciones	9	0,28	0	7	0,35	0	16	0,3	0
Otros	17	0,52	0,01	19	0,95	0,01	36	0,68	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>3260</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2009</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>5269</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

De acuerdo a escenario en las lesiones no intencionales se establece que la mayor parte de los eventos notificados se da en la vía pública con el 50,5% (n=2661), seguida de lugar de trabajo con el 27,2% (n=1438) y en tercer lugar vivienda con el 17,3% (n=915), los eventos están relacionados en mayor medida con actividades relacionadas a actividades laborales y situaciones circunstanciales que se presentan en el hogar, es importante resaltar que al igual que el periodo pasado estos 3 escenarios se encontrar en las mismas posiciones por lo que su incidencia no cambia.

La vía pública puede estar asociada igualmente accidentes de tránsito o actividades lúdicas que puede realizar el usuario. Este tipo de situaciones se genera más en hombres con una frecuencia de 1735 casos notificados que representa el 53,2%, contra el 46% que representan a 926 mujeres.

Tabla 72. Tipo de lesión, curso de vida y sexo, Subred Sur Occidente Enero- Marzo 2022

CICLO VITAL	NO INTENCIONAL						INTENCIONAL					
	H	%	FR	M	%	FR	H	%	FR	M	%	FR
Primera Infancia	150	4,5	0,05	135	6,7	0,07	2	0,5	0,01	1	0,7	0,01
Infancia	178	5,3	0,05	126	6,2	0,06	13	3,3	0,03	8	5,4	0,05
Adolescencia	95	2,9	0,03	45	2,2	0,02	29	7,4	0,07	7	4,8	0,05
Juventud	1051	31,5	0,32	498	24,5	0,25	106	27,2	0,27	52	35,4	0,35
Adultez	1681	50,5	0,5	1025	50,5	0,51	227	58,2	0,58	74	50,3	0,5
Vejez	177	5,3	0,05	200	9,9	0,1	13	3,3	0,03	5	3,4	0,03
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3332</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2029</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>390</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>147</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA D.C SIVELCE, Enero – Marzo 2022

Se identifica en los eventos intencionales que el curso de vida que presenta mayor número de notificación es la adultez con 301 casos que representa para los hombres 58,2%(n=227) y para la mujer 50,3% (n=74), seguida de Juventud con 158 casos, estos dos representan una porcentaje de 27% para los hombres y 35% para las mujeres, una de las hipótesis a manejar es la facilidad de acontecimientos sociales donde los usuarios deambulan y salen más de sus domicilio y generan conductas de riesgo, lo cual clasifica Caballo en sus investigaciones, donde manifiesta que las conductas agresivas se asocian al ciclo evolutivo.

Se identifica en los eventos no intencionales que el curso de vida que presenta mayor número de notificación es la adultez donde se observa los hombres con un 50,5 % que representa 21681 eventos, y las mujeres con 50,5% que representa 1025 eventos, seguida de Juventud con 31% para los hombres y 24% para las mujeres, estos dos representan una frecuencia de 4255 casos, lo que cuenta con el 76%. Es posible que se genere estas situaciones accidentales de acuerdo a que son cursos de vida donde su predominante son las actividades laborales y de índole educativo.

## **CAPITULO 8: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LOS EVENTOS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES SISVAN**

### **20. Malnutrición en niños menores de 5 años, escolares y adolescentes**

#### 20.1. Malnutrición en menores de 5 años

Los datos que se muestran a continuación corresponden a las bases de datos preliminares suministradas por secretaria Distrital de Salud, a la fecha no se cuentan con las bases correspondientes al mes de marzo.

Tabla 73. Análisis de desnutrición aguda, riesgo de desnutrición aguda y exceso de peso en menores de 5 años

LOCALIDAD	DNT AGUDA SEVERA	DNT AGUDA MODERADA	RIESGO DE DNT AGUDA	RIESGO DE SOBREPESO	SOBREPESO	OBESIDAD
07. Bosa	0,90%	2,44%	12,81%	13,38%	2,90%	1,08%
08. Kennedy	1,01%	2,65%	13,81%	12,89%	3,39%	1,15%
09. Fontibon	0,51%	2,07%	13,17%	13,35%	2,72%	1,09%
16. Puente Aranda	0,54%	3,32%	12,92%	14,13%	3,08%	1,15%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,56%</b>	<b>13,32%</b>	<b>13,22%</b>	<b>3,11%</b>	<b>1,12%</b>

Fuente: Creado a partir de base menores de 5 años SDS enero – febrero 2022

La localidad de Kennedy reporta la mayor prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa de igual manera presentan mayor prevalencia de riesgo de desnutrición aguda. En cuanto a la malnutrición por exceso, como se evidencia corresponde a la localidad de Kennedy y Bosa respectivamente, se puede establecer que la mayor prevalencia de eventos en nutrición se presentan en la localidad de Kennedy es importante tener en cuenta que es la localidad más grande y con mayor número de habitantes de las cuatro localidades atendidas por la Subred y en esta confluyen diferentes dinámicas sociales y económicas; El estado nutricional sin duda es un indicador primordial en la primera infancia porque puede determinar sus condiciones de salud y nutrición para las edades posteriores como adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor.

#### 20.2. Análisis de la notificación del evento 113 desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años, de acuerdo a SIVIGILA Subred Sur Occidente.

Los datos que se muestran a continuación corresponden a la base SIVIGILA de la Subred Sur Occidente de los meses de enero a marzo de 2022.

Tabla 74. Número de casos notificados por localidades del evento 113.

LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL GENERAL
Bosa	31	57	61	149
Fontibon	8	10	13	31
Kennedy	39	69	61	169
Puente aranda	3	4	10	17
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>81</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>366</b>

Fuente: Creado a partir de base SISVAN enero – febrero 2022

De acuerdo a los datos de SIVIGILA encontramos la distribución del evento 113 como se muestra en la imagen a continuación.




Figura 60. Distribución de evento 113 por localidades. I trimestre 2022. base SISVAN enero – febrero 2022

Se evidencia que las localidades y UPZ donde se presenta mayores cifras de pobreza, desempleo y migración son aquellas donde se ha manifestado mayor cantidad de casos de desnutrición aguda moderada y severa, como se muestra en el mapa estas corresponden a Bosa en las UPZ Bosa central, Bosa occidental, El porvenir y Tintal Sur; en la localidad de Kennedy el mayor número de notificaciones se encuentran concentradas en la UPZ Patio Bonito y Corabastos. Por el contrario, en la localidad de Fontibón donde se encuentran UPZ con estrato socioeconómico hasta 4, la notificación de casos de desnutrición aguda disminuye notablemente, también se resalta que muchos de los menores de 5 años son atendidos y por ende notificados en UPGD fuera de las localidades de la Subred.

### 20.3. Análisis según índice de masa corporal y retraso en talla en menores de 5 a 17 años

Los datos que se muestran a continuación corresponden a las bases de datos preliminares suministradas por secretaria Distrital de Salud, a la fecha no se cuentan con las bases correspondientes al mes de marzo

Tabla 75. Análisis según índice de masa corporal en menores de 5 a 17 años

<b>LOCALIDAD</b>	<b>1. DELGADEZ</b>	<b>2. RIESGO DE DELGADEZ</b>	<b>3. IMC ADECUADO PARA LA EDAD</b>	<b>4. SOBREPESO</b>	<b>5. OBESIDAD</b>
07. Bosa	2,9%	12,1%	58,5%	18,5%	8,0%
08. Kennedy	3,1%	12,0%	58,1%	17,8%	9,1%
09. Fontibon	2,8%	12,1%	56,8%	18,4%	9,9%
16. Puente Aranda	3,3%	11,7%	54,1%	19,7%	11,2%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,0%</b>	<b>12,0%</b>	<b>57,6%</b>	<b>18,3%</b>	<b>9,1%</b>

Fuente: Creado a partir Bases rutinarias SDS enero - febrero 2022

El comportamiento de la malnutrición en este grupo de edad es muy similar en las cuatro localidades, siendo Kennedy de igual manera que en grupo anterior donde mayor prevalencia de malnutrición por deficiencia se presenta, así mismo Kennedy es la localidad donde se presenta mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad seguido por Bosa, al igual que en otros indicadores es importante resaltar que Kennedy es la localidad con mayor número de habitantes.

### 20.4. Malnutrición en Adultos

Los datos que se muestran a continuación corresponden a las bases de datos preliminares suministradas por secretaria Distrital de Salud, a la fecha no se cuentan con las bases correspondientes al mes de marzo.

Tabla 76. Análisis según índice de masa corporal en adulto. Enero – febrero 2022

LOCALIDAD	DELGADEZ	PESO NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
07. Bosa	5%	37%	33%	25%
08. Kennedy	5%	39%	33%	23%
09. Fontibon	5%	38%	34%	22%
16. Puente Aranda	6%	41%	32%	21%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5%</b>	<b>39%</b>	<b>33%</b>	<b>23%</b>

Fuente: Creado a partir Base adulto mayor enero febrero 2022

La localidad de Puente Aranda reporta la mayor prevalencia de delgadez en el adulto y exceso de peso en la localidad de Bosa. El estado nutricional de los adultos potencializa la aparición de enfermedades crónicas repercutiendo directamente en la asistencia a los servicios de salud, aumentando la demanda de los mismos.

#### 20.5. Evento 110 bajo peso al nacer

Los datos que se muestran a continuación corresponden a las bases de datos preliminares suministradas por secretaria Distrital de salud correspondientes de las semanas epidemiológicas 1 a 12 de 2022.



Figura 61. Proporción bajo peso al nacer a término-Evento SIVIGILA 110. Base SIVIGILA evento 110 enero a marzo 2022

De acuerdo al evento 110 se evidenció que el 49% de los casos residen en la localidad de Kennedy, es importante resaltar y dar claridad que es la localidad más grande de la Subred. Seguido de la localidad de Bosa. La menor proporción de casos se encuentran en las localidades de Fontibón y Puente Aranda respectivamente.

## 20.6. Evento 591 - vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por desnutrición

Para el periodo evaluado se presentó un caso de mortalidad asociadas a la desnutrición en la localidad de Bosa, por el cual se generó unidad de análisis y planes de mejora a las UPGD implicadas en la atención del menor.

Tabla 77. Análisis de mortalidad de bases RUAF y base SIVIGILA

<b>MORTALIDAD ASOCIADA A DESNUTRICION</b>	<b>NÚMERO DE CASOS EN RUAF</b>	<b>NÚMERO DE CASOS EN SIVIGILA</b>	<b>% CONCORDANCIA</b>
Enero	1	1	100%
Febrero	0	0	100%
Marzo	0	0	100%

Fuente: Creado a partir de Base RUAF enero –marzo 2022, Base SIVIGILA evento 591 enero – marzo 2022

## **CAPITULO 9: VIGILANCIA COMUNITARIA PARA EL ABORDAJE DE LA SALUD PÚBLICA**

### **21. Notificación Problemáticas Colectivas PCO**

La recepción de las problemáticas colectivas, se capta a través de la notificación directa de la ciudadanía, esta puede ser anónima, o a través de los líderes u organizaciones comunitarias que pueden ser o no Unidad Comunitaria, también en el desarrollo de las asistencias técnicas a las unidades comunitarias o por notificación de otros componentes de VSP.

Para el presente informe pretendemos realizar análisis de la frecuencia de PCO por localidad, distribución por tipo de categoría y por conducta a seguir.




Figura 62. Distribución porcentual de las problemáticas colectivas por localidad año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria.

Para el año 2022 a corte de primer trimestre se han reportado 118 PCO, las Localidades de Kennedy y Puente Aranda presentan un mayor número de casos en la notificación de PCO, aportando un peso del 26% (n=31), estos resultados permiten evidenciar que en estas se han generado nuevas caracterizaciones de UC, y por otro lado, a través de contacto presencial o telefónico con los líderes se han reactivado UC que dentro de la base de censo permanecían inactivas, Las Localidades de Bosa no tuvieron cambios significativos en su comportamiento, la Localidad de Bosa con 25% (n=29) y finalmente la Localidad Fontibón con un 23% (n=27).




Figura 63. Distribución de problemáticas colectivas por categoría, año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria

Las problemáticas que por categoría tuvieron mayor frecuencia durante el primer trimestre del año 2022, fueron: infraestructura vial 16,53% (n=20), seguido de manejo inadecuado de residuos sólidos 14,05% (n=17), y en tercer lugar consumo de SPA 12,40% (n=15), estos tres primeros lugares fueron priorizados abarcando la temática a través de las diferentes actividades de la VCSP y de la canalización intersectorial para generar posibles respuestas de los entes competentes a estas problemáticas

Este comportamiento en donde la categoría infraestructura vial ocupa el primer lugar se genera a partir del deterioro de las vías de los barrios, donde no solo es la presencia de huecos, o la falta de tapas de alcantarilla, sino que las comunidades han notificado vías enteras en mal estado y sin intervención alguna por años. En la segunda categoría, manejo inadecuado de residuos sólidos, se podría explicar en parte a la falta de cultura ciudadana y también a los costos que los operadores tienen para la recolección de los mismos, frente a la primera, la cultura ciudadana, se relaciona a cuando las personas sacan la basura a la calle el día que no corresponde o arrojan residuos sólidos y escombros en sitios no permitidos, afectando el medio ambiente, con malos olores y contaminación del aire y suelo, propiciando posiblemente enfermedades respiratorias. Por otra parte, también se ha percibido en la comunidad que en algunos barrios el servicio prestado por las empresas de aseo es deficiente.

La tercera categoría relevante en el trimestre, se puede observar que la problemática de consumo de sustancias psicoactivas que en el 2021 presentó una frecuencia de 7%, para el primer trimestre del 2022 se incrementó en 12,40%, dejando evidenciar la crisis social y en salud mental que atraviesan las comunidades que ya venían presentando esta problemática, pero que en definitiva se agudizó por

el COVID – 19. Se observa un incremento en la categoría de otro tipo de PCO ambientales observando un 5% en el año 2021, incrementando para el primer trimestre del 2022 en un 8,26%.




Figura 64. Distribución de problemáticas colectivas por Subcategoría, año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria

Las problemáticas que por subcategoría tuvieron mayor frecuencia durante el periodo de enero a marzo fueron, deterioro de la vía, mostrando un comportamiento en el mes de febrero 4,07% (n=5) teniendo un incremento significativo en el mes de marzo 8,94% (n=11). Otra subcategoría que se ha incrementado del mes de febrero a marzo es el consumo de SPA, en el mes de febrero fue de 5,69% (n=7) frente al mes de marzo que fue de 6,50% (n=8), subcategorías como inseguridad 6,50% (n=8) y residuos sólidos 5,69% (n=7) también han tenido un aumento en la notificación, debido, probablemente a esos determinantes sociales de la salud que se han agudizado en sindemia, como los son la falta de empleo, el costo de vida, la falta de cultura ciudadana, y la falta de conciencia ambiental.




Figura 65. Distribución porcentual de conducta a seguir por PCO I trimestre año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022..Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria.

Las problemáticas observadas en la gráfica 48, son orientadas a nivel institucional o intersectorial según corresponda su pertinencia, las mayores frecuencias se presentan a Otra entidad distrital 35,48% (n=44), seguida de GESA con un 25% (n=31), seguido por Otra entidad no distrital con 18,55% (n=23), siendo un comportamiento esperado según tabla de PCO, con intervención oportuna y canalización de las diferentes problemáticas comunitarias intervenidas por el subproceso de VCSP.

## 22. Investigaciones socio epidemiológicas de campo. ISEC

La Investigación Socio epidemiológica de Campo ISEC apunta a tomar decisiones y dar respuesta a una problemática específica identificada a través de las fichas de notificación PCO y requiere de la recolección de información cualitativa y cuantitativa, ejecución de un trabajo de campo en interacción con la comunidad y sus líderes para una comprensión detallada del contexto que condicionan la ocurrencia de los eventos estudiados con un posterior análisis de esta información. Muchas de estas problemáticas no dependen del sector salud, depende de otros sectores dado por la magnitud del evento, realizando el análisis de Determinantes Sociales de la Salud DSS, se evidencia que dar una respuesta asertiva es complejo por la magnitud de los eventos y la población que está inmersa, de igual manera se realiza el proceso de canalización y posicionamiento de las problemáticas colectivas en las diferentes entidades por medio de las articulaciones.

Tabla 78. Determinantes sociales observados en las ISEC. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero a marzo 2022.

DETERMINANTES SOCIALES	ISEC - PCO
Proximales	Estilo de vida, creencias , cultura Costumbres Hábitos de vida cotidiana Falta de visión para el proyecto de vida Falta de sentido de pertenencia Actitud frente al riesgo
Intermedios	Empresas del servicio de basura Acceso a los servicios de salud Movilizaciones sociales Empresas sin responsabilidad social Falta de mantenimiento en vías Acceso a servicios públicos
Estructurales	Políticas públicas Plan de desarrollo local Plan de desarrollo distrital Rubros para vías Falta de continuidad de los procesos a nivel político Falta de oportunidades laborales Falta de una política pública de atención a la población migrante

Fuente: Creado a partir de Base de datos ISEC, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. I trimestre, 2022

Para el periodo estudiado se relacionan las ISEC por Localidad, por mes, por PCO y conducta final y repuesta de la articulación realizada.

Tabla 79. Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Kennedy. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022

RELACION DE ISEC REALIZADAS LOCALIDAD KENNEDY				
PROBLEMÁTICA COLECTIVA Y SUBCATEGORÍA DE PCO	MES	HALLAZGOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LA COMUNIDAD	CONDUCTA FINAL	RESPUESTA INTERSECTORIAL SI / NO
Deficiencia de Servicios Públicos, Transporte & Movilidad.	Febrero	1.la falta de servicio de la estación de tras milenio biblioteca Tintal, genera que las personas que viven en la cercanía tengan que realizar desplazamientos muy largos para acceder al servicio exponiéndonos a los peligros y temas de inseguridad de la zona, sobre todo en horas de la mañana y noche ya que muchos madrugan y	Canalizado a Alcaldía local de Kennedy	No

		algunos y/o llegan tarde en las noches de trabajar o estudiar		
Infraestructura Vial Riesgo Acc, Deterioro	Marzo	<p>En la actualidad la infraestructura vial local se encuentra sometida a un alto flujo vehicular y genera un deterioro de las vías, en muchos sectores de la localidad de Kennedy el estado de deterioro es avanzado, y lo preocupante es que cada día crece más y más la cantidad de vehículos que transitan por la localidad, para esto se hace necesario lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-mantenimiento del espacio público lo cual implica ejecutar proyectos de mantenimiento.</li> <li>-Conservación, rehabilitación y reconstrucción del espacio público que hagan parte de la infraestructura de los Sistemas de Movilidad de la Localidad. (Artículo 3 del Acuerdo 6 de 199.</li> <li>-Efectuar procesos de mantenimiento rutinario y periódico de espacio público.</li> <li>-Realizar actividades de Conservación de espacio público.</li> <li>-Realizar actividades de Mantenimiento Periódico y rutinario de espacio público: -Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil contemplada en el diseño de una estructura, constituyéndose en una práctica preventiva.</li> <li>-Realizar actividades de Reconstrucción de espacio público.</li> </ul>	Canalizado a Alcaldía local de Kennedy	No

		-Capacitar a la comunidad y juntas de acción comunal para que reporten y les realicen seguimiento a las obras públicas realizadas en su localidad, Gobierno Abierto de Bogotá, es una estrategia del Gobierno Distrital para promover la participación incidente de la ciudadanía en la administración de la ciudad.		
--	--	--	--	--

Fuente: Creado a partir de base Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Kennedy. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022

Tabla 80. Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Puente Aranda. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022

<b>RELACION DE ISEC REALIZADAS LOCALIDAD PUENTE ARANDA</b>				
<b>PROBLEMÁTICA COLECTIVA Y SUBCATEGORÍA DE PCO</b>	<b>MES</b>	<b>HALLAZGOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>CONDUCTA FINAL</b>	<b>RESPUESTA INTERSECTORIAL SI / NO</b>
Persona habitante de calle	Enero	A pesar de las instituciones y diferentes programas que existen los resultados en relación a la adherencia a las mismas no son los que se esperan porque simplemente usan los servicios cuando lo requieren, pero siguen en sus rutinas y no desean en su mayoría rehabilitarse o querer mejorar su situación de vida. Se les trata de garantizar los mínimos para que tengan servicios básicos y mejorar su dignidad como personas.	Canalizado a espacio público	No
Otra PCO Inconformidad frente a las condiciones de los alimentos dados en el comedor.	Febrero	Los comedores comunitarios cocinas populares, es una estrategia de seguridad alimentaria que beneficia a muchas personas que no cuentan con los recursos físicos y económicos para preparar	Canalizado a VSA	No

		un alimento y en algunos casos no tienen los elementos para prepararlos por lo tanto este tipo de estrategias asistencialistas le facilitan a las personas tener un alimento seguro en el día y muy posiblemente para muchos sea su único alimento en el día y noche; por tanto la calidad con la que se brinde el alimento debe ser el mejor según lo dispuesto por las normas.		
Otra PCO, Bares en zona residencial afectan con ríñas y ruido a los residentes.	Marzo	Debe existir un mayor seguimiento por parte de las entidades a las que haya lugar para la problemática, no sólo la policía pues no existe control para acatar la norma. La salud ambiental es una dimensión en donde soslayan varios factores, que se pueden convertir en riesgo sino se acude a intervención adecuada en el momento en que se necesita.	Alcaldía Local	En Tramite
Habitante de calle	Marzo	El problema de habitabilidad en calle es un tema bien complejo puesto que afecta no solo a la persona que tiene la problemática como tal sino además a las personas del entorno, debido a las afectaciones en relación a la salubridad, porque hacen sus necesidades fisiológicas al costado de las viviendas y parques, la inseguridad en los sectores, son personas agresivas, el consumo de sustancias psicoactivas, el tema de residuos que generan cuando hace separación y otras situaciones que afectan o molestan a las personas de las zonas.	IDIPRON – SLIS	En Tramite
Invasión espacio publico	Marzo	Una de las formas de ingreso de muchas familias los fines de semana son los asaderos,	ALCALDIA LOCAL – MOVILIDAD	

		y como forma de recuperación de la economía se busca de todas las formas disfrutar de los alimentos en zonas verdes o al aire libre también por temas de protocolos de bioseguridad, no obstante, generan los fines de semana mucho trancón al parquearse en las vías principales y zonas verdes afectando la movilidad de la zona.		
--	--	---	--	--

Creado a partir de base Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Puente Aranda. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022

Tabla 81. Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Fontibón. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022

<b>RELACION DE ISEC REALIZADAS LOCALIDAD FONTIBON</b>				
<b>PROBLEMÁTICA COLECTIVA Y SUBCATEGORÍA DE PCO</b>	<b>MES</b>	<b>HALLAZGOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>CONDUCTA FINAL</b>	<b>RESPUESTA INTERSECTORIAL SI / NO</b>
Artista callejero con problemas sociales y de salud	Febrero	Se determinar que es una problemática poco intervenida por los diferentes entes, que es una población que tiene situaciones tanto sociales como de salud, que afectan negativa la integridad de su vida y de sus familias, pues muchos están sin un sistema de salud, muchas personas deben dedicarse a ello por no contar con un empleo estable y por ser un oficio informal les garantiza tener una ganancia diaria para su sustento; adicionalmente deben exponerse a múltiples factores que ponen en riesgo sus vidas, en el caso de este artista callejero que desarrolla su labor con combustible ACPM se ha visto	SLIS - IPES y se articula con la persona encargada de la política pública de trabajo de la Subred Sur Occidente.	Atendida

		afectado por quemaduras, por deterioro y afectación de sus sistema digestivo por la ingesta voluntaria de esta sustancia que causa progresivamente intoxicación y daños en lo órganos.		
Accidentalidad por robo y/o daño de tapas de alcantarillado	Marzo	Esta es una problemática que afecta gravemente a la población no solo de nuestras localidades sino del distrito en general por ser una situación sensible que atenta contra la integridad de las personas, es causante de accidentes y hasta muertes por las trampas mortales, pues estas alcantarillas sin tapa afectan un gran número a transeúntes y motociclistas particularmente quienes ha perdido sus vidas, asociada la situación está el mal alumbrado del sector, la señalización y la respuesta oportuna para evitar estos accidentes, la situación no es solo responsabilidad de las entidades distritales, también es responsabilidad de las comunidades, de los líderes y de las personas que ejercen el oficio de la recuperación primaria, pues ellos en su afán de conseguir dinero las hurtan y las venden en el mercado negro, las empresas de comunicaciones son uno de los mayores intervinientes en la problemática pues en su trabajo de conexión de redes de	EAAB – Empresas de comunicaciones privadas Invasión de roedores	En tramite

		comunicaciones dejan muchas veces estas trampas mortales que ha cobrado vidas humanas en el sector.		
Invasión de roedores	Marzo	La problemática de la invasión de roedores es una de las situaciones que ha tenido mayor reporte en los últimos meses para la localidad de Fontibón, pero también es una de las problemáticas menormente atendidas por las entidades correspondientes, se determinó durante la aplicación de los instrumentos que estas plagas afectan a residentes, comerciantes, y todo tipo de población, pues estos animales se ven en terrazas, tejados, cableados, cabales de agua, e ingresan a viviendas contaminando y destruyendo lo que encuentran a su paso, en los locales comerciales como restaurantes, panaderías, tiendas, entre otros entran por debajo de las puertas y dañan alimentos, y contaminan elementos de uso diario para el trabajo de estos comerciantes, algunas refieren que en las noches se incrementa esta problemática, pues por el silencio y el poco tránsito de personas salen de alcantarillas e ingresan diferentes inmuebles.	Para esta problemática se hace gestión con la secretaria de ambiente, la Secretaria de Salud y con la referente local de GESA de la Subred; cabe anotar que desde el subsistema de le Vigilancia Comunitaria en Salud Publica en cabeza de la líder de la localidad de Fontibón y el líder operativo, se hizo gestión para fumigación de las zonas verdes y zonas comunes de algunos barrios, teniendo como respuesta efectiva para algunos reportes generados	En Tramite
Habitante de calle en malas condiciones y riesgo para la comunidad.	Marzo	En esta problemática se identificó que el aumento de personas en habitabilidad en calle ha aumentado	Se realiza gestión con la Secretaria de Integración Social, con la	En tramite

		significativamente por múltiples factores de orden social, cultural, familiar, económicos entre otros, pues las dinámicas del país y del entono acentúan que más personas tomen como opción el rebusque y se consuman muchos en acciones que atentan contra su integridad, sean consumidores, comentan delitos como robos hurtos, atracos para subsistir, además la mendicidad como forma de vida se vuela constante, pues las personas de ciertos sectores al ver las condiciones de estas personas deciden ayudarlos, con ropa, comida y otros elementos, además estas personas deciden traer a los cambuches que son sus lugares de residencia a los asentamientos ilegales más personas donde aparte de vivir atentan contra la integridad de un sector o de las comunidades.	referencia local de la política pública de habitante de calle de la Subred.	
--	--	---	---	--

Creado a partir de base Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Fontibon Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022

Tabla 82. Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Bosa. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022

<b>RELACION DE ISEC REALIZADAS LOCALIDAD BOSA</b>				
<b>Problemática colectiva y subcategoría de pco</b>	<b>Mes</b>	<b>Hallazgos de los instrumentos aplicados a la comunidad</b>	<b>conducta final</b>	<b>respuesta intersectorial si / no</b>
Tenencia inadecuada de mascotas	Enero	Para el control adecuado y el control de la tenencia de mascotas es	Articulación con el equipo de política de gestión de la salud ambiental	Si, con asistencia a feria de servicios, pero no se ha

		<p>competencia de las Entidades Territoriales de Salud velar por la responsabilidad sobre tenencia de Animales de compañía en el marco de las líneas operáticas del Plan Decenal de Salud Pública</p> <p>Promoción de la Salud</p> <p>Adelantar estrategias de Información, Educación y Comunicación en Tenencia Responsable de Animales de Compañía y de Producción, dirigidas a la comunidad en general, que involucre intervenciones de protección de los animales y el mejoramiento del entorno donde residen.</p> <p>Identificar, analizar e intervenir los determinantes sociales y ambientales asociados a la Tenencia Inadecuada de Animales de Compañía y de Producción, para</p>		mitigado la problemática.
--	--	--	--	---------------------------

	<p>disminuir los impactos negativos que esta genera en la sociedad y en los mismos entornos en donde la población reside.</p> <p>La salud ambiental es una dimensión en donde soslayan varios factores, que se pueden convertir en riesgo sino se acude a intervención adecuada en el momento en que se necesita.</p> <p>Es importante y urgente la injerencia de actores como la JAC, SDA, Idpyba, Subred Sur Occidente, Uaesp y comunidad en general en aspectos para la sensibilización frente al maltrato animal, el abandono y sí el perro en situación de calle, luego en la incidencia de todos los actores para la respuesta y aporte desde cada una o de manera articulada.</p>		
--	--	--	--

Contaminación por ruido	Febrero	<p>Frente a los hallazgos, debe existir un mayor seguimiento por parte de las entidades a las que haya lugar para la problemática, no sólo la policía pues no existe control para acatar la norma.</p> <p>El ruido puede tener efectos adversos sobre casi la totalidad de los elementos del organismo humano, perjudicando no solo la salud mental sino la salud física, afectando la audición, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema neurovegetativo y el sistema circulatorio.</p> <p>Se recomienda continuar con estrategias de Información, Educación y Comunicación sobre mitigación de la contaminación causada por diferentes fuentes, además de las normas de</p>	Articulación con el equipo de la línea ARREM aire, ruido y radiación electromagnética	<p>Si, respuesta sectorial por parte de la línea AREEM, en donde realizarían visita a dos puntos críticos referidos en la ISEC uno en marzo y el otro en el mes de abril. Los referentes de política asistieron a los puntos críticos en horas de la tarde y no encontraron afectación ya que se trata de dos bares que funcionan en horas de la noche, a partir de las 4 de la tarde hasta las 5am del siguiente día. Aún no se cuenta con el informe de visita de la línea ARREM.</p>
-------------------------	---------	--	---	---

		<p>convivencia para no afectar a los demás.</p> <p>La exposición a altos niveles de ruido no solo afecta la salud auditiva sino también el equilibrio del estado de salud y bienestar de quien está expuesto a tal evento en cuya situación corresponde al ministerio de medio ambiente el desarrollo de políticas enfocadas en el control y prevención de factores desencadenantes de enfermedad.</p>		
Riesgo de accidentalidad vial	Marzo	<p>Es importante efectuar procesos de mantenimiento rutinario y periódico de espacio público, realizar actividades de Conservación de espacio público. - Realizar actividades de Mantenimiento Periódico y rutinario de espacio público: Se define como el conjunto de actividades</p>	<p>Se efectúa el respectivo informe de ISEC. Se solicitó articulación con EAAB y Alcaldía Local de Bosa a través de correo electrónico y también con el referente de política pública para la salud Ambiental para articulación sectorial e intersectorial.</p>	<p>El Acueducto asistió al lugar días antes a tapan el hueco por el llamado realizado por la JAC Manzanares, sin embargo, la vía KR 78G en donde dejaron el hueco, se encuentra destapada, sin pavimentar y en la CL 73H en otro</p>

		<p>tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil contemplada en el diseño de una estructura, constituyéndose en una práctica preventiva. - Realizar actividades de Reconstrucción de espacio público. Desde la VCSP continuar con el empoderamiento comunitario para el reconocimiento, apropiación y reporte de problemáticas colectivas que afecten la salud de la comunidad, la identificación de actores claves sectoriales e intersectoriales para la respuesta y la movilización de oferta y así mitigar situaciones evitables. Se recomienda promover la plataforma de Gobierno Abierto como estrategia distrital para promover la participación ciudadana. A través de esta plataforma, se</p>		<p>arreglo del Acueducto se halló el hundimiento que se menciona en la ISEC, aún no hay respuesta del Acueducto.</p>
--	--	--	--	--

		<p>puede acceder varias acciones concretas para impulsar cambios y mejorar la calidad de vida en el nivel local. Una de las herramientas que pocos conocen, es el reporte de huecos, la cual es de gran utilidad. Lo primero que hay que tener en cuenta, es que la plataforma de gobierno abierto tiene su propia página web, desde donde se puede acceder a los servicios, pero también cuenta con una APP en la que cada ciudadano registrado podrá estar activo a la hora de promover iniciativas para Bogotá.</p> <p>El Acueducto y la Alcaldía deben propender por acciones conjuntas que correspondan al efectivo disfrute de los derechos civiles como lo es el acceso a los servicios públicos, al agua potable, a un ambiente sano,</p>		
--	--	---	--	--

		a pavimentas.	vías	
--	--	------------------	------	--

Creado a partir de base Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Fontibon Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022



Figura 66. Distribución porcentual de PCO según fuente de notificación I trimestre año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria.

Dentro de las fuentes de notificación se puede observar que la fuente JAC aporta el mayor peso en la incidencia de la notificación acumulada con un 30,89% (n=38), seguido por Otra UI con un 29,27% (n=36), en tercer lugar, la fuente Ciudadano con el 21,14% (n=26), se visualiza que es la comunidad organizada con la figura de JAC quien expresa las diferentes situaciones y necesidades de intervención propias de la comunidad.




Figura 67. Distribución porcentual de PCO según estrato socio económico de notificación I trimestre año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria.

El estrato socioeconómico que ha tenido mayor peso porcentual es el estrato cero con un 40,65% (n=50), seguido del estrato dos con un peso porcentual de 31,71% (n=39), y en el estrato tres con un porcentaje de 24,39% (n=30). En estos tres estratos es donde los determinantes sociales estructurales y proximales tiene mayor impacto, generando carencias y afectación en el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.

### 23. Comités de Vigilancia epidemiológica comunitaria (COVECOM)

En cuanto a los Comités de Vigilancia Comunitaria COVECOM, en el cual se promueve la obtención y análisis de información a partir de las percepciones, saberes y necesidades sentidas por la comunidad frente a un tema o problemática, fortaleciendo el empoderamiento de los grupos comunitarios, en el periodo en mención se abordaron los temas en el siguiente orden:

Tabla 83. Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria Localidad Kennedy. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero a marzo I trimestre 2022

COVECOM REALIZADOS ENERO – MARZO LOCALIDAD KENNEDY			
TEMA CENTRAL - TEMAS SECUNDARIOS	# PARTICIPANTES	CURSO DE VIDA	HALLAZGOS RELEVANTES DEL ESPACIO
Mujer, vejez y sexualidad, tres conceptos valiosos para la salud pública	63	Adulto mayor	El desarrollo del COVECOM se pudo realizar cumpliendo con los objetivos propuestos, siendo la participación de la población convocada la razón de ser del comité epidemiológico, logrando extraer la información necesaria para realizar el análisis y las recomendaciones que se requieren para el tema. El libre desarrollo de la sexualidad en las mujeres adultas mayores tiene múltiples factores que inciden en su goce y plenitud, factores como los sociales y culturales, siendo ámbitos en donde diferentes actores sociales intervienen y pueden generar un cambio de forma positiva para la comunidad. Dentro de la intervención se puede evidenciar que para las personas adultas mayores en su gran mayoría indican ser un tema

			importante para ellos, también sobre cuál es la mirada de ellos frente a la sexualidad y como la dinámica cambia según su necesidad y su interés, siendo la sexualidad motivada por lo sentimental y emocional de cada ser, convirtiéndolo en un proceso de amor y de conexiones entre las personas que participan en el acto sexual, siendo el contacto físico como las caricias}, los besos y el dormir juntos una forma de expresar, dejando en segundo plano la necesidad de la relación coital, también se pudo evidenciar que los participantes les falta conocimientos sobre las enfermedades de transmisión sexual y que no suelen usar medios de protección para las relaciones, indicando en algunos que ya no lo necesitan
--	--	--	---

Fuente: Creado a partir de base de seguimiento COVECOM

Tabla 84. Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria Localidad Puente Aranda. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero marzo I trimestre 2022

<b>COVECOM REALIZADOS ENERO – MARZO LOCALIDAD PUENTE ARANDA</b>			
<b>TEMA CENTRAL - TEMAS SECUNDARIOS</b>	<b># PARTICIPANTES</b>	<b>CURSO DE VIDA</b>	<b>HALLAZGOS RELEVANTES DEL ESPACIO</b>
Cambio climático relacionado con las enfermedades	25 personas	Jóvenes	El cambio climático y su relación con los fenómenos de salud presentan variables de conexión que permiten evaluar el impacto a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos vs su incidencia en la aparición de fenómenos como enfermedad respiratoria y enfermedad diarreica aguda. Las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, generando emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas.

Fuente: Creado a partir de base de seguimiento COVECOM

Tabla 85. Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria Localidad Fontibón. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero a marzo I trimestre 2022

<b>COVECOM REALIZADOS ENERO – MARZO LOCALIDAD FONTIBON</b>			
<b>TEMA CENTRAL - TEMAS SECUNDARIOS</b>	<b># PARTICIPANTES</b>	<b>CURSO DE VIDA</b>	<b>HALLAZGOS RELEVANTES DEL ESPACIO</b>
Consumo de frutas y verduras en adultos mayores.	35	Adultos y mayores	<p>Teniendo en cuenta que el comité de Vigilancia epidemiológica es un espacio de generación y análisis de información a partir de las necesidades sentidas de la comunidad que recoge no solo los conocimientos, las experiencias, las necesidades, las vivencias, también busca orientar y dar respuesta a situaciones que han sido identificadas por la comunidad en general y mejorar con ello no solo la calidad sino las condiciones de vida de los mismos. Por ello para el desarrollo de este comité se contó con una participación activa de la población vinculada, siendo un factor favorable para el desarrollo del COVECOM, adicional la temática priorizada fue de interés para los adultos mayores participantes.</p> <p>Se logró determinar que existen una serie de factores y causas que contribuyen al bajo, casi nulo consumo de frutas y verduras, que van desde aspectos estructurales, fisiológicos y psicológicos hasta sociales, económicos y culturales, y al poder identificar estas situaciones se dieron pautas para aumentar el consumo de frutas y verduras y adicionalmente estrategias para fortalecer la salud y mejorar su calidad de vida.</p> <p>Se hizo necesario reforzar con los adultos mayores que participaron en el comité la promoción de la salud mediante el consumo de frutas y verduras, ya que estas brindan un aporte significativo en los cambios ocurridos en el proceso de envejecimiento y solicitar que fueran multiplicadores de esta información con su entorno, sus familias, vecinos y grupos a los que participan.</p>

Fuente: Creado a partir de base de seguimiento COVECOM

Tabla 86. Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria Localidad Bosa. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero marzo I trimestre 2022

<b>COVECOM REALIZADOS ENERO – MARZO LOCALIDAD BOSA</b>			
<b>TEMA CENTRAL - TEMAS SECUNDARIOS</b>	<b># PARTICIPANTES</b>	<b>CURSO DE VIDA</b>	<b>HALLAZGOS RELEVANTES DEL ESPACIO</b>
<b>Enero:</b> Problemática ambiental por mal manejo de residuos sólidos para la comunidad de la Unidad Comunitaria JAC La Primavera Sur	29	Juventud, Adulthood y Vejez	El COVECOM se ejecutó de manera adecuada con participación presencial y virtual, en donde los participantes apreciaron el tema de discusión y análisis, dando sus opiniones, experiencias y sentires, cada uno planteó ideas importantes para la concepción de recomendaciones y propuestas de mejora para mitigar la generación de residuos sólidos en la casa. Sin embargo, la comunidad es consciente que no han sido suficientes las estrategias diseñadas en el tiempo por parte de los diferentes sectores, ya que el buen manejo de los residuos depende de una decisión individual, del nivel de consciencia y también de las voluntades políticas para la obligatoriedad para que las industrias no fabriquen plásticos y hagan reducción del impacto negativo y huella ecológica con la implementación y desarrollado de técnicas de producción sustentables y minimizar la obsolescencia programada.
<b>Marzo:</b> El cuerpo femenino como	24	Juventud y adultez	La ejecución del COVECOM se realizó presencial con la valiosa

<p>propuesta política y la sexualidad como parte del desarrollo humano</p>			<p>participación de mujeres y hombres usuarios del Comedor Comunitario Bosa, y allí cada uno de ellos aportó de manera libre expresiones, sentires, experiencias relacionadas al tema principal, además sus percepciones dejaron ver aspectos que proporcionaron nuevas formas de replantearse el análisis y la discusión.</p> <p>El cuerpo femenino ha estado enmarcado en estereotipos a partir de la sexualización de la mujer ocurriendo ésta cuando es tratada como objeto sexual, señalada o dirigiendo prejuicios al cuerpo en función de sus características físicas y comportamentales por parte de principios arraigados a una cultura dentro de las diferentes instituciones del estado como la iglesia, la escuela, la sociedad o la familia.</p> <p>La sexualidad para el Plan Decenal de Salud Pública, se considera una Dimensión Humana necesaria para el desarrollo de las potencialidades de las personas, de los grupos y las comunidades. Esto significa que los diferentes sectores e intersectores distritales y locales deben aportar desde el que hacer institucional a que la sexualidad se viva libre, plena, responsable y feliz.</p>
--	--	--	--

Fuente: Creado a partir de base de seguimiento COVECOM

## 24. Identificación de riesgos colectivos

Dentro de la Subred Sur Occidente, se continua con el ejercicio de identificación de riesgos colectivos en las diferentes UPZ de cada localidad, es de mencionar que se realiza el ejercicio por UPZ hasta terminar los barrios comunes que la componen.

Con los recorridos barriales no solo se ha logrado identificar los riesgos que vienen generados en cada instrumento, sino además se ha logrado captar unidades comunitarias nuevas para la red de unidades comunitarias de la Subred Sur Occidente y nuevas acciones colectivas de prevención y generación de diferentes procesos relacionados a la salud pública.




Figura 68. Acumulación de Riesgos Total Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base SemafORIZACIÓN identificación de riesgos colectivos año 2022, equipo VCSP

El análisis del comportamiento de los riesgos en las localidades de Fontibón y Puente Aranda deja ver un comportamiento de riesgo bajo con un 87,2% seguido de riesgo medio con 12,8% y no se evidencia riesgo alto.




Figura 69. Porcentaje de acumulación de nivel de riesgos por variable, Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base SemafORIZACIÓN identificación de riesgos colectivos año 2022, equipo VCSP

Dado el comportamiento global del Análisis de Riesgo Barrial en primer lugar encontramos la variable 3.) Manejo inadecuado de los residuos sólidos con una categorización del riesgo de Moderado para una incidencia del 38,5 %; seguido por la variable 4.) Riesgo de violencia con una categorización del riesgo Moderado del 15,4%; en tercer lugar, según importancia del análisis tenemos la variable 6.) Barreras Físicas Movilidad con una categorización de riesgo medio para una incidencia de 7,7% y un riesgo bajo de 92,3%.




Figura 70. Distribución de problemáticas colectivas en la Subred Sur Occidente entre enero a marzo de 2022. Base semaforización riesgos colectivos VCSP, 2022

En el Mapa 7 Distribución de problemáticas colectivas entre enero a marzo de 2022 en la Subred Sur Occidente se evidencia de manera global el comportamiento de los diferentes riesgos en las diferentes UPZ para las localidades de la Subred Sur Occidente.

Para la vigencia primer trimestre de 2022 para los recorridos Barriales se retoma la localidad Kennedy en la UPZ Bavaria, Barrios: Bavaria I sector, Marsella, Marsella Aloha sector norte y Marsella Aloha sector sur, encontrando que al corte de marzo no se presenta ningún nivel de riesgo en ninguna de las categorías, sin embargo, los residentes a través de los profesionales de la VCSP en su recorrido hicieron las siguientes observaciones:

- “El barrio viene sufriendo de cortes frecuentes de agua por lo menos una vez a la semana, no avisan a través de la junta de acción comunal, sino que ponen en algunos negocios y no todos se entera”.
- No cuenta con riesgo de violencia o de agresión interpersonal sin embargo en otras épocas si hubo continuos robos
- Afortunadamente no es un barrio con antecedentes de emergencias y/o desastres
- Las calles están barridas, no hay problemas de residuos, es estética la forma de construcción no hay puntos críticos
- Se evidencia presencia de excretas de perro en 2 andenes, los perros que se observan de raza pitbull están con correa y bozal

- El eje principal kr 71d cuenta con 4 esquinas, en ambas esquinas se encuentra con pared de cuadra (Bavaria y limite barrial) en una vía se ve un poco cuartizada, hay varios árboles todos en buen estado




Figura 71. Acumulación de riesgos Localidad de Kennedy, Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base Semaforización identificación de riesgos colectivos año 2022, equipo VCSP

Para la localidad de Kennedy se identifica un 100% de riesgo Bajo

Para la localidad de PUENTE ARANDA se realizan recorridos barriales en las UPZ SAN RAFAEL en los barrios Milenta, Camelia II sector, Galán, Galán - urb. los Bungaviles y UPZ PUENTE ARANDA, Barrios: Salazar Gómez, centro industrial, Cundinamarca, Orteza y Puente Aranda. Los residentes a través de los profesionales de la VCSP en su recorrido hicieron las siguientes observaciones:

-Falta iluminación por la zona de la tv 53a y por el canal de agua, en los parques roban mucho.

- hay lugares muy oscuros y solos, como las zonas verdes, el barrio solo cuenta con dos ingresos viales y se genera que los ladrones se escabullen y no se puedan perseguir

- Se percibe malos olores cuando llueve, los olores son frecuentes por el canal de aguas residuales y los roedores del mismo ingresan a los conjuntos y viviendas

- Hay una bomba de gasolina cerca al barrio, cables muy pegados a las viviendas de las diferentes empresas, no cuentan con alarma comunitaria ni formación en emergencias y desastres

- Presencia de excretas en la zona sobre todo en andenes, hay muchos caninos con dueño, pero no recogen y en las zonas verdes no hay suficientes canecas.

- El barrio tiene una infraestructura muy cerrada solo tienen dos vías de acceso, es netamente residencial poco comercial muy solitario y hay conjuntos cerrados por el sector.

-Durante el recorrido se evidencia consumo de sustancias psicoactivas, usuario manifiesta que existen paredes rayadas y venta de sustancias

- No se evidencia novedad respecto a riesgo de emergencia y desastres - evidencia recicladores de oficio, los olores se presentan en época de invierno por el río, ausencia de canecas de basura - no se evidencia perros de raza peligrosa, los ciudadanos tienen responsabilidad en la tenencia de animales - sobre la principal se evidencia 6 esquinas, porque no cumple las 8 esquinas por presencia de río Fucha, hace falta de mantenimiento de unidades arbolares, hace falta canecas de basura.

-Las vías están en malas condiciones se evidencia además mucha generación de polvo - se presenta muchos delitos, hurtos es una zona muy solitaria, roban motos y carros - las alcantarillas no funcionan adecuadamente y cuando llueve se encharca e inunda las vías y no hay por donde pasar - malos olores en la zona por las empresas de comida de perro - no es evidente los perros pero si hay excretas en los andenes - La kr 63 17 07 vía destapada personas enfermas por el viento que hace y las empresas se ven afectadas kr 65 17 10 vía en mal estado.






Figura 72. Riesgos Localidad de Kennedy Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base semaforización riesgos colectivos VCSP, 2022

La visualización del mapa de la localidad de Kennedy en la UPZ Bavaria permite mostrar como en el 100% del territorio se evidencia riesgo Bajo para Barreras de movilidad de personas en condición de discapacidad, lo mismo que en deficiencia de servicios públicos, inseguridad, entorno y riesgo de violencia, manejo

inadecuado de residuos sólidos, riesgo general Barrial, emergencias y desastres y tenencia inadecuada de mascotas




Figura 73. Acumulación de Riesgos Localidad Puente Aranda. Subred Sur Occidente I trimestre periodo enero-marzo 2022. Base SemafORIZACIÓN identificación de riesgos colectivos año 2022, equipo VCSP





El análisis de la información recolectada en la localidad de Puente Aranda para el I trimestre de 2022 permite identificar un acumulado de riesgo bajo del 81,6% y un riesgo medio de 18,4%

Tabla 87. Porcentaje de acumulación de nivel de riesgos por variable, Subred Sur Occidente I trimestre periodo enero-marzo 2022

PORCENTAJE DE ACUMULACION DE NIVEL DE RIESGOS POR VARIABLE							
RIESGO COLECTIVO	RIESGO EMERGENCIA DESASTRE	ZONOSIS	RESIDUOS SOLIDOS	RIESGO DE VIOLENCIA	SERVICIOS PÚBLICOS	BARRERAS FIS. MOVILIDAD	SUMATORIA
	100	100	55,3	71,1	94,7	68,4	81,6%
	0	0	44,7	28,9	5,3	31,6	18,4%
	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0%
SD	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>600</b>

Fuente: Creado a partir de base SemafORIZACIÓN identificación de riesgos colectivos año 2022, equipo VCSP

Dado el comportamiento global del Análisis de Riesgo Barrial para la Localidad de Puente Aranda en el I trimestre de 2022 en primer lugar encontramos la variable 3.) Manejo inadecuado de los residuos sólidos muestra un comportamiento de riesgo bajo de 55,3% y una categorización del riesgo de Moderado para una incidencia del 44,7 %; seguido por la variable 6.) Barreras físicas de movilidad muestra un comportamiento de riesgo bajo con 68,4% y una categorización del de riesgo Moderado del 31,6; en tercer lugar tenemos la variable 4.) riesgo de violencia con una categorización de riesgo Moderado para una incidencia del 28,9%.






Figura 74. Localidad de Puente Aranda Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base semaforización riesgos colectivos VCSP, 2022

La visualización del mapa de la localidad de Puente Aranda en la UPZ Puente Aranda, San Rafael y Zona Industrial permite observar que riesgo emergencias y desastres entre riesgo está en el rango medio y riesgo bajo, tenencia inadecuada de mascotas con 100% de riesgo bajo, manejo inadecuado de residuos sólidos con una proporción equivalente de riesgo bajo y medio, inseguridad, entorno y riesgo de violencia en mayoría riesgo bajo y menos riesgo medio, deficiencia de servicios públicos, deficiencia de servicios públicos entre riesgo medio y riesgo bajo, manejo de morbilidad de personas en condición de discapacidad entre riesgo medio y riesgo bajo y riesgo general Barrial entre riesgo medio y riesgo bajo

## CAPITULO 10: ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y ESTADÍSTICAS VITALES – GESTIÓN DEL COMPONENTE

A partir del presente capítulo se pretende analizar la mortalidad infantil ocurrida en las 4 localidades de injerencia de la Subred Sur Occidente (Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda) en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de marzo de 2022.

A partir de lo antes mencionado se inicia con la descripción general de la mortalidad generada a nivel institucional en el mismo trimestre, para ello el gráfico 1 expresa el comportamiento mensual:




Figura 75. Relación de mortalidad general en la Subred Sur Occidente en el primer trimestre de 2022. Descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022

En relación a la mortalidad general, el gráfico anterior revela que el mes con mayor mortalidad correspondió dentro del trimestre al mes de febrero, comportamiento que difiere de lo esperado dado que en el mes de enero se inicia el año con el cuarto pico de la pandemia por COVID 19, aun así, los fallecimientos reportados en este mes fueron menores que los reportados en el mes de febrero. Haciendo un análisis más detallado de la tendencia de las defunciones trimestrales, se puede observar una tendencia a la disminución en este hecho vital, dicha tendencia está marcada por los datos reportados en el mes de marzo donde se evidencian 114 defunciones menos con respecto al mes de febrero, y que posicionan al mes de marzo como el mes con menor mortalidad del trimestre.

Al hacer un análisis por institución en relación al trimestre, la tabla 1 nos permite precisar la siguiente información:

Tabla 88. Defunciones de la Subred Sur Occidente en los meses de enero, febrero y marzo del 2022

<b>INSTITUCIONES</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	2	0	0	2
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA SEDE ALQUERIA	1	1	3	5
IPS CORVESALUD SEDE FONTIBON	1	2	0	3
CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA	29	29	24	82
CLINICA MEDICO QUIRURGICA MANDALAY	9	12	1	22
VIRREY SOLIS I.P.S S.A. AMERICAS	7	9	5	21
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.	114	126	104	344
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. SUCURSAL BOGOTA	78	66	61	205
CLINICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A.	2	1	0	3
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL S.A.S. IPS	2	0	0	2
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRE	0	4	2	6
CLINICA MEDICAL S.A.S.	19	37	23	79
COMPANIA CALIDAD Y CUIDADO EN SALUD S A S SIGLA COMPCASA SAS	1	2	1	4
EPS SANITAS UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA	3	2	0	5
GIMNASIO GOLEMAN	55	51	38	144
HEALTH & LIFE IPS SAS SEDE MONTEVIDEO	14	25	11	50
IPS SURA PLAZA CENTRAL	7	9	12	28
MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	2	1	1	4
SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S. A. S.	0	2	1	3
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALÁN	1	3	1	5
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO BONITO	4	1	4	9
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BOSA	20	22	20	62
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD FONTIBÓN	39	42	38	119
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	136	140	125	401
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PABLO VI BOSA	5	6	5	16
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO TINTAL	1	1	0	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>552</b>	<b>594</b>	<b>480</b>	<b>1626</b>

Fuente: Creado a partir de descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022

Las instituciones con mayor número de defunciones para el trimestre están ubicadas en la localidad de Kennedy y corresponden a UPGD como USS Occidente de Kennedy, Clínica del Occidente, Empresa de medicina integral EMI S.A. sucursal Bogotá, Clínica Colsubsidio Ciudad de Roma, entre otras, si notamos son instituciones que tienen ubicación geográfica en la localidad de Kennedy y que, si son analizados los casos por ocurrencia, aportan un gran número de hechos vitales a esta localidad.

En ese sentido el mapa continuación, nos permite tener un panorama general del número de defunciones según la ubicación geográfica en nuestras cuatro localidades:




Figura 763. Relación de casos de defunciones del primer trimestre de 2022 por localidad de residencia. Descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022

De la información anterior se puede evidenciar que la localidad con mayor número de defunciones es la localidad de Kennedy, información que ratifica la ubicación de las instituciones y que nos permite entrever que existe una estrecha relación entre el número de instituciones por localidad y la cobertura alcanzada para el reporte de los hechos vitales.

Asimismo, la información muestra que UPZ como Patio Bonito y Timiza en la localidad de Kennedy son las que reportan más hechos vitales en el trimestre.

## 25. Análisis de mortalidad infantil

Para este boletín la mortalidad infantil comprende todas las muertes ocurridas en menores de 11 años que específicamente residen en las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, en este contexto, al aterrizar el análisis de mortalidad a la población infantil, los datos muestran de forma general la siguiente información:




Figura 774. Relación de mortalidad infantil por meses de ocurrencia del periodo comprendido entre enero a marzo de 2022 ajustado por muerte fetal y no fetal. Descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022

La grafica anterior nos permite evidenciar que el comportamiento de las mortalidades en población infantil, no experimenta el mismo comportamiento de las mortalidades generales, marcando una disminución en el mes de marzo con respecto al mes anterior, pero experimentando una disminución mucho mayor en el mes de enero. Al detallar el análisis por localidad, la tabla a continuación permite ver que a pesar que los casos disminuyen notablemente en el indicador para este trimestre, se evidencia en su orden que las localidades con mayor número de defunciones son Kennedy y Bosa con proporciones de 48% y 32% respectivamente. Esta información puede ser precisada en mayor detalle a través del mapa a continuación, donde se relacionan la ubicación de cada una de las mortalidades de población infantil pertenecientes a nuestras localidades en los meses de enero a marzo del 2022:




Figura 75. Relación de la mortalidad general de la Subred Sur Occidente. Descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022

De forma general se puede precisar que la mortalidad infantil, generalmente se produce en la localidad de Bosa, y la zona de la localidad de Kennedy que colinda con la localidad de Bosa, el mayor número de muertes de población infantil se generaron en la UPZ de Gran Britania y patio Bonito de la localidad de Kennedy.

De la distribución de la mortalidad infantil, se puede evidenciar una asociación con el estrato socioeconómico, ya que las localidades y UPZ donde se generaron mayor número de casos, corresponden a los estratos socioeconómicos más bajos de la Subred Sur Occidente.

Asimismo, al comparar los indicadores de mortalidad ajustados por los meses de ocurrencia, se puede observar que el mes donde se presentó mayor número de muertes fue el mes de febrero, pero el indicador que genera mayor mortalidad corresponde a la mortalidad perinatal, es decir, la causa del fallecimiento está

asociada con condiciones previas al nacimiento principalmente, la tabla a continuación describe con mayor detalle el comportamiento antes mencionado:

Tabla 89. Comportamiento de las defunciones, según indicadores de mortalidad infantil por mes de ocurrencia.

INSTITUCIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Neonatal	6	10	3	19
Perinatal	14	22	19	55
Menor de 1 año	12	11	9	32
Menor de 5 años	14	14	11	39

Fuente: Creado a partir de descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022

Así mismo, al analizar las causas de muerte de forma individual se puede observar que mas del 60% de los fallecimientos estaban relacionados con prematuridad extrema y otros defectos congénitos. La distribución entre femenino y masculino de la mortalidad estaba dividido en proporciones de 43% y 57% respectivamente, lo que nos permite evidenciar que principalmente murieron niños en comparación con las niñas, estos datos son coherentes con las edades del fallecimiento y el indicador que está afectando, y permite desde ya alertar sobre la efectividad de los programas de atención a mujer gestante que se están desarrollando en estas localidades. Finalmente, al hacer un cruce con las edades de las madres, se puede evidenciar que esta no tiene un comportamiento que permita establecer una relación de tendencia de los datos, principalmente las edades de las madres tienen un comportamiento irregular que se puede ver en detalle a continuación:




Figura 75. Relación de mortalidad infantil por edad de la madre del periodo comprendido entre enero a marzo de 2022.Descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022

De lo anterior se puede observar que la mayor proporción de mortalidad infantil, se presentó en hijos de mujeres entre los 21 y 23 años, datos que no marcan una tendencia en el dato pero que puede representar la proporción de edades en que las mujeres de estas localidades se embarazan, de las cual evidencia que la edad promedio es de 27 años.

## CONCLUSIONES

- Debido a la pandemia el evento más relevante es el 346 pero sumado con todas las medidas de protección para la mitigación del mismo se observó una disminución en los eventos de interés en salud pública rutinarios de la vigilancia a semana epidemiológica 13 del año 2020 – 2021.
- Se evidencia el cumplimiento de los lineamientos y protocolos nacionales con criterios de calidad, veracidad, oportunidad y ajuste de la información notificada, teniendo en cuenta. De acuerdo con la proporción de eventos notificados en el aplicativo SIVIGILA. Lo cual se relaciona con la alerta instaurada por medio de la Circular 036 de 2018 con respecto a estos últimos eventos.
- La notificación de eventos transmisibles, principalmente de alto impacto en comparación con el año anterior ha sufrido una variación significativa con tendencia al aumento en la notificación de los Síndrome de rubeola congénita SRC y Tosferina y una disminución de los Eventos Prevenibles por Vacuna (EPV), reflejado de la misma manera en las unidades de análisis, esto dado por la correcta notificación de dichos eventos, evidenciando una reactivación en la notificación por medio de la búsqueda activa institucional.
- Se evidencia que gracias a la capacitación y compromiso del equipo se ha aumentado el indicador en cuanto a las intervenciones oportunas y efectivas tanto para IEC, bloqueos y unidades de análisis.
- Desde el subsistema transmisibles se realiza un seguimiento oportuno y verificación de cumplimiento para establecer y priorizar UPGD críticas que requieran de asistencia técnica, así mismo se realiza seguimiento a planes de mejora y se brinda acompañamiento desde BAI lo cual ha permitido que las acciones se den con mayor oportunidad y calidad en los meses de enero a marzo, dado que para el mes de diciembre se evidencio una disminución de la oportunidad por los tiempos de descanso de los profesionales encargados en las diferentes IPS públicas y privadas, por lo cual se están empleando estrategias para corregir este hallazgo.
- La localidad de Fontibón presenta una tasa de 2,2 casos activos para COVID19 siendo la mas alta de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Suroccidente.
- Puente Aranda presenta una tasa de letalidad de 2 con 653 casos por 100.000 casos hab para COVID19 siendo la más alta de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Suroccidente.
- El ciclo vital que presenta mayor proporción es adultez con 272659 personas.
- Se evidencia descenso de notificación de evento 346 en el mes de marzo, es importante aclarar que la toma de muestra se está realizando en población priorizada.
- Se evidencia que, para el año en curso se ha reportado una disminución del 90% con relación al reporte y ocurrencia de los eventos adversos graves posterior a la vacunación, haciendo énfasis en el reporte de los eventos 298 del año 2021, con los biológicos de inmunización para la prevención del COVID-19.
- Para el primer trimestre del 2022 los eventos con mayor número de casos atendidos por los equipos de respuesta inmediata corresponden a COVID19 siendo los brotes familiares los que más casos se atendieron, la Enfermedad

Respiratoria Aguda se presentó en los centros educativos identificando el aumento del número de casos en jardines infantiles y colegios en población de primera infancia. La localidad de Kennedy continúa aportando el porcentaje más alto en la atención de brotes con el 31,1%.

- Se realiza seguimiento al indicador del proceso cumpliendo con el 100% ante la identificación de eventos ESPII presentados durante el trimestre, atendido de manera oportuna.
- Ingresaron al Subsistema de vigilancia epidemiológica Ocupacional SIVISTRA, un total de 270 trabajadores del sector informal; de estos trabajadores el 54% (n=147) ingresan al subsistema por evento de probable enfermedad, el 22% (n=60) ingresan por evento sospecha de accidente y el 63% (=23) ingresan solo por caracterización de condición de Riesgo Químico sin presencia de evento asociado.
- El 58,9% de los trabajadores que ingresaron al subsistema de vigilancia epidemiológica Ocupacional SIVISTRA, pertenecen al sexo masculino y el 41,1% son del sexo femenino, situación que depende de factores como la notificación recibida al subsistema o la priorización que haya generado el profesional en cada Localidad.
- Como resultado de las Investigaciones Epidemiológicas de Campo realizadas por el Subsistema SIVISTRA, el 100% de las sospechas de accidentes fueron determinadas como muy probables, lo que indica que se evidenciaron suficientes elementos frente a las condiciones laborales, para determinar que habían sido estas responsables del evento generado.
- Frente a las investigaciones epidemiológicas de campo realizadas por enfermedad con posible origen laboral, el nivel de probabilidad fue considerado al igual que en los accidentes en el 100% de los eventos investigados.
- El tener una probabilidad del 100% frente a los eventos investigados por el Subsistema SIVISTRA (ACCIDENTE Y ENFERMEDAD), demuestra que cada vez se tiene mayor apropiación de los conceptos del Subsistema por parte de las diferentes fuentes de notificación, quienes logran identificar aquellos eventos que son de interés y que cumplen con criterios para ser notificados.
- Frente al comportamiento de los eventos investigados en relación con el sexo de los trabajadores, los hombres se accidentan más, siendo el 78,3% del total y en cuanto a las Enfermedades son las mujeres las que más aportan con el 62,5%.
- El 13% (n=35) de los trabajadores informales que ingresaron al subsistema durante el período informado en el actual boletín, son personas migrantes venezolanos, de los cuales el 91,4% (n=32) no tienen aseguramiento en salud.
- El 13,7% (n=37) de los trabajadores que ingresaron al Subsistema SIVISTRA en el I semestre de 2022, no se encuentran asegurados en salud.
- Al Sistema general de pensiones se encuentran afiliados tan solo el 9,6% (n=26) de los trabajadores que ingresaron al subsistema durante el I trimestre del 2022.
- Los 5 casos notificados por las diferentes UPGD durante el primer trimestre del año 2022 no se evidencian segundas neoplasias ni recaídas para el evento 115.

- De los casos de cáncer en menores de 18 años notificados al SIVIGILA en el período evaluado se ha tenido dificultad para el ajuste en el aplicativo SIVIGILA dentro de las 4 semanas ya que a pesar de que se han solicitado los soportes las EAPB y UPGD no los han enviado y también se han presentado fallas en el aplicativo ya que no se reflejan los ajustes realizados.
- De los 263 casos notificados por las UPGD de la Subred Sur Occidente con diagnóstico de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino el 65,0% (n=171) se encuentran sin inicio de tratamiento, dato que deben fortalecer las EAPB realizando el respectivo ajuste en el aplicativo SIVIGILA, de igual manera algunos ajustes no se ven reflejados, los cuales se deben revisar y verificar si hay fallas en el aplicativo SIVIGILA.
- El 100% de los casos de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer en menores de 18 años se encuentran asegurados al régimen de seguridad social en salud, por lo tanto, no se deberían presentar barreras en el acceso a los servicios de salud.
- En comparación al trimestre pasado la notificación de los eventos 115 y 155 han aumentado en un 6,8% (n=34) lo cual facilita el cumplimiento de las IEC (Investigaciones Epidemiológicas de Campo).
- En el trimestre se evidencia que las enfermedades de la cavidad bucal son procesos que son consecuentes a diversos factores que rodean al individuo, incluye entre otros los factores sociales, culturales, y económicos. En el mismo sentido se observa el aumento de las alertas en salud oral y generando la hipótesis de situación de riesgo potencial para la salud de la población identificado en la marcha propia del trasegar en la vigilancia centinela.
- Dados los resultados se sugiere una intervención más exhaustiva por parte de la SDS y principalmente de las EAPB a la población con alerta en salud oral encaminado hacia la población de primera infancia, juventud y adultos, desarrollando estrategias de seguimiento y control, así como el incremento en las acciones de promoción y detección temprana de la enfermedad. Por consiguiente; se debe realizar la verificación de parte del ente rector de la SDS hacia las EAPB con el fin de identificar el cumplimiento de las acciones normadas incluidas las de promoción, prevención y cumplimiento del plan obligatorio de salud junto con las acciones complementarias para el mejoramiento y mantenimiento de la salud oral.
- Para el trimestre enero – marzo 2022 se identificaron 993 personas con discapacidad positivas por COVID-19, con un aumento de 875 casos en comparación con el trimestre anterior, donde se identificaron 118 casos, con una disminución para el mes de marzo donde solo se identificaron 40 casos, situación relacionada con la adherencia a los protocolos de autocuidado y el esquema de vacunación. La localidad con mayor tasa de prevalencia es Puente Aranda con un 0,07%.
- Se identificaron 235 personas con discapacidad positivas por COVID-19 en alta dependencia, donde se caracterizaron 38 cuidadores, de los cuales el 86.8% (n=33) son mujeres, principalmente representadas por el parentesco de madre, esposa, hija y abuela.
-

- : Se realizó seguimiento a 48 casos de cohortes de eventos congénitos durante el trimestre con un incremento en 22 casos con respecto al trimestre octubre – diciembre 2021. Concentrándose en el seguimiento de usuarios notificados por el evento 215 - Defectos Congénitos: el 45,8% (n=22) malformaciones congénitas, 41,7% (n=20) defecto metabólico (Hipotiroidismo congénito) y el 12,5% (n=6) síndrome cromosómico (Síndrome de Down).

## LISTA DE TABLAS

<i>Tabla 1. Calidad del dato espacial de las violencias intrafamiliares en ciclo de vida vejez en la localidad de Puente Aranda 2020 -2021</i> .....	4
Tabla 2. Objetivos específicos y variables.....	5
Tabla 3. Tipos de violencia intrafamiliar en ciclo de vida vejez. Localidad de Puente Aranda.....	6
Tabla 4. Nivel educativo personas curso de vida vejez en la localidad de Puente Aranda en los años 2020 y 2021 .....	8
Tabla 5. Relación de las víctimas en curso de vida vejez con el agresor en la de localidad de Puente Aranda 2020 y 2021 .....	8
Tabla 6. Relación de las víctimas en curso de vida vejez con el agresor en la localidad de Puente Aranda en los años 2020 y 2021 .....	9
Tabla 7. Condición de residencia en casos captados por SIVIGILA Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.....	19
Tabla 8. Distribución y Comparación de eventos Notificados al Aplicativo SIVIGILA. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2021 -2022 .....	20
Tabla 9. Distribución de eventos captados según régimen de afiliación a salud. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022 .....	22
Tabla 10. Distribución de casos de mortalidad por IRA en menor de 5 años por localidad de ocurrencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.....	25
Tabla 11. Número de unidades de análisis por eventos transmisibles por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. ....	28
Tabla 12. Indicadores Casos Positivos COVID 19 por Residencia Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022.....	32
Tabla 13. Distribución Casos Positivos COVID 19 por Ubicación Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022.....	35
Tabla 14. Eventos atendidos por semana epidemiológica. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero- marzo 2022 .....	40
Tabla 15. Eventos atendidos por tipo de establecimiento. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero - marzo 2022 .....	40
Tabla 16. Comunicación del Riesgo en Terminales Portuarias Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero – marzo 2022.....	43
Tabla 17. Distribución de eventos por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. ....	43
Tabla 18. Distribución de condiciones de riesgo por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.....	44
Tabla 19. Ocupaciones con Riesgo más elevado por exposición a condiciones biomecánicas y químicas. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.....	45

Tabla 20. Distribución de condiciones sociodemográficas y por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.....	46
Tabla 21. Distribución de condiciones socioeconómicas y por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.....	49
Tabla 22. Distribución por tipo de lesión y parte del cuerpo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.....	50
Tabla 23. Distribución por Sistema comprometido y agente asociado a Enfermedad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022 .....	53
Tabla 24. Eventos Notificados al SIVIGILA de cáncer en menores de 18 años por ocurrencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero a marzo 2022. ....	56
Tabla 25. Eventos notificados de cáncer en menores de 18 años por momento de curso de vida, sexo y localidad por ocurrencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. ....	57
Tabla 26. Eventos notificados de cáncer de mama por momento de curso de vida y localidad de Residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. ....	62
Tabla 27. Eventos notificados de cáncer de Cuello Uterino por momento de curso de vida, sexo y localidad de Residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. ....	66
Tabla 28. Distribución de eventos de notificación del SISVESO por localidad, Primer trimestre de 2022. ....	70
Tabla 29. Distribución de eventos de notificación del SISVESO por localidad y sexo, Primer trimestre de 2022. ....	71
Tabla 30. Distribución de eventos de notificación del SISVESO por curso de vida y sexo, Primer trimestre de 2022. ....	72
Tabla 31. Distribución de eventos de notificación del SISVESO por localidad y régimen de afiliación, primer trimestre de 2022.....	75
Tabla 32. Clasificación del riesgo.....	77
Tabla 33. Porcentaje de Personas con Discapacidad Positivas por COVID-19 según Régimen de Afiliación en Salud, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022 .....	80
Tabla 34. Porcentaje de Personas con Discapacidad positivas por COVID-19 según alteración, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022 .....	81
Tabla 35. Caracterización de Personas con Discapacidad Positivas por COVID-19 en alta dependencia, según localidad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022 .....	81
Tabla 36. Casos y razón de Mortalidad Materna, primer trimestre (enero – marzo) de 2022. ....	89
Tabla 37. Casos de Morbilidad Materna Extrema según las 8 causas principales agrupadas .....	89

Tabla 38. Casos y tasas de Mortalidad Perinatal. I trimestre de 2022.....	91
Tabla 39. Casos y Razón de Sífilis gestacional, I trimestre de 2022 .....	91
Tabla 40. Casos y Prevalencia de Sífilis Congénita. I trimestre de 2022.....	92
Tabla 41. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por localidad, upz, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente. ....	93
Tabla 42. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por localidad, pertenecía étnica, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente. ....	94
Tabla 43. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por grupo poblacional, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente. ....	95
Tabla 44. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por régimen de aseguramiento, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente. ....	96
Tabla 45. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por curso de vida, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente. ....	97
Tabla 46. Eventos de intento de suicidio, distribuidos por frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente.....	97
Tabla 47. Eventos de intento de suicidio y amenaza, distribuidos por escenario, frecuencias absolutas y relativas. Enero – marzo 2022, Subred Sur Occidente. ..	98
Tabla 48. Violencias trazadoras para el SIVIM en casos efectivos distribuidos por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero - marzo 2022. ....	99
Tabla 49. Distribución de casos según localidad y UPZ para violencia intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.....	100
Tabla 50. Violencia intrafamiliar según tipo Pertenencia Étnica y localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022.....	101
Tabla 51. Violencia intrafamiliar según Grupo Poblacional y localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2021.....	102
Tabla 52. IEC de violencia intrafamiliar según tipo de violencia, curso de vida y sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. ..	103
Tabla 53. Violencia intrafamiliar según tipo de Aseguramiento y localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero - marzo 2022. ....	103
Tabla 54. Notificación de eventos SIVIM, distribuidos por mes, localidad y variación porcentual. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2021. ....	104
Tabla 55. Distribución de casos notificados al VESPA, según localidad de residencia, sexo y curso de vida Subred Sur Occidente, enero a marzo 2022. ..	104

Tabla 56. Características sociodemográficas de la población con consumo de sustancias psicoactivas Subred Sur Occidente, Enero a Marzo 2022.....	105
Tabla 57. Distribución de casos notificados según UPZ y Sexo en la Subred Sur Occidente, I Trimestre 2022 .....	106
Tabla 58. Tipo droga de inicio por localidad en la Subred Sur Occidente, Enero a Marzo 2022 .....	107
Tabla 59. Distribución de casos de abuso de SPA según curso de vida edad de inicio y sexo por percentil 25, 50 y 75 para las 5 sustancias de mayor frecuencia de consumo durante el Enero - Marzo 2022 .....	109
Tabla 60. Distribución de casos quemaduras y accidentes domésticos Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022.....	112
Tabla 61. Distribución de accidentes domésticos y quemaduras según curso de vida y sexo Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022 .....	112
Tabla 62. Distribución de accidentes domésticos según tipo de mecanismo implicado, grupo de edad y sexo de la Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022 .....	113
Tabla 63. Distribución de quemaduras según tipo de mecanismo implicado, grupo de edad y sexo de la Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022.....	115
Tabla 64. Distribución de accidentes domésticos según localidad y UPZ.....	118
Tabla 65. Distribución de quemaduras según localidad y UPZ Subred Sur Occidente Enero a Marzo 2022.....	119
Tabla 66. Lesiones intencionales según localidad y sexo, Subred Sur Occidente Enero- Marzo 2022.....	120
Tabla 67. Lesiones NO Intencionales, según localidad y sexo, distribuido por frecuencias absolutas y relativas Subred Sur Occidente Enero – Marzo 2022 ...	121
Tabla 68. Tipo de lesión intencional, según mecanismo y sexo Subred Sur Occidente 1° trimestre 2022.....	121
Tabla 69. Tipo de lesión NO intencional, según mecanismo y sexo Subred Sur Occidente 1° trimestre 2022.....	122
Tabla 70. Tipo de lesión intencional, según escenario y sexo, Subred Sur Occidente Enero – Marzo 2022.....	122
Tabla 71. Tipo de lesión No intencional, según escenario y sexo, Subred Sur Occidente 1° trimestre 2022.....	123
Tabla 72. Tipo de lesión, curso de vida y sexo, Subred Sur Occidente Enero- Marzo 2022 .....	123
Tabla 73. Análisis de desnutrición aguda, riesgo de desnutrición aguda y exceso de peso en menores de 5 años .....	125
Tabla 74. Número de casos notificados por localidades del evento 113.....	125
Tabla 75. Análisis según índice de masa corporal en menores de 5 a 17 años.	127
Tabla 76. Análisis según índice de masa corporal en adulto. Enero – febrero 2022 .....	128
Tabla 77. Análisis de mortalidad de bases RUAF y base SIVIGILA .....	129

Tabla 78. Determinantes sociales observados en las ISEC. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero a marzo 2022.....	134
Tabla 79. Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Kennedy. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022 .....	134
Tabla 80. Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Puente Aranda. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022 .....	136
Tabla 81. Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Fontibón. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022 .....	138
Tabla 82. Investigaciones epidemiológicas de campo Localidad Bosa. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero abril I trimestre 2022 .....	141
Tabla 83. Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria Localidad Kennedy. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero a marzo I trimestre 2022 .....	149
Tabla 84. Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria Localidad Puente Aranda. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero marzo I trimestre 2022.....	150
Tabla 85. Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria Localidad Fontibón. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero a marzo I trimestre 2022 .....	151
Tabla 86. Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria Localidad Bosa. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero marzo I trimestre 2022 .....	152
Tabla 87. Porcentaje de acumulación de nivel de riesgos por variable, Subred Sur Occidente I trimestre periodo enero-marzo 2022 .....	160
Tabla 88. Defunciones de la Subred Sur Occidente en los meses de enero, febrero y marzo del 2022.....	163
Tabla 89. Comportamiento de las defunciones, según indicadores de mortalidad infantil por mes de ocurrencia. ....	168

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Nivel de aseguramiento de las personas en curso de vida vejez localidad de Puente Aranda en los años 2020 y 2021.....	7
Figura 2. Violencia intrafamiliar en ciclo vital vejez en los años 2020 y 2021 en la localidad de Puente Aranda. Subred Sur Occidente 2022, Base de datos SIVIM cerrada 2020 y preliminar 2021.....	10
Figura 3 Tipos de violencia intrafamiliar en ciclo vital vejez y casos de Covid 19, en Puente Aranda en los años 2020 y 2021. Subred Sur Occidente 2022, Base de datos SIVIM cerrada 2020 y preliminar 2021.....	11
Figura 4. Número de eventos transmisibles captados, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo del 2022. SIVIGILA local, Base SIVIGILA Preliminar del 12/04/2022.....	19
Figura 5. Número de eventos transmisibles alto impacto notificados por localidad de residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022.....	24
Figura 6. Número de eventos transmisibles control notificados por localidad de residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022.....	24
Figura 7. Distribución casos tuberculosis por residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022.....	26
Figura 8. Bloqueos realizados por el componente transmisibles por localidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022.....	27
Figura 9. Distribución de bloqueos por residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo 2022. Base asignación IEC transmisibles Subred Sur Occidente enero a marzo de 2022.....	28
Figura 10. Casos positivos COVID-19, casos diarios por localidad de residencia, SISO marzo de 2020 a 29 de diciembre de 2021-por fecha de diagnóstico. Base COVID-19, diciembre 2021.....	30
Figura 11. Comportamiento COVID Subred Sur Occidente Enero a marzo del 2022. Base de Positivos Secretaria de Salud Corte marzo 31 2022.....	30
Figura 12. Comportamiento COVID 19 Curso de Vida y Sexo Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022. Base de Positivos Secretaria de Salud Corte marzo 31 2022.....	31
Figura 13. Distribución de comportamiento de casos activos de COVID 19 según UPZ de la Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022. Base de Positivos Secretaria de Salud Corte marzo 31 2022.....	33

Figura 14. Distribución de comportamiento de casos fallecidos de COVID 19 según UPZ de la Subred Sur Occidente Enero a marzo 2022. Base COVID-19, marzo 2022 .....	34
Figura 15. Distribución COVID 19 Casos Presentados Diarios vs Positivos Sur Occidente Enero a marzo 2021 vs 2022. Base COVID-19, marzo 2022.....	35
Figura 16. Intervenciones epidemiológicas de campo de COVID-19 por mes, Subred Sur Occidente, enero a marzo 2022. Base IEC COVID-19, marzo 2022 .....	36
Figura 17. Seguimientos de COVID-19 por mes, Subred Sur Occidente, enero a marzo 2022. Base de seguimientos COVID-19, marzo 2022.....	36
Figura 18. Distribución EAPV presentados según notificación en SIVIGILA en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Enero a marzo 2022.Base EAPV COVID-19, marzo 2022 .....	37
Figura 19. Distribución EAPV Clasificación grave según notificación en SIVIGILA en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Enero a marzo 2022. Base EAPV COVID-19, marzo 2022 .....	37
Figura 20. Distribución de brotes de COVID19 por UPZ y ciclo de vida atendidos por ERI. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero- marzo 2022. Base UYE, Subred Sur Occidente, enero marzo 2022.....	39
Figura 21. Sintomáticos respiratorios identificados en Terminales Portuarios Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero – marzo 2022.Base Sintomáticos respiratorios. Vigilancia Puntos de Entrada. Subred Sur Occidente, VSP, enero-marzo 2022.....	41
Figura 22. Positividad en muestreo aleatorio Terminales Portuarios Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero – marzo 2022.Bases muestreo aleatorio. Vigilancia Puntos de Entrada. Subred Sur Occidente, VSP, enero-marzo 2022. ....	42
Figura 23. Distribución de casos sospechosos de accidentes con probable origen ocupacional en el primer trimestre de 2022. SIVISTRA. Base de Datos Secretaria Distrital de Salud. ....	54
Figura 24. Distribución con grado de lesión de casos sospechosos de accidentes con probable origen ocupacional en el primer trimestre de 2022. SIVISTRA. Base de Datos Secretaria Distrital de Salud.....	55
Figura 25. Eventos de Cáncer en menores de 18 años notificados por grupo quinquenal y sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero a marzo de 2022.Bases Distritales SIVIGILA.....	57
Figura 26. Eventos de Cáncer en menores de 18 años notificados por residencia. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	58
Figura 27. Cáncer en menores de 18 años según régimen de afiliación. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022.Bases Distritales SIVIGILA.....	58

Figura 28. Eventos notificados por tipo de cáncer en menores de 18 años. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	59
Figura 29. Eventos notificados de cáncer de mama por localidad de ocurrencia y mes. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	61
Figura 30. Cáncer de mama según grupo de edad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	61
Figura 31. Cáncer de mama según régimen de afiliación. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	62
Figura 32. Distribución de tipo de cáncer de mama según histopatología. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	63
Figura 33. Oportunidad de toma y resultado de biopsia para cáncer de mama. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	63
Figura 34. Oportunidad para implantar el tratamiento de cáncer de mama. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	64
Figura 35. Eventos notificados de cáncer de Cuello Uterino por localidad de ocurrencia y mes. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	65
Figura 36. Cáncer de cuello uterino según grupo de edad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	65
Figura 37. Cáncer de cuello uterino según régimen de afiliación. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	66
Figura 38. Distribución de tipo de cáncer de cuello uterino según histopatología. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	67
Figura 39. Oportunidad de toma y resultado de biopsia para cáncer de cuello uterino. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	67
Figura 40. Oportunidad para implantar el tratamiento de cáncer de cuello uterino. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Enero a marzo de 2022. Bases Distritales SIVIGILA.....	68
Figura 41. Distribución de casos de cáncer de cuello uterino y oportunidad en el diagnóstico en el primer trimestre de 2022. Bases Distritales SIVIGILA, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.....	69

Figura 42. Distribución del porcentaje de Notificación por Sexo. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema SISVESO Primer Trimestre – 2022. ....	70
Figura 43. Distribución de población captada con alerta en salud oral según curso de vida. Primer trimestre 2022. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema SISVESO.....	73
Figura 44. Distribución del porcentaje, población con estado de higiene oral primer trimestre 2022. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema SISVESO enero – marzo 2022.....	74
Figura 45. Distribución del porcentaje de la población que presentan alerta en salud Oral. Primer trimestre 2022. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema SISVESO.....	75
Figura 46. Distribución del Uso diario de elementos de higiene oral, primer trimestre 2022. Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC subsistema – SISVESO.....	76
Figura 47. Número de Casos de PCD Positivas por COVID-19 según localidad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19.....	78
Figura 48. Tasa de Prevalencia por COVID-19 en PCD según localidad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022 Base de seguimiento PCD COVID-19.....	78
Figura 49. Variación en la identificación de Personas con Discapacidad Positivas por COVID-19, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022 Base de seguimiento PCD COVID-19.....	79
Figura 50. Número de Personas con Discapacidad Positivas COVID-19, según sexo y curso de vida, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19.....	79
Figura 51. Número de Cuidadores de PCD Positivas por COVID-19 en Alta Dependencia, según sexo y curso de vida, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19 .....	82
Figura 52. Porcentaje de Cuidadores de PCD Positivas por COVID-19 en Alta Dependencia, según tiempo de dedicación, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19. ....	83
Figura 53. Porcentaje de Seguimiento a Cohortes, según tipo de defecto congénito, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD .....	84
Figura 54. Porcentaje de Seguimiento a Cohortes Eventos Congénitos, según localidad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD. ..	84

Figura 55. Porcentaje de Seguimiento a Cohortes Eventos Congénitos, según régimen de afiliación en salud, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD, enero - marzo 2022 .....	85
Figura 56. Número de casos de Seguimiento a Cohorte Malformaciones Congénitas, según sexo y edad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD.....	85
Figura 57. Número de casos de Seguimiento a Cohorte Hipotiroidismo Congénito, según sexo y edad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD.....	86
Figura 58. Número de casos de Seguimiento a Cohorte Síndrome de Down, según sexo y edad, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo enero - marzo 2022. Base de Eventos Congénitos Secretaria Distrital de Salud VSPD ..	87
Figura 59. Distribución de cuidadores de personas con discapacidad por sexo y por tipo de riesgo por sobrecarga en primer trimestre de 2022. Base de seguimiento PCD COVID-19, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero – marzo 2022 .....	88
Figura 60. Distribución de evento 113 por localidades. I trimestre 2022. base SISVAN enero – febrero 2022 .....	126
Figura 61. Proporción bajo peso al nacer a término-Evento SIVIGILA 110. Base SIVIGILA evento 110 enero a marzo 2022 .....	128
Figura 62. Distribución porcentual de las problemáticas colectivas por localidad año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria. ....	130
Figura 63. Distribución de problemáticas colectivas por categoría, año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria .....	131
Figura 64. Distribución de problemáticas colectivas por Subcategoría, año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria .....	132
Figura 65. Distribución porcentual de conducta a seguir por PCO I trimestre año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022.. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria. ....	133
Figura 66. Distribución porcentual de PCO según fuente de notificación I trimestre año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria. ....	148
Figura 67. Distribución porcentual de PCO según estrato socio económico de notificación I trimestre año 2022. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo enero – marzo 2022. Base de datos PCO Vigilancia Comunitaria. ....	149

Figura 68. Acumulación de Riesgos Total Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base SemafORIZACIÓN identificación de riesgos colectivos año 2022, equipo VCSP.....	154
Figura 69. Porcentaje de acumulación de nivel de riesgos por variable, Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base SemafORIZACIÓN identificación de riesgos colectivos año 2022, equipo VCSP.....	155
Figura 70. Distribución de problemáticas colectivas en la Subred Sur Occidente entre enero a marzo de 2022. Base semafORIZACIÓN riesgos colectivos VCSP, 2022 .....	156
Figura 71. Acumulación de riesgos Localidad de Kennedy, Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base SemafORIZACIÓN identificación de riesgos colectivos año 2022, equipo VCSP .....	157
Figura 72. Riesgos Localidad de Kennedy Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base semafORIZACIÓN riesgos colectivos VCSP, 2022 .....	159
Figura 73. Acumulación de Riesgos Localidad Puente Aranda. Subred Sur Occidente I trimestre periodo enero-marzo 2022. Base SemafORIZACIÓN identificación de riesgos colectivos año 2022, equipo VCSP .....	160
Figura 74. Localidad de Puente Aranda Subred Sur Occidente I Trimestre enero-marzo 2022. Base semafORIZACIÓN riesgos colectivos VCSP, 2022 .....	162
Figura 75. Relación de mortalidad general en la Subred Sur Occidente en el primer trimestre de 2022.Descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022 .....	163
Figura 763. Relación de casos de defunciones del primer trimestre de 2022 por localidad de residencia. Descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022 .....	165
Figura 774. Relación de mortalidad infantil por meses de ocurrencia del periodo comprendido entre enero a marzo de 2022 ajustado por muerte fetal y no fetal. Descarga de base de defunciones aplicativo RUAF ND desarrollada el 1 de abril de 2022 .....	166

## ANEXOS

Anexo 1.Tabla 41. Eventos de ideación, amenaza, intento suicida y suicidio, distribuidos por localidad, upz, sexo y por frecuencias absolutas y relativas. Enero – Marzo 2022, Subred Sur Occidente.

LOCALIDAD	UPZ	IDEACIÓN SUICIDA			AMENAZA SUICIDA			INTENTO SUICIDIO			SUICIDIO CONSUMADO			TOTAL		
		HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	TOTAL	FR	%
Bosa	Bosa Central	61	114	175	4	3	7	19	46	65	4	3	7	254	0.1	10.5
	Bosa Occidental	49	118	167	9	2	11	15	29	44	0	0		222	0.1	9.2
	El Porvenir	35	108	143	3	10	13	8	21	29	1	0	1	186	0.1	7.7
	Tintal Sur	10	32	42	4	1	5	3	8	11	1	0	1	59	0.0	2.4
	Apogeo	8	11	19	0	1	1	1	9	10	2	0	2	32	0.0	1.3
	Sin Dato	4	17	21	0	0	0	0	2	2	0	0		23	0.0	0.9
	Fontibon	36	59	95	1	4	5	9	12	21	3	1	4	125	0.1	5.2
	Zona Franca	15	49	64		1	1	4	9	13	0	0		78	0.0	3.2
	Fontibon San Pablo	11	28	39	1	2	3	3	7	10	1	1	2	54	0.0	2.2
	Granjas De Techo	10	20	30	1	1	2	1	6	7	0	1	1	40	0.0	1.7
	Modelia	6	18	24	0	0	0	2	9	11	0	0	0	35	0.0	1.4
	Capellania	7	10	17	0	0	0	2	2	4	1	1	2	23	0.0	0.9
	Ciudad Salitre O.	4	9	13	1	0	1	2	4	6	0	0	0	20	0.0	0.8
	Sin Dato	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	0.1
Aeropuerto El D.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	
Kennedy	Castilla	33	58	91	2	3	5	15	22	37	2	2	4	137	0.1	5.7
	Timiza	28	69	97	1	0	1	11	17	28	4	1	5	131	0.1	5.4
	Patio Bonito	26	58	84	1	5	6	9	21	30	0	0	0	120	0.0	5.0
	Calandaima	22	67	89	0	2	2	8	17	25	0	0	0	116	0.0	4.8
	Carvajal	23	46	69	1	3	4	7	15	22	1	0	1	96	0.0	4.0
	Gran Britalia	21	45	66	1	2	3	5	14	19	1	0	1	89	0.0	3.7

	Kennedy Central	27	34	61	2	5	7	2	6	8	1	0	1	77	0.0	3.2
	Americas	23	21	44	4	4	8	6	9	15	1	0	1	68	0.0	2.8
	Corabastos	10	28	38	1	1	2	8	5	13	1	0	1	54	0.0	2.2
	Tintal Norte	11	20	31	0	0	0	8	7	15	0	0	0	46	0.0	1.9
	Bavaria	10	18	28	1	1	2	5	4	9	0	0	0	39	0.0	1.6
	Las Margaritas	5	16	21	0	1	1	2	7	9	0	0	0	31	0.0	1.3
	Sin Dato	3	5	8	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	12	0.0
<b>Puente Aranda</b>	Ciudad Montes	34	45	79	2	3	5	10	9	19	0	0	0	103	0.0	4.3
	San Rafael	20	28	48	3	1	4	2	8	10	0	0	0	62	0.0	2.6
	Muzu	15	23	38	1	1	2	3	15	18	0	0	0	58	0.0	2.4
	Puente Aranda	6	7	13	0	1	1		1	1	0	0	0	15	0.0	0.6
	Zona Industrial	5	5	10	1	0	1	1	1	2	0	0	0	13	0.0	0.5
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>580</b>	<b>1187</b>	<b>1767</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>106</b>	<b>171</b>	<b>344</b>	<b>515</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>2422</b>	<b>1.0</b>	<b>100</b>

Fuente: Creado a partir de base de datos preliminar Sivigila D.C Sisvecos, Enero – Marzo 2022