

En Colombia durante el periodo epidemiológico II del año 2022, se presentó una disminución del 24, % en el número de casos de mortalidad materna temprana respecto al año 2021.

\*Datos preliminares

Los trastornos hipertensivos y las hemorragias obstétricas son las principales causas de mortalidad en mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

CASOS QUE RESIDEN EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO ENERO - MAYO 2022.

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA

2022

512 CASOS

4 CASOS

NUMERO DE CASOS PRESENTADOS DE MORTALIDAD PERINATAL, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO ENERO - MAYO 2022.



El día del parto puede ser de alto riesgo para la vida de la madre y/o del bebé.



Mortalidad Perinatal

102 casos

La mortalidad perinatal y neonatal tardía son indicadores ligados a la reproducción y reflejan la atención preconcepcional, prenatal, durante el parto y postparto. Es un marcador tanto de la calidad del servicio de salud materno infantil como de las condiciones biológicas, sociales y de salud de la madre.

Las ITS afectan aspectos tan importantes como salud Materna y salud perinatal, al igual que la Calidad de vida y la Sexualidad.

NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA, HEPATITIS B Y VIH EN GESTANTES, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO ENERO - MAYO 2022.



136 casos de Sífilis Gestacional 2022

27 casos de Sífilis Congénita 2022

11 casos de gestantes con Hepatitis B 2022

10 casos de gestantes de VIH 2022

INFOGRAFIA SERIE 39

FUENTE: BASE SIVIGILA DISTRITAL - SUBRED SUROCCIDENTE SEMANA EPIDEMIOLOGICA 01 a 22 DE 2022