

En Colombia durante el periodo epidemiológico VI del año 2022, se presentó una disminución del 44,0 % en el número de casos de mortalidad materna temprana respecto al año 2021, en el distrito.

*Datos preliminares

Los trastornos hipertensivos, las hemorragias obstétricas y las sepsis relacionadas con el embarazo, son las principales causas de mortalidad en mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.




CASOS QUE RESIDEN EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO ENERO – AGOSTO 2022.



NUMERO DE CASOS PRESENTADOS DE MORTALIDAD PERINATAL, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO ENERO - AGOSTO 2022.

El día del parto puede ser de alto riesgo para la vida de la madre y/o del bebé.



Mortalidad Perinatal

167 casos

La mortalidad perinatal y neonatal tardía son indicadores ligados a la reproducción y reflejan la atención preconcepcional, prenatal, durante el parto y postparto. Es un marcador tanto de la calidad del servicio de salud materno infantil como de las condiciones biológicas, sociales y de salud de la madre.

Las ITS afectan aspectos tan importantes como salud Materna y salud perinatal, al igual que la Calidad de vida y la Sexualidad.

NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA, HEPATITIS B Y VIH EN GESTANTES, CON RESIDENCIA EN LA SUBRED SUROCCIDENTE, PARA EL PERIODO ENERO – AGOSTO 2022.



248 casos de Sífilis Gestacional 2022

39 casos de Sífilis Congénita 2022

20 casos de gestantes con Hepatitis B 2022

11 casos de gestantes de VIH 2022

INFOGRAFIA SERIE 42

FUENTE: BASE SIVIGILA RESIDENTES – SUBRED SUROCCIDENTE SEMANA EPIDEMIOLOGICA 01 a 34 DE 2022